

道 光 己 丑 新 鐫

古吳葉天士先生著

續刻臨證指
南溫熱論

後附精選良方

衛生堂藏板

序

華與余家世為姻婭華君岫
雲精通岐黃術常存利濟救
人之心孜孜不倦向慕吳門葉天
士先生為崇世學扁留心覓其
醫案約計盈萬分內選刻共
成十卷名曰臨證指南已通行
海宇矣壬申歲又將其續補醫

案溫熱論與平生所集各種經
驗奇方付刊以備救急其願其
誠忽於癸秋謝世其方止刻十
二三半塗而廢見者咸為惋惜
華君好友岳異廷璋不忍膜視
力勸徽蘇義商程葉兩君子
授梓完璧以公同志一日漢川
程君來蜀出此編丐余作序予



素不知醫且當公務終拏軍
書旁午竟不暇及第展閱
了然心目洵為青囊家不可
一之書只盧扁後起亦能舍
是而別開空冥倘於鄙陋穽
症患奇難一時罕有良醫調劑
脩此查攷對症用藥立能起死
回生功叙匪淺慎勿以此編易



簡而忽諸

乾隆四十年冬小春月

賜進士出身

欽命四川按察使司按察司加三
級凝臺杜玉林撰并書



南京中医药大学图书馆藏

續刻葉案精選良方目

卷一

續刻臨證指南醫案

溫熱論

卷二

中風

補益

勞

盜汗

咳嗽

吐血

赤白濁

蟲

痞塊

膈

便閉

風寒濕痺

針灸

黃疸

河白



和而宜

中暑霍亂

消渴

瘧疾

痧

瘰癧

瘡

泄瀉

痢

脫肛

痔漏

腸風

溺血

卷三

疝氣

心口胃脘痛

呃逆

欬逆

耳

目

鼻

口

舌

牙

咽喉

癰疽

疔

癰瘡結毒

下疳



中毒

諸瘡

諸丹毒

無名腫毒

卷四

跌打損傷

圓藥

提藥

降藥

代針點頭

長肉收口

麻藥

痛瘦

諸風

疥癬

雀斑

疣瘰

小兒門

初生

雪口

臍風

稀痘方

痧痘

急慢驚風



疳積

婦人門

胎前

血崩漏

產後

乳疾

經帶

雜症



南京中医药大学图书馆藏

種福堂公選良方兼刻古吳名醫精論卷一

古吳葉桂 天士先生論 錫山華南田岫雲數

溫熱論

邪從口鼻而入故曰上受但春溫冬時伏寒於少陰遇春時發非必上受之邪也則此所論溫邪乃

溫邪上受首先犯肺逆傳心胞肺主氣屬衛心主血屬營辨營衛氣血雖與傷寒同若論治法則與傷寒大異蓋傷寒之邪留戀在表然後化熱入裡溫邪則熱變最速未傳心胞邪尚在肺肺主氣其合皮毛故云在表在表初用辛涼輕劑挾風則加入薄荷牛蒡之屬挾濕加蘆根滑石之流或透濕於熱外或滲濕於熱下不與熱相搏勢必孤矣不爾風挾溫熱而燥生清竅必乾謂水主之氣不能上榮



是溫風
濕溫之
發於春
未夏初
者也

兩陽相劫也。濕與溫合。蒸鬱而蒙痺於上。清竅爲之壅塞。濁邪害清也。其病有類傷寒。其驗之之法。傷寒多有變症。溫熱雖久。在一經不移。以此爲辨。前言辛涼散風。甘淡驅濕。若病仍不解。是漸欲入營也。營分受熱。則血液受劫。心神不安。夜甚無寐。或斑點隱隱。卽撤去氣藥。如從風熱陷八者。用犀角竹葉之屬。如從濕熱陷八者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁大便秘不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代之。急急透斑爲要。若斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒。重則如玉女煎。輕則如梨皮蔗漿之類。或其人腎水素虧。



中國醫藥大學圖書館藏

雖未及下焦先自徬徨矣。必驗之於舌。如甘寒之中加鹹寒。務在先安未受邪之地。恐其陷八易易耳。若其邪始終在氣分。流連者可冀其戰汗透邪。法宜益胃。令水與汗併熱達腠。開邪從汗出。解後胃氣空虛。當膚冷一晝夜。待氣還自溫暖如常矣。蓋戰汗而解。邪退正虛。陽從寒泄。故漸膚冷。未必卽成脫症。此時宜令病者安舒靜臥。以養陽氣。來復。旁人切勿驚惶。頻頻呼喚。擾其元神。使其煩躁。但諺其脉若虛軟和緩。雖倦臥不語。汗出膚冷。却非脫症。若脉急疾躁擾不臥。膚冷汗出。便爲氣脫之症矣。更有邪盛正虛。不能一戰而解。停一二日再戰汗而愈者。不可不知。

辛涼開
肺便是
汗劑非
如傷寒
之用麻
桂辛溫
也

再論氣病有不傳血分而邪留三焦亦如傷寒中少陽病也彼則和解表裡之半此則分消上下之勢隨症變法如近時杏朴芩等類或如溫胆湯之走泄因其仍在氣分猶可望其戰汗之門戶轉瘧之機括大凡看法衛之後方言氣營之後方言血在衛汗之可也到氣纔可清氣入營猶可透熱轉氣如犀角玄參羚羊等物入血就恐耗血動血直須涼血散血如生地丹皮阿膠赤芍等物否則前後不循緩急之法慮其動手便錯反至慌張矣且吾吳濕邪害人最廣如面色白者須要顧其陽氣濕勝則陽微也法應清涼然到十分之六七卽不可過於寒涼恐成功反棄何

以故即濕熱一去陽亦衰微也面色蒼者須要顧其津液
清涼到十分之六七往往熱減身寒者不可就云虛寒而
投補劑恐爐烟雖熄灰中有火也須細察精詳方少少與
之慎不可直率而往也又有酒客裡濕素盛外邪入裡裡
濕爲合在陽旺之軀胃濕恒多在陰盛之體脾濕亦不少
然其化熱則一熱病救陰則易通陽最難救陰不在血而
在津與汗通陽不在溫而在利小便然較之雜症則有不
同也

再論三焦不得從外解必致成裡結裡結於何在陽明胃
與腸也亦須用下法不可以氣血之分就不可下也但傷

寒熱邪在裡劫燥津液下之宜猛此多濕邪內搏下之宜
輕傷寒大便溏爲邪已盡不可再下濕溫病大便溏爲邪
未盡必大便硬慎不可再攻也以屎燥爲無濕矣再入之
體腕在腹上其地位處於中按之痛或自痛或痞脹當用
苦泄以其入腹近也必驗之於舌或黃或濁可與小陷胸
湯或瀉心湯隨症治之或白不燥或黃白相兼或灰白不
渴慎不可亂投苦泄其中有外邪未解裡先結者或邪鬱
未伸或素屬中冷者雖有腕中痞痛宜從開泄宜通氣滯
以達歸於肺如近俗之杏蔻橘桔等是輕苦微辛具流動
之品可耳

再前云舌黃或濁。須要有地之黃。若光滑者。乃無形濕熱。中已虛象。大忌前法。其臍已上爲大腹。或滿或脹。或痛。此必邪已入裡矣。表症必無。或十之存一。亦要驗之。於舌或黃甚。或如沉香色。或如灰黃色。或老黃色。或中有斷紋。皆當下之。如小承氣湯。用枳。榔。青。皮。枳。實。玄。明。粉。生。首。烏。等。若未現此等舌。不宜用此等法。恐其中有濕聚太陰爲滿。或寒濕錯雜爲痛。或氣壅爲脹。又當以別法治之。

再黃胎不甚厚而滑者。熱未傷津。猶可清熱透表。若雖薄而乾者。邪雖去而津受傷也。苦重之藥當禁。宜甘寒輕劑可也。

再論其熱傳營舌色必絳。絳深紅色也。初傳絳色中兼黃白色。此氣分之邪未盡也。泄衛透營兩和可也。純絳鮮澤者。胞絡受病也。宜犀角鮮生地連翹鬱金石菖蒲等。延之數日。或平素心虛有痰。外熱一陷。裡絡就閉。非菖蒲鬱金等所能開。須用牛黃丸。至寶丹之類。以開其閉。恐其昏厥爲瘥也。

再色絳而舌中心乾者。乃心胃火燔劫。燥津液。卽黃連石膏亦可加入。若煩渴煩熱。舌心乾四邊色紅。中心或黃或白者。此非血分也。乃上焦氣熱燥津。急用涼膈散。散其無形之熱。再看其後轉變可也。慎勿用血藥以滋膩難散。至