

證治準繩第五冊目錄

諸風門

癘風

破傷風

瘧

瘧瘧

顫振

攣

眩暈

神志門

癲狂癇總論

癲

狂

癇

煩躁總論

虛煩

躁

譫妄 尸症

循衣摸牀

喜笑不休

怒

善太息

悲

驚悸恐總論

驚

悸

恐

健忘

雜門

汗總論

自汗 頭汗 無汗 手足汗

盜汗

卧總論

不得卧

多卧



南京中醫藥大學圖書館版權所有

怠惰嗜卧

身重

不能食

饑不能食
惡食

痞

消癰

口燥咽乾

黃疸

食勞痞黃
目黃

嘈雜

欠噫



南京中醫藥大學圖書館版權所有

證治準繩第五冊

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

癰風

素問脉要精微論曰脉風成爲癰風論曰風寒客於脉而不去名曰癰風癰風者榮衛熱肘其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰又謂風氣與太陽俱入行諸脉俞散諸分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉臃腫而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也長刺節論曰大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉爲故汗出百日王註以泄衛氣之怫熱刺骨



髓汗出百日王註以泄榮氣之怫熱二百日鬚眉生而止靈樞曰癰風者數刺其腫上已刺以銳針針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食毋食他食今觀經之論治分榮衛者如此若古方雖多但混瀉其風熱於榮衛又無先後之分至東垣丹溪始分之活法機要云先樸皮散少少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年病愈此先治其衛後治其榮也試効方治段庫使用補氣瀉榮湯此治榮多於治衛也丹溪云須分在上在下在上者以醉僂散取臭惡

血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虬蟲
於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆不外於
陽明一經而已看其疙瘩上先見在上體多者病在
上也下先見在下體多者病在下也上下同得者病
在上復在下也陽明主胃與大腸無物不受此風之
入人也氣受之在上多血受之在下多血氣俱受者
上下皆多自非醫者神手病者鐵心罕有免者夫氣
爲陽爲衛血爲陰爲榮身半已上陽先受之身半已
下陰先受之是故再造散治其病在陰者用皂角刺
出風毒於榮血中肝主血惡血留止其屬肝也蟲亦

生於厥陰風木所化必用是治其藏氣殺蟲爲主以
大黃引入腸胃滌血之分利出瘀惡蟲物醉僂散治
其病在陽者用鼠粘子出風毒徧身惡瘡胡麻逐風
補肺潤皮膚蒺藜主惡血身體風痒通鼻氣防風治
諸風栝蒌根治瘀血消熱肘腫枸杞消風熱散瘡毒
蔓荊子主賊風苦參治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩
眉脫八味藥治功固至矣然必銀粉爲使銀粉乃是
下膈通大腸之要劑所以用其驅諸藥入陽明經開
其風熱拂鬱痞隔逐出惡風臭穢之毒殺所生之蟲
循經上行至牙齒軟薄之分而出其臭毒之涎水服

此藥若有傷於齒則以黃連末揩之或先固濟以解銀粉之毒銀粉在醉僂散有奪旗斬將之功遂成此方之妙用非他方可企及故丹溪取二方分用之如破敵之先鋒至於餘邪未除者但調和榮衛藥中少加驅逐劑耳

薛新甫曰大抵此證多由勞傷氣血腠理不密或醉後房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱相火血隨火化而致故淮陽閩廣間多患之眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝腳底先痛或穿者毒在腎偏身如癰者毒在脾目先損者毒在心此五

臟受病之重者也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三曰血死爛潰四曰筋死指脫五曰骨死鼻柱壞此五臟受傷之不可治也若聲啞目盲尤爲難治治當辨本證兼證變證類證陰陽虛實而斟酌焉若妄投燥熱之劑膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈枯相火愈旺反成壞證矣

本證治法 癰瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼證無有弗雜況積歲而發現於外須分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也 癰瘍當知有變

有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一
蓋兼證當審輕重變證當察先後類證當詳真偽而
汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之
源委而施治焉蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形
氣則虛也 癰瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵
千針蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗卽出血
出血卽發汗二者一律若惡血凝滯在肌表經絡者
宜刺宜汗取委中出血則效若惡毒永結於臟非蕩
滌其內則不能瘥若毒在外者非砭刺徧身患處及
兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表

裏俱受毒者非外砭內泄其毒決不能退若上體患
多宜用醉僊散取其內蓄惡血於齒縫中出及刺手
指縫并臂腕以去肌表毒血下體患多宜用再造散
令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一
二日更刺之以血赤爲度如有寒熱頭疼等證當大
補血氣 癰瘍服輕粉之劑若腹痛去後兼有濃穢
之物不可用藥止之若口舌腫痛穢水時流作渴發
熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜
用小柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便秘
結此爲熱毒內淫宜用黃連解毒湯若大便調和用

濟生犀角地黄湯若穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲冷此爲虛熱也宜用七味白朮散

癰瘍

手足或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血當用加味道遙散加生地黄及換肌散兼服

癰瘍

生蟲者五方風邪翕合相火制金木盛所化肉食五藏而證見於外也宜用升麻湯送瀉青丸或樺皮散以清肺肝之邪外灸承漿以疏陽明任脉則風熱息而蟲不生矣肝經虛熱者佐以加味道遙散六味地黃丸

兼證治法

頭目眩暈若右寸關脉浮而無力脾肺

氣虛也用補中益氣湯若左關尺脉數而無力肝腎
氣虛也用六味地黃丸若右寸尺脉浮大或微細陽
氣虛也用八味地黃丸血虛者四物湯加參苓白朮
氣虛者四君子湯加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清
肝散肝經虛熱者六味地黃丸脾氣虛弱者補中益
氣湯脾虛有痰者半夏白朮天麻湯砭血過多者芎
歸湯發熱惡寒者聖愈湯大凡發熱則真氣傷矣不
可用苦寒藥恐復傷脾胃也 口喎目斜若手足牽
搐或髻稜痒動屬肝經血虛風熱用加味逍遙散六
味地黃丸以生肝血滋腎水若寒熱往來或耳聾脇

痛屬肝木熾盛先用小柴胡合四物湯以清肝火生
肝血若筋攣骨痛或不能動履用六味地黄丸補中
益氣湯以滋化源若因服燥藥而致者用四物湯加
生甘艸金銀花以解熱毒益陰血凡此俱屬肝經血
燥所致須用六味地黄丸補中益氣湯爲主若因怒
氣房勞而甚者用六味地黄丸十全大補湯爲主若
因勞傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯爲
主 夏秋濕熱行令若飲食不甘頭目眩暈徧身酸
軟或兩腿麻木口渴自汗氣促身熱小便黃數大便
稀溏濕熱傷元氣也用清燥湯如在夏令用清暑益

氣湯若自汗盜汗氣高而喘身熱脉大元氣內傷也
用補中益氣湯若嘔吐少食肚腹痞悶大便不實脾
胃受傷也用六君子湯若胸腹不利飲食少思吐痰
不止脾胃虛痞也用四君子湯若形氣倦怠肢體麻
木飲食少思熱傷元氣也用人參益氣湯 熱渴便

濁若夜安晝熱者熱在氣分也用清心蓮子飲晝安
夜熱者熱在血分也用四物二連湯俱佐以六味地
黃丸若寒熱往來者肝經血虛也用加味逍遙散六
味地黃丸 小便不利若因服燥藥而致者用四物
湯加炒黑黃蘗知母生甘艸以滋陰血若頻數而色

黃者用四物湯加參朮麥門五味子以生氣血若短
而色黃者用補中益氣湯加山藥麥門五味以滋化
源 大便不通若血虛內熱而澀滯者用四物湯加
麥門五味子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者用
四物湯加連翹生甘艸以生血清熱若服剋伐之藥
而致者用四君子湯加芍歸以助氣生氣若作渴飲
冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以清胃火若作渴
飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯以補氣生津若
內熱作渴面赤飲湯者用四物湯送潤腸丸以涼血
潤燥若腸胃脹滿燥在直腸而不通者用猪膽汁導

之腸胃氣虛血涸而不通者用十全大補湯若肝膽
邪盛脾土受侮而不能輸化者用小柴胡湯加山梔
郁李仁枳殼治之 怔忡無寐或兼衄血便血若因
熱晡熱作渴飲湯肢體倦怠此脾血虛而火動也用
四君子加芩歸若思慮傷脾動火而致用歸脾湯加
山梔若發熱晡熱用八珍湯加酸棗仁茯神遠志若
因心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所
致但調補胃氣則痰清而神自安不必專於清熱治
痰 發熱惡寒若肢體倦怠煩躁作渴氣高而喘頭
痛自汗者此內傷氣血也用補中益氣湯加五味麥