

孫真人備急千金要方

十



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

孫真人千金方卷之三十二

孫真人千金方卷之三十三

孫真人千金方卷之三十四

並本

磨四

孫真人千金方卷之三十五

磨五

孫真人千金方卷之三十六

磨六

磨二

上海涵芬樓影印正統道藏本

南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学

孫真人備急千金要方卷之三十二

磨三

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

傷寒方

傷寒雜治第一

論
失法
方

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青葙艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解也熱在身中既不時治治之又不用苦酢等藥此如救火不以水也必不可得脫免也

方要金千急人備真人孫



貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參
青葙蓼蘆艾之屬所在盡有除熱解毒最良
勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內
熱者不必按藥次也便以青葙苦參艾苦酒
療之但稍與促其間無不解也

磨二

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針
石之所及病在骨髓無可柰何而凡醫治病
或言且待使病成乃頓去之此為妄矣當預
約束家中及所部曲具語解此意使有病者
知之為要



治溫氣病欲死方

又胃火藥不可
用

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之
當吐則除諸毒病服之覆取汗皆愈
仲及時後云治熱毒
氣死破棺千金湯

苦參湯治熱病五六日已上方

苦參

三兩

黃芩

二兩

生地黃

八兩

右三味咬咀以水八升煎取二升適寒溫
服一升日再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚留中煩
亂欲死起死人搗湯方

文張

芫花一升以水三升煮取一升半漬故
布薄胷上不過三薄熱即除當溫暖四
肢護厥逆也

桔萎湯治傷寒中風五六日已上但胷中煩
乾嘔方

磨二

桔萎實一

甘草各三

生薑四

甘草各三

大棗十二

柴胡半斤

研末

右六味㕮咀以水一斗二升煮取五升絞

去滓適寒溫服一升日三

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下

食方

生蘆根切

青竹茹各一升

粳米合三

生薑兩

右四味以水七升先煮千里鞋底二隻取
五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥

重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草三

兩

生蘆根切一升

橘皮一兩

粳米合三

兩

右四味㕮咀以水五升煮取二升隨便稍

三十三卷 第二十三

飲不瘥更作取瘥止
治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏

麥門冬

半夏各一升

竹葉一把

人參兩

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓內

粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方

加生薑五兩

此方正是一仲景竹葉湯方前
卷汗後門中已由此方仍少

甘草分兩不別

治熱毒攻手足赤腫焮熱疼腫痛欲脫方
煮馬屎若羊屎汁漬之日三度



又方濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煮苦參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

漏蘆連翹湯治時行熱毒變作赤色癰疽丹

疔毒熱赤腫赤痛生障翳方

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白朮

升麻



甘草 各一
兩

大黃 各三
兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服
相去如人行五里久更服熱盛者可加芒
消二兩

猪膽湯治傷寒五六日斑出方

猪膽

苦酒各三
合

雞子一枚

右三味合煎三沸强者盡服之羸者須煎
六七沸分為二服汗出即愈

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮蒸穰汁洗之一莖是穄穰即不瘡



北京中医药大学图书馆版权所有

瘡若黑者擣蒜封之

又方煮芸薹洗之

治熱病後豌豆瘡方

黃連三兩以水二升煮取八合頓服之

又方真波斯青黛大如棗水服之瘥

磨二

四

又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服之愈

又方若赤黑發如疥大一作疾火者煎羊脂摩傅

之

又方小豆屑雞子白和而傅之

又方以婦人月水帛以拭之

又方小兒著取月水汁和水浴之

又方灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

木香湯治瘡煩疼者方

青木香二兩

薰陸香

礬石

丁香各一兩

麝香半兩

右五味㕮咀以水四升煮取一升半再服
熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代

之病輕者去礬石神驗

又方芒消和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧

黃土末上良此病小便澀有血者內壞瘡皆
黑屬不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢合

大猪膽一
具

右二味合煎三沸服一合日五服之良

度二

五

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜偏身摩瘡上亦可以蜜煎升麻
摩之并數數食之

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上
不止用此方

牡蠣半兩

石膏一兩六錢

右二味治下篩酒服方寸七日三四亦可
蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻

衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏扇切

一斤猪脂一

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄
綿裹之內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻

芍藥

羚羊角

通草

射干

生蘆根

兩四

兩二

升切

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分作

二服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏

半升

蜜

一升

右二味以水三升先煮石膏取二升次內
蜜復煎取如餚含如棗核許盡復含之大
良

治傷寒熱病後口乾喜睡咽痛方

大棗

枝二十

烏梅

枝十

右二味合擣蜜和含如杏核大咽其汁甚
驗矣

禹餘糧湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞

磨二

六

堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以
理中與之而利益甚理中治中焦此利在下
焦治之方

禹餘糧

赤石脂

各一
斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不