

輯增

醫學寶在易

廣益書局
石印

卷五

冷物快稍越方可投冷物則中氣運動無患也

田中乾泥國藥方

治中暑昏厥煩悶欲絕急救法

取田中乾泥微一團溫在病人肚上使少壯人撒尿於泥團

吐瀉中片時即得生起矣後不可飲冷湯須進溫水湯

理中湯

通脈四逆湯

五苓散

濕症

二水二陳湯

治諸濕及痰飲

白朮

蒼朮

茯苓

半夏

陳皮

炙甘草

二投煎

腹症

五皮散治一切氣腫水腫

茯苓皮

大腹皮

桑白皮

陳皮

生薑皮

水煎服

此藥以皮治皮

不動臟腑勿以平易而忽之

四君子湯

人參

白朮

茯苓

甘草

加生薑大棗煎服

小兒龍湯

真武湯

導水茯苓湯

治水腫頭面手足遍身腫如蠲水之狀按而塌陷胸膈滿不能轉側安睡飲食不下小便澀澀溺出如

割或如豆汁而飽少服喘嗽氣逆諸病不效者用此即漸利而愈

澤瀉

赤茯苓

麥冬

白朮

桑白皮

紫蘇

檳榔

水煎服

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

每服一二兩水二杯

燈草三十根煎八分食

連服兩劑重者可用五兩濃煎五更服

鳳膏甘草湯

麻黃

甘草

水二杯

先煮麻黃至一

杯半

去滓入甘草八分

服此方上宜肺氣中助

土氣外行水氣其功居於清生腎氣火之上且腫症並濕寒症不同傷寒証惡過汗亡陽腫症以汗愈多愈妙水從汗

泄時醫謂陰關鬼門並無亡陽之說

麻黃附子甘草湯

即前方加附子一錢五分

此與傷寒論之分數各異即以溫經散寒之法變為溫經利水之方

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

桑白皮

茯苓

山茱萸

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

桑白皮

茯苓

山茱萸

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

桑白皮

茯苓

山茱萸

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

桑白皮

茯苓

山茱萸

治小便短少氣喘者

桑白皮

茯苓

山茱萸

陳山藥

丹皮

澤瀉

牛膝

桑白皮

茯苓

山茱萸

年久者三五次永不再發平時置新解木於枕邊取香氣透過打散肝風亦良法也

駁章

二陳湯

一味鹿茸酒

註云緣鹿茸生于頭頭榮而主展其蓋以類相從也用鹿茸酒煎去淨入麝香少許服

一味大黃散

丹溪云眩暈不可當者此方主之大黃酒製三次為末茶調下每服一錢至二三錢

王液湯

治肩臂骨痛

半夏一錢 水煎服 水煎去渣加沉香木少許服

咳嗽

小兒龍湯

治寒飲咳嗽

麻黃 桂枝 白芍 細辛 乾薑 五味子 半夏 炙甘草

一錢

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥八分服

木乳散

治肝咳嗽兩脇下滿

木乳 杏仁 貝母 炙甘草 共為細末薑湯湯

送下二錢

醫學寶在易卷六

氣滯諸方

傷寒

白虎湯

調胃承氣湯

水承氣湯

心腹諸痛

黃耆湯

治心痛胃脘痛腹痛喜按者

黃耆一兩 當歸三錢 肉桂一錢 水煎服

枳實湯

治心痛胃脘及脇肋大小腹諸痛拒按者

枳實三錢 丹麥一兩 白檀香 砂仁 水煎服

丹麥飲

治心痛諸痛結約不致者如神婦人尤宜

丹麥一兩 白檀香 砂仁 水煎服

黃耆半夏白酒湯

治胸痹不舒背痛微心喘氣逆等症

黃耆一兩 半夏三錢 白酒二杯

煎至八分溫服

理中湯 治心腹諸痛及吐瀉等症 人參 白朮 乾薑 炙甘草 水煎服

通脈四逆湯 治四肢厥冷脈絕諸危症 乾薑 附子 炙甘草 水煎服 腹痛加芍藥三錢

黃連湯 治胸中有熱而嘔胃有積氣而腹痛 黃連 炙甘草 乾薑 桂枝 人參 半夏 水煎服

大柴胡湯 水煎服

當歸生薑羊肉湯 治腹中痛及產後腹痛不止 當歸 生薑 羊肉 水煎服

小柴胡湯 治胸脅痛多嘔寒熱往來若脈中急痛先服小建中湯二時許再服此湯

分若加生薑再加水三杯

當歸四逆湯 治厥陰陽寒手足厥冷脈細欲絕者 當歸 白芍 桂枝 炙甘草 細辛 木通 水煎服

金鈴子散 治心腹諸痛服熱藥而更甚者 金鈴子 木香 水煎服

七氣湯 治七情氣逆諸痛 茯苓 半夏 厚朴 紫蘇 加生薑三片水煎服

和劑枳實散 治心腹諸痛 枳實 白朮 芍藥 甘草 水煎服

每服二錢空心溫酒調下 仁壽直指云有一田夫醉飽之餘海裏腹快一枕天明自此脾疼攻刺百約周效後發

戒後遇至人授以枳實散數服頓愈則知風露之根入在脾胃良善苦瀉而能散其邪也登備氣為龍伐其根觀此可

以通一畢萬矣然而痛不復作秦脾之刺獨不可熨是而調理之子療病如濕衣必去其垢汚而後可以加綴飾醫者

意也請借是以為喻 脇痛已於心腹諸痛門盡其方治其然此症時下最多今又補錄於左言之不厭於後也

肝虛脇痛

肝實脇痛 脇肋陰虛血燥則肝脈失養而痛且症脇下筋急不得太息自腎不明爪甲枯片邊旁即甚或忌飯即發其

也

清以補肝散 酸棗仁 熟地 白朮 當歸 山茱肉 山藥 川芎 木瓜 獨活 五味子

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongb

右為末每服五錢水煎服 肝體陰而用陽此以甘酸補肝以辛味補肝用加獨活者假風藥以依其氣也
一方有人參黃耆石解柏子仁桃仁無山藥獨活五味 一方阿膠為大梧子大蘇服二錢空心白湯下 一方羅子
黃一錢調春日二服

肝大脇痛

紅方肝病者兩脇下痛引少腹善怒又云肝氣實則怒其肝當症是數實其口當酸其痛必甚或煩渴二便不通

龍膽草

當歸

梔子

黃連

黃芩

大黃

青黛

蘆薈

木香

鹿角

安丸小豆大黃湯下二三十丸

瓜蒌湯

治左脇痛 大瓜一隻重一二兩者連皮搗爛粉甘草二錢紅花五分水煎服益聖胡龍香青黛龍膽之類

苦寒益腎其漆而瓜蒌辛而滑潤於鬱不逆甘緩潤下故奏效捷也

忌積

內經曰病起下滿氣息二三歲不已病名曰息積大消息者陰陽之史事也今氣聚於脇下息而不消則積而不散

滿逆而為病然氣不在胃故不妨於食特害於氣而已治宜導引服藥藥不可獨治蓋導引能行積氣藥力亦藉以

而行故也

推氣散 治右脇痛脈滿不食

片薑黃

枳殼

桂心

吳草

為末每服二錢薑黃湯調下食後服

赤茯苓湯 治息積脇下氣逆滿悶

赤茯苓

桂心

陳皮

高良薑

大腹皮

甘草

吳

失笑

每服三錢水煎日二服

白朮丸

白朮

枳實

桂心

人參

陳皮

吳草

枳殼

右為末蜜丸梧子大空心酒下

三十天日二脇痛五屬肝主血右屬肺生氣多痰積然思哀喘怒肝氣兩脇骨疼痛筋脉拘急腰脚重痛是也

枳殼煮散

枳殼

細辛

桔梗

防風

川芎

高良薑

甘草

為末每服四錢水一盞半

薑棗同煎至七分安心食前服 尤在溫云惡寒煩懣肝氣致鬱耗散能通三焦之氣故以為君不祇散故用細辛川

芎桔梗之早以散之肝苦急故用甘草之甘以緩之其用防風者惡則氣散借風藥以張之也

度飲

二陳湯 治痰飲及諸般咳嗽之通劑

茯苓 四錢

半夏 三錢

陳皮 一錢

桑葉 一錢

加生薑四片煮三枝水

前服此藥

參朮丸 治老癯頑痰癰生諸瘰癧病

青礞石 三錢 煅過 入水煎 一兩 以湯

大棗 三錢

黃芩 三錢

元香 一兩

水浸為丸每服一錢五分仰臥而勿行動二時許方行動飲食服後喉間稠粘痰乃病與病相拒少頃自

愈

桂枝甘水湯

治痰飲頭暈欬嘔心下悸小便不利等症

茯苓 四錢

白朮 三錢

桂枝 三錢

炙甘草 一兩 水煎服

桂附八味丸

治腎虛諸病但小便不利者宜之

熟地 四兩

山茱萸 三錢

懷山藥 三錢

茯苓 三錢

丹皮 三錢

湯藥

附子 三錢

肉桂 三錢

蜜丸如梧子大每服五十丸米湯下

以美修壁之

王肯堂云相人寄子命門命

門者男子以藏精女子以繫胎固本慈福之大無所附故厥而上行桂附與火同氣而其味辛能開腠理致津液通氣

道誠其密宅而招之同氣相求大必降下矣且火從腎出者是水中之火也火可以水折而水中之火不可以水折故

已病有火者為得火則破得火則速則桂附者固治浮游之火之正劑歟

神仙聖藥丸

黑牽牛 三錢

早角 三錢

白朮 一兩

黑牽牛 三錢

黑牽牛 三錢

黑牽牛 三錢

黑牽牛 三錢

黑牽牛 三錢

黑牽牛 三錢

控涎丹

甘遂 三錢

大戟 三錢

白芥子 三錢

胡人脂 三錢

胡人脂 三錢

胡人脂 三錢

胡人脂 三錢

胡人脂 三錢

胡人脂 三錢

十藥湯

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

礞石 三錢

青礞石丸

治食積痰瘕

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

青礞石 三錢

竹瀝丸

半夏 三錢

陳皮 三錢

白朮 三錢

茯苓 三錢

大黃 三錢

黃芩 三錢

人參 三錢

炙甘草 三錢

炙甘草 三錢

泥一丸

晚半盞汁三匙拌勻

乾如此五大度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸

晚半盞汁三匙拌勻

乾如此五大度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸

晚半盞汁三匙拌勻

乾如此五大度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸

晚半盞汁三匙拌勻

乾如此五大度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸

晚半盞汁三匙拌勻

製時入之久晒透香味

半更丸

治腸疝結實滿悶滿逆

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

半更丸

大薑湯下二十人導痰湯 二陳湯 六君子湯 此除宜存砂六君子湯 濟生腎氣丸 桂苓甘水湯 六君子

沉香茯苓丸 溫脾胃利胸膈和氣血 沉香 一兩 茯苓 半斤 人參 丁香 甘草 厚朴

肉豆蔻 薑汁 薑湯下二十丸

本事神仙丸 茅山蒼朮 生芝麻 三味拌和來熟入面拌大如梧子大

乾之每日空腹溫湯吞下五十丸加至一百丸二百丸忌食生冷油膩心腸微燥進山梔散一服不燥其山梔乾為

末沸湯點服 許叔微云予平生有二疾一則藏府下血二則腸中停飲血有時而止停飲則無時而愈結固年少時

夜坐為文左向伏几案是以飲食多墜向左邊中夜以後頻困乏則飲酒兩三杯既卧就枕又向左邊側睡氣壯盛時

殊不覺三五年後覺酒止從左邊下流澀有聲腸痛飲食減十數日必嘔吐數升酸水暑月止是右邊身有汗發熱

常潤左邊病處絕燥獨妨名醫及海上方脈之少有驗問武中病止得月餘復作其補則如天牌附子熟石其利則如

牽牛大戟皆逆償實之藥予後病度之已成痼疾如藥水有糾勾不盈糾不行水盈糾而後行者也清者可行濁者依

熱膠蓋下無路以決之也是以積之五七日必積吐去而積寬數日復作大脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝

濕崇土以填糾勾則痼疾去矣於是悉屏諸病一味服蒼朮三月而疾愈自此一向服數年不嘔不吐胸膈寬飲啜如

故暑月汗周體而身涼飲亦當中下前此飲清子肝日亦多昏眩與後燈下能書細字皆蒼朮之力也予初用茅朮半

年後止用燥烈味極辛者削去及不浸極有力而亦自然不燥也山梔散用山梔一味乾為之末沸湯點服故知久坐

不可伏向一邊時或運轉亦消息之法

二陳如薑茶過煎山梔梔散清荷湯

王節翁化痰丸 治痰瘕之疾稠粘難於咯喚 天門冬 酒苓 瓜蒌仁 橘紅 海石粉 杏仁 杏附

芒硝 桔梗 連翹 青黛 煅煉入生薑汁少許和丸細嚼一丸清湯下

痢疾 芍藥湯 治赤白痢寒急後重 芍藥 三錢 當歸 黃芩 黃連 枳殼 獨活 甘草 芍藥 本香

肉桂湯 小兒服或以肉桂換乾薑 此時醫通用之方大意以行血則使腹自愈如氣則腹重自除頗為合法

真人養臟湯 治瀉痢久病脫肛完穀不化等症

何子雄

集果散

肉桂

白朮

酒白芍

生甘草

小前服

臘寒

此方妙在木香之

多則瀉而不鬱

葛根黃連黃芩甘草湯

葛根

黃連

黃芩

甘草

水三升

先煮葛根

一升半

吹去沫

入諸

藥煎七分服日二服夜一服

此方治傷寒協熱下利而喘者

借用治下利及熱者如神

理中湯

黃連

木香

右二味

共為末

水浸為丸

梧子大

服三三錢

米湯送下

桂枝湯

治少陰下利

赤石脂

乾薑

白朮

桂枝

作一服

水煎

調入石脂末

服日夜作三服

病在腎為先天之本天樞府可以補之

仲景此方獨具女醫手段

當歸四逆湯

當歸

芍藥

細辛

通草

小柴胡湯

大承氣湯

白朮

黃連

白芍

烏梅

肉桂

乳香

羊脂

治久痢不瘥

羊脂

白朮

黃連

白芍

烏梅

肉桂

乳香

白朮

黃連

白芍

烏梅

右七味

合內沙鍋中湯上煎之

可丸飲用如桐子大

三十丸日三服

于大小如方寸匕

按石頑曰羊

脂性滑利人千金用治久痢不瘥專取滑利以通虛中留滯也

且後且有羊脂阿膠

蜜蠟黍米作粥方家得美常本經

前中寫瀉之意

泄瀉

胃氣

治諸瀉及腫脹腹痛等症

加生薑三片水煎服

四神丸

治五更至天明腹痛瀉

瀉有定候名脾胃瀉久瀉

瀉生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

四神丸

治五更至天明腹痛瀉

瀉有定候名脾胃瀉久瀉

瀉生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

四神丸

治五更至天明腹痛瀉

瀉有定候名脾胃瀉久瀉

瀉生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

四神丸

治五更至天明腹痛瀉

瀉有定候名脾胃瀉久瀉

瀉生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

生薑四兩同煮爛去皮核和為丸

如梧子大臨睡以米湯送下四錢

去肉豆蔻加

吳茱萸

以火藥八十八粒

附子
肉己
玉易
與一

水煎服冷

宣經云中熱消脾則使食寒中之屬則使熱胃中熱

宣經云中暑消脾胃則寒寒中之屬則使熱胃中熱則消痰今人懸心善飢膈以上皮無腸中熱則出苦如屋漏以下皮寒胃中熱則腹脹腸中寒則腸鳴泄泄胃中寒腸中熱則腹而泄泄胃中熱腹脹中寒則無飢小腹滿脹秋石頌注云世醫治病但知寒以寒治熱以熱治外此總不識也後病中無清脾胃而見懸心善飢洵為熱狂無疑然必審其病以上皮為方之胃中熱氣逆降而泄者不但胃中有熱而腸中亦為其邪奔迫可知倘膈以下皮寒而且腹脹有似乎實執固施實為胃中虛寒之候或見陽也蓋泄非特胃有寒且移寒於二腸矣蓋泄則腸虛黃者寒泄則黃滑者冷此病機之最顯者若可以明辨此有反而泄利此脹為胃寒陽氣不布之壯泄為腸熱使垢之泄便有清色易飲小腹脹痛之病蓋非胃中有熱腸中有寒之一證乎若此種種尚未明仲景三瀉心湯黃連湯乾薑黃芩湯連人參湯厚朴湯蒼耳黃甘並人參湯散諸人參半夏丸等法必不可以語坐治也

乳豆丸

結症

脾胃丸

海科書

卷五

与梁氏

大黃

取仁

卷二

卷之五

求學錄

光悟子太

十六臨卧思天下大德通利則止

按權量尺寸古今不同此方各家折和不能合

三才氣湯

肺痿及胃方

左陽欽順方

此方如生地當歸能散陽明之陰以去胃口伏邪之燥大去伏邪者惡其芳未入坎不如專顧陽明之運

腰痛

腎者湯 治腰痛而重如帶五千錢 茯苓 白朮 乾薑 吳茱萸 水煎服 全匿名甘其乾薑

茯苓 白朮 甘草 二兩 薑各四兩 藥品此方同而輕重不同耳 蓋以腰者腎之府也 腰痛則腎虛而重 是寒濕之邪不在腎之中間而在腎之外府故其治不在溫腎以散寒而在燥土以勝濕 若用桂附則反傷腎陰矣 五積散 桂附八味丸 六味丸 二陳湯

不寐症

酸棗仁湯 酸棗仁 甘草 知母 茯苓 芎藭 水三杯 三分先煮酸棗仁至二杯 入諸

藥再煎八分服 先立溫云人語則魂寓於目 寐則魂藏於肝 虛勞之人肝氣不榮故以酸棗仁補之 然不眠由於虛

煩必有燥火焚氣之虞故以知母甘草清其燥 煖後以芎藭行氣除痰 腎所以求肝之治而寧其魂

小半夏湯 半夏 生薑 水煎服

不能食

消食丸 治數年不能食 麥蘖 細辛 乾薑 烏梅 蜜丸服十五丸 日再服至四十丸 亦治反胃

又方 神曲 麥蘖 烏梅 乾薑 茯苓 甘草 蜜丸服十五丸 蜜丸題挑大無厭 一丸不拘時

細嚼白湯下一方無木瓜有人來乾薑 徐靈胎曰方中在木瓜烏梅之功

又方 欖心 麥芽 鹽醋 川椒 乾薑 右五味篩以蜜拌食後酒服方寸匕 以上三方並

治胃虛冷不能食之劑

資生丸 健脾開胃 行食止瀉 調和氣血 滋養榮衛 白朮 茯苓 白芍 桔梗 烏豆 橘皮 山楂 神麴

白茯苓 人參 白朮 白芍 桔梗 烏豆 橘皮 山楂 神麴

山藥 芡實 薏苡仁 右為末煉蜜丸每服二錢細嚼淡鹽湯下

滋脾散 收飲胃氣清涼肌表 人參 白朮 茯苓 山藥 烏豆 知母 生地黃 梗米 甘草

淡竹葉 地骨皮 麥冬 右作一服水二鍾薑三片煎一匙煎一匙食後服

二神丸

沉香

白木

紫厚朴

人參

白茯苓

半夏

木香

草豆蔻

甘草

陳皮

黑

乾薑

生薑大者水煎三錢溫服日二服

他亦症

甘露散

治胃熱善食不生肌肉

生地

熟地

天冬

麥冬

片苓

石斛

甘草

枇杷葉

枳殼

茵陳

水煎三錢服

黃疸症

理中湯

建中湯

芍藥

桂枝

甘草

生薑

大棗

白

大棗

白

大棗

白

大棗

白

大棗

去滓內始轉更上微火消解溫服日三服

茵陳蒿湯

治陽明病發熱汗出此為熱起下能發若也但頭汗出身無汗刺頭而逆小便不利渴飲水漿者此為瘧

茵陳蒿六錢

梔子三錢

大黃二錢

右三味以水三升先煮茵陳減一升半

內二味煎八分去滓溫服日三服小便當利尿如草角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

梔子葉五兩

治傷寒身發黃發熱

梔子二錢

甘草一錢

黃蘗二錢

寒症

麻黃湯

桂枝湯

理中湯

四逆湯

真武湯

吳茱萸湯

五積散

理中湯

建中湯

芍藥

桂枝

甘草

生薑

大棗

白

五苓散

治霍亂吐瀉而渴者

大陽症是口渴嘔逆小便不通等症

水腫症用此散

澤瀉二兩

白朮

茯苓

猪苓

白朮

澤瀉

白朮

澤瀉

白朮

茯苓

猪苓

桂枝

甘草

生薑

大棗

白

大棗

白

大棗

白

大棗

白

大棗

白

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

鼓脹

胃水湯

聖末煎 治脾虛作脹及久患吐瀉等症 白朮一兩 陳皮二錢 乾薑三錢 肉桂二錢 水煎服虛甚加附子

白朮補脾脾極補則善運蓋運則食消而脹去欲其運多乎補則生用欲其補多乎運則熟用凡藥生則行逆熟則行
後自焦之理也若妙則全失其本性反令損脾增脹陳皮這結氣於外乾薑祛寒氣於中肉桂化大腸之氣於下
其氣化而上中二焦之氣亦治此景岳新方中之第一方也

連理大 治腹脹如盤時吐酸水者 又治久瀉如神 人參 白朮 乾薑 川連 枳實 炙甘草 蜜丸每服

三錢米湯送下日二服喻嘉言云厥水時吐時生為單腹脹服此心膈腹脹俱病不用八味地黃丸為藥中之剛而用
此丸為剛中之柔取其大苦大辛能變胃而不為胃變也愚按以白朮易參朮其力更大

桂甘薑棗麻子湯 治氣分心下堅大如盤連如旋杯 桂枝 生薑 炙甘草 麻黃 細辛 附子

一八 大棗四枚水三升二分先煮麻黃至二升二分去沫入諸藥煎八分溫服日夜三服汗出如蟲行皮中即愈
此症是心腎交病上不能降下不能升日積月累如後石難破方中桂枝甘草生薑大棗以和其上而復用麻黃附子
細辛少陰的劑以治其下通上下交通而病愈所謂大氣一轉其結乃散也

枳朮湯 治心下堅大如盤連如旋杯 枳實 白朮 水煎服

煎服日三服腹中與即當散也 言水飲所以別於氣分也氣無形以辛甘散之水有形以苦泄之方中取白朮之溫

以健運枳實之寒以消導意深哉 胃為陽陽當有餘脾為陰陰當不足胃強脾弱則陽與陰絕矣脾不能為胃行其
津液則水飲作矣方中用朮以補脾用枳以抑胃藏腑分理所以治水飲之原易老遲且痛浸之見便湯為大已認為
一補一消之法學者切勿違此陋語為有礙者笑

四七湯 然而為七情所致者宜此湯主之 半夏 茯苓 芍藥 枳實 生薑 三片水煎服 此

方妙在紫蘇葉一味以散結香以醒脾而順氣消脹行水乃其妙事

疝氣

五苓散特製 此方治疝氣以白朮為君以桂枝換肉桂再加小茴香白朮香木通川線子附子方散

發症

當歸四逆湯

七氣湯

四逆散 治陰陽不相順接四逆厥冷

治痢症後重按痢之後重宜照法重加煎白

蔡胡 白芍 甘草

白虎湯 治氣湯

其為寒每服三錢米湯調下日三服

六味地黃丸 治腎水不足虛火上炎咳嗽吐血喘咳遺精腰膝冷症

熟地黃 山茱萸 懷山藥

建瓯湯 救卒死 救時死 治黃汗 杏仁 甘草 右三味以水八升煮取三升去滓分令咽之

通治諸感忤 按今法馬氏所折三代之本每升一白蒸一割分三服 御製醫宗八卷六中風客汗便閉搜是者

仲景用備急丸可知其汗衣實者不當用備急丸通裏當用建瓯湯以通表也通裏者如諸陰氣也通衣者如諸陽氣

也味者不知以麻黃為入太陽發汗之藥知下濕腹取汗則為入太陽通陽之藥也陽氣通則理可通矣

白微湯 治婦人氣聚如死如人者 白微 人參 當歸 炙甘草 水煎服

蒲黃酒方 蒲黃一兩 黑豆三兩 先將黑豆炒香以酒浸下取酒飲一升

二術二陳湯 治濕感生痰

平胃散 五苓散 防風通聖散

腎腎寶在易卷七

傷寒

大青龍湯 麻杏甘石湯 白虎湯 承氣湯

九味羌活湯 治四時感冒頭痛發熱惡寒身痛代麻黃桂枝膏乳各半等湯

羌活 蒼朮 白芷 細辛 川芎 黃芩 生地黃 甘草 加生薑五

片蔥頭二根如湯服自汗去蔥頭加白木倍防風胸滿去地黃加枳殼枳實如多汗去蒼朮加桂枝下焦行加大黃

滋生地黃黃芩雖能退熱然初起不可適用苦寒不如用養氣生津且能助正氣而驅邪

三黃解毒湯 治大熱發狂發狂黃狂下血等症 黃柏 黃芩 黃連 梔子 甘草 一錢 水煎服

犀角地黃湯 治大邪吐血衄血尿血諸語狂黃赤淋婦人血崩等症 生地 三錢 犀角 六錢 丹皮 芍藥 各二錢 水煎服

煎服 柯韻伯曰氣為陽血為陰陽盛乃因陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘即是火火入血

室血不榮經即隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在腑之分要皆心肝受熱所致也心為

榮血之主心火旺則血不安故用生犀生地酸鹹甘寒之味以清君火肝為藏血之室肝火旺則血不守故用丹皮芍

藥辛苦微寒之品以平相火凡方雖曰清火而實滋陰之劑蓋夫血則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以味勿

得反陽且氣也苦用芍連膠桑旋柏以瀉其熱則陽之刺者苦從大化已衰者氣從苦發陰原而氣起矣

防風通聖散

口糜鼻衄齒齦

甘露飲 治胃火熾盛等症

睡無安眠蠶蛾

導赤散 治火感口瘡喉痺便血蠶蛾及赤淋莖中痛如刀割等症 生地 三錢 木通 甘草 各二錢 如竹葉二十四

片水煎服 此藥重白濁心湯用黃連所以治實邪實邪因母之有餘故瀉子以清母也導赤散用通利藥所以治虛邪

因水之不足故壯水以制火也

白登方

渴白散 治肺受燥氣咳嗽不已大移支腸作渴等症 桑白皮 三錢 地骨皮 一錢 黃芩 甘草 各一錢 加粳米

二錢水煎服 手時珍云此渴肺諸方之準經也

打撲石膏湯 右膏 八錢 桑白皮 一錢 半夏 二錢 人參 二錢 炙甘草 一錢 解竹葉 一錢 棧木 三錢 水三打

半煎二杯入梗木煎至不稠為度分服

回元湯 人參 炙甘草 當歸 各二錢 大棗 二錢 炙者 四錢 煨薑 水煎服

上海大華書局印行

六味地黃丸 白虎湯 麻黃湯

四生丸 治熱甚通血要行此方止血兼能行血所以為妙 生地黃 生艾葉 生側柏 生荷葉 湯為元

如單子大每服一丸

理中湯 治中下之血不止得此便能助氣神劑也

黃土湯 治吐血衄血下血婦人血崩之神劑 駐心黃土 煨生地 黃芩 白朮 阿膠 炙草 附子

甘草乾薑湯 血症服涼藥不止者得此如神 乾薑 炙甘草 水煎服

新紅丸 治下血久不止 則柏葉 附子 乾薑 炙甘草 水煎服

當歸補血湯 治大便下血虛弱者 早蓮草 陰乾為末以糯米煎湯細炒米粉糊丸如梧子大每日服五錢以人參五

分煎湯下二服即愈

牛膝酒煎 治男子血中痛及婦人血結少腹痛 牛膝一大提酒煮飲之

早蓮草煎汁 治小便下血 早蓮草 車前子 將二味搗自然汁每日空心服一茶匙

桂枝湯 治大便下血即日夜數次數年久病服之立愈 桂枝 芍藥 甘草 大棗 小麥 水煎服

將二味搗糊用白糯米拌和裝入豬臟內兩頭紮住砂鍋內燒開見氣蒸後將八中白芨脫研末煎與或醬油煎

喫亦可不論喫粥喫飯空口皆可喫喫四五條即愈

喘促 喘促

小兒乾湯 治小兒乾湯

小兒乾湯

小兒乾湯

小兒乾湯

小兒乾湯

小兒乾湯