

醫方集解

天津直隸書局
印行



足本大字醫方集解卷二目錄

理氣之劑第七

補中益氣湯

調中益氣湯

又調中益氣湯

淺朮益胃湯

升陽順氣湯

益胃升陽湯

補中益氣加黃蘗生地湯

順氣和中湯

調榮養衛湯

烏藥順氣散

八味順氣散

蘇子降氣湯

木香順氣湯

四磨湯

五磨飲子

越鞠丸

七氣湯

又七氣湯



四七湯

代赭旋覆湯

丁香柿蒂湯

又丁香柿蒂湯

丁香柿蒂竹茹湯

橘紅竹茹湯

丁香散

橘皮竹茹湯

金匱橘皮竹茹湯

定喘湯

理血之劑第八

四物湯

玉燭散

知藥四物湯

滋陰降火湯

坎離丸

二連四物湯

三黃四物湯

三黃補血湯

元戎四物湯

治風六合湯

補肝丸

治氣六合湯

神應養真丹

四物加桃仁紅花竹瀝薑汁湯

防風當歸散



四神湯

婦寶丹

八珍湯

三合散

當歸補血湯

歸脾湯

養心湯

人蔘養榮湯

龍腦雞蘇丸

欬血方

獨聖散

清咽太平丸

還元水

麻黃人蔘芍藥湯

犀角地黃湯

膠艾湯

四物加丹皮地骨湯

十全大補湯

生地黃連湯

艾附暖宮丸

芎歸湯

大補黃芪湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

加味犀角地黄湯

桃仁承氣湯

桃仁承氣飲子

抵當湯

抵當丸

代抵當丸

槐花散

栝葉湯

槐角丸

加減四物湯

槐花散

當歸和血散

又槐花散

槐花荆芥散

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮湯

秦艽防風湯

秦艽羌活湯

秦艽當歸湯

芍藥湯

導滯湯

蒼朮地榆湯



芍藥地榆湯

小薊飲子

復元羌活湯

祛風之劑第九

小續命湯

麻黃續命湯

葛根續命湯

羌活連翹續命湯

侯氏黑散

大秦朮湯

三生飲

地黃飲子

順風勻氣散

稀莖丸

牽正丸

桂枝續命湯

附子續命湯

錄驗續命湯

白虎續命湯

桂附續命湯

大續命湯



北京中醫藥大學圖書館藏

改容膏

如聖飲

薊活湯

活絡丹

消風散

清空膏

胃風湯

東垣胃風湯

上中下通用痛風丸

史國公藥酒方

獨痺湯

三痺湯

薊活寄生湯

羌活續斷湯

沈香天麻丸



通頂散

烏梅擦牙關方

祛寒之劑第十

理中湯

附子理中湯

桂枝人蔞湯

溫胃湯

四逆湯

朮附湯

薑附歸桂蔞甘湯

四逆加人蔞湯

甘草乾薑湯

當歸四逆湯

漿水散

當歸四逆湯

枳實理中丸

連理湯

黃芪湯

乾薑附子湯

白通湯

茯苓四逆湯

芍藥湯

茵陳四逆湯

理中安蚘丸

補中湯

治中湯

薑附歸桂湯

白通加人尿豬膽汁湯

芍藥甘草附子湯

茱萸四逆湯

回陰返本湯



四逆加吳茱萸生薑湯

四逆散

真武湯

附子湯

白通加人尿豬膽汁湯

葱熨灸法

吳茱萸湯

吳茱萸加附子湯

大建中湯

十四味建中湯

八味大建中湯

樂令建中湯

小建中湯

黃芪建中湯

白朮附子湯

甘草附子湯

芎朮除溼湯



益元湯

回陽救急湯

四神丸

二神丸

五味子散

澹寮四神丸

感應丸

導氣湯

天台烏藥散

疝氣方

梔附湯

橘核丸

清暑之劑第十一

四味香薷飲

黃連香薷飲

三物香薷飲

五物香薷飲

六味香薷飲

十味香薷飲

三物香薷加羌活防風湯

香薷葛根湯

二香散



南京中醫藥大學圖書館版權所有

消暑益氣湯

黃芪人蔘湯

補肝湯

生脈散

五味子湯

補氣丸

補氣湯

茯神湯

六一散

益元散

雞蘇散

碧玉散

清六丸

溫六丸

三生益元散

茱萸六一散

黃芪六一散

縮脾飲

消暑丸

黃連消暑丸

大順散

五苓散

見火門

人蔘白虎湯

見火門



竹葉石膏湯 見火門

利溼之劑第十二

五苓散

四苓散

茵陳五苓散

金匱豬苓散

茯苓白朮湯

二朮四苓湯

五苓合益元散

藳苓湯

豬苓湯

茯苓甘草湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

辰砂五苓散

元戎五苓散

桂苓丸

白茯苓湯

五苓倍桂加黃芪湯

茯苓琥珀湯

柴苓湯

蒼桂五苓散

桂苓甘露飲

澤蔞湯

春澤湯

節菴導赤散

胃苓湯即對金飲子

茯苓朮散

大半夏湯



加味腎氣丸

越婢湯

防已黃芪湯

防已茯苓湯

防已湯

腎著湯

舟車丸

溶川散

疏鑿飲子

實脾飲

五皮飲

麥蘗冬湯

羌活勝溼湯

羌活除溼湯

升陽除溼湯

東垣升陽除溼湯

中滿分消丸

中滿分消湯



大橘皮湯

茵陳蒿湯

茵陳三物湯

茵陳將軍湯

茵陳去梔子大黃加乾薑附子湯

八正散

萆薢分清飲

琥珀散

防己飲

當歸拈痛湯

禹功散

升陽除溼防風湯



足本大字醫方集解卷二

理氣之劑

經曰諸氣贖鬱皆屬于肺又曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同百病多生于氣也夫人身之所恃以生者此氣耳源出中焦總統于肺外護于表內行于裏周流一身頃刻無閒出入升降晝夜有常曷嘗病于人哉及至七情交攻五志並發乖戾失常清者化而為濁濁者閉而不通表失護衛而不和裏失營運而弗順氣本屬陽及勝則為火矣河間所謂五志過極皆為火丹溪所謂氣有餘便是火也人身有宗氣營氣衛氣中氣元氣胃氣沖和之氣上升之氣而宗氣尤為主及其為病則為冷氣滯氣上氣逆氣氣虛諸變證矣無病之時宜保之養之和之順之病作之時當審其何經何證寒熱虛實而補瀉之

補中益氣湯升陽補中○東垣

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脈洪大而虛或喘或渴或陽虛自

汗宜本湯加麻黃根浮小麥升柴俱宜蜜水炒過欲其引參者至表故又不可缺或氣虛不能攝血或瘡痢脾虛久不能愈一切清

陽下陷中氣不足之證

病中者脾胃也臟腑肢體皆稟氣于脾胃飢飽勞傷其脾胃則衆體無以稟氣而皆病矣陽氣下陷則陰火上乘故熱而煩非實熱也頭者諸陽之會清陽不升則濁氣

上逆故頭痛其痛或作或止非如外感頭痛不休也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則火上于肺故喘金受火尅不能生水故渴脾虛不能統血則血妄行而吐下清陽下陷則為瀉痢氣血兩虛則瘧不止名瘵瘵按老也○李東垣內傷外感辨傷于飲食勞役七情六慾為內傷傷于風寒暑溼為外感內傷發熱時時止外感發熱甚不休內傷惡寒得暖便解外感惡寒雖厚衣烈火不除內傷惡風不畏甚風反畏隙風外感惡風見風便惡內傷頭痛乍痛乍止外感頭痛連痛不休直待表邪傳裏方能內傷有溼或不作渴或心火乘肺亦作燥渴外感須二三日外表熱傳裏口方作渴內傷則熱傷氣四肢沉困無力怠倦嗜臥外感則風傷筋寒傷骨一身筋骨疼痛內傷則短氣不足以息外感則喘壅氣盛有餘內傷則手心熱外感則手背熱天氣通于肺鼻者肺之外候外感傷寒則鼻塞傷風則流涕然能飲食口知味腹中和二便如常地氣通于脾口者脾之外候內傷則懶言惡食口不知味小便黃赤大便或秘或澀有餘宜汗宜吐宜下若內傷之證誤作外感妄發其表重虛元氣禍如反掌故立補中益氣湯主之又有內傷外感兼病者若內傷重者宜補養為先外感重者宜發散為急此湯惟上焦痰嘔中焦溼熱傷食膈滿者不宜服

補中益氣湯

黃耆蜜炙 人參 甘草炙 白朮土炒 陳皮留白 當歸五分 升麻二分 柴胡二分 薑三片 棗二

枚煎如血不足加當歸精神短少加人參五味肺熱欬嗽去人參噎乾加葛根

風藥多燥葛根獨能止渴者以其能升胃中清氣入肺而生水耳 頭痛加蔓荊子痛甚加川芎腦痛加藁本細辛風溼相

搏一身盡痛加羌活防風有痰加半夏生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香益腎

腹脹加枳實厚朴木香砂仁腹痛加白芍甘草熱痛加黃連能食而心下痞加

黃連咽痛加桔梗有寒加肉桂溼勝加蒼朮陰火加黃蘗知母陰虛去升柴加

熟地山茱山藥大便秘加酒煨大黃欬嗽春加旋覆欬冬夏加麥冬五味秋加

麻黃黃芩冬加不去根節麻黃天寒加乾薑泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智

此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃耆補肺固表為君脾者肺之本土能生金脾胃一虛肺氣先絕 人參甘草補脾益氣和中瀉火為臣東垣曰參者甘草瀉火之聖藥蓋煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣而虛熱自退故亦謂之瀉 白朮燥

溼強脾當歸和血養陰為佐補陽必兼和陰不然則已亢 升麻以升陽明清氣右升而復其本位 柴胡以升

少陽清氣左旋而上行 陽升則萬物生清升則陰濁降加陳皮者以通利其氣陳皮同輔藥則補獨

用則 生薑辛溫大棗甘溫用以和營衛開腠理致津液諸虛不足先建其中中

者何脾胃是也李東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須多用黃耆而人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而固腠理不令自汗上喘氣短故以人參

補之心火乘脾用炙甘草溫以瀉火熱而補脾元若脾胃急痛併大虛腹中急縮宜多用之中滿者減之白朮苦甘溫除胃中之熱利腰臍間血胃中清氣在下必加升麻柴胡以升之引參耆甘草甘溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表

瀉脾

又緩帶脈之縮急氣亂于中清濁相干用去白陳皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛為陰火傷其生致之氣營血大虧血減則心無所養致令心滿而煩病名曰倦故加甘辛微溫之劑生陽氣仲景之法血虛而人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃蘗以救腎水瀉陰中伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺則心火自降李士材曰虛人感冒不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自發汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散藥血虛者四物湯加然散藥東垣治風溼用補中益氣加羌活防風升麻藁本蒼朮海藏治風溼無汗者用神朮湯有汗者用白朮湯治剛痲神朮湯加羌活麻黃治柔痲白朮湯加羌活桂心治中喝脈弦細孔遲者用黃耆湯此皆仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒是也明醫雜著云發熱有數種治各不同仲景論傷寒傷風此外感也故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時發病用辛熱以勝寒如春溫之月則當變以辛涼之藥夏暑之月則當變以甘苦寒之劑又有冬溫者此天地之厲氣當隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦為內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也有夏月傷暑之病雖屬外感卻類內傷東垣所謂清暑益氣是也又有因暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外此則非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛熱解表辛溫理中之藥卻與傷寒治法相類者也外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣醫貫曰讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人多矣讀東垣書而不讀丹溪書則陰虛不明而殺人多矣東垣脾胃論深明飢飽勞役發熱等證俱是內傷悉類傷寒切戒汗下以為內傷多而外感少只須溫補不必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中益氣為主如內傷兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼溼者加羌活實萬世無疆之利此東垣特發陽虛發熱之一門也然陰虛發熱者十之六七亦類傷寒今人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷寒之法已窮余嘗于陰虛發熱者見其大熱面赤口渴煩躁與六味地黃丸一大劑即愈如下部惡寒足冷上部渴甚躁極或飲而反吐即加肉桂五味甚則加附子冷飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚遺未盡之意也

本方除當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯東垣治脾胃不調胸滿肢倦食少

短氣口不知味心和則舌知味乃食入反出本方加白芍五味子亦名調中益氣湯東垣治

氣虛多汗餘治同前補中湯純用甘溫所謂勞者溫之損者溫之此加白芍五味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以廣補中之妙者乎本方加蒼朮

足本大字醫方集解 卷二 補中益氣湯