

木通 各一錢二分

用水二鍾加圓肉七枚煎八分服渣再煎服

丙字化毒丸

治心經內外前後形症

牛黃

珍珠

各五分

犀角

蜜色味香有棕紋者用之

瓜兒

血竭

紫草

硃砂

雄黃

白蘚皮

乳香

月月紅

各一錢五分

姜蚕

酒拌炒去絲

蟬退

山甲

各一錢三分

生生乳

一錢

赤芍藥

二錢

右各製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸



如桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十六粒每
晚空腹服十一丸人參湯送下龍眼湯亦可
藥減如餘邪未盡藥不可徹切忌惱怒焦躁
止可用十分之三

凡服十丸先用滾湯汨嚥清胸中濁氣嗣服丸藥
藥後啖糕菓之類壓丸藥下胃日宜尊法毋忽

通氣飲

治橫痃初起或兩髀俱腫作痛肉未堅實應服此
方

木通

瓜蒌子

各五錢

忍冬花



粉甘草

各三錢

貝母

紫蘇葉

各二錢

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分服

消毒飲

治便毒單生腫硬大作痛者服此方

歸尾

粉草

熟大黃

黑丑

搗碎各三錢

姜蚕

貝母

各二錢

用水酒各一大鍾煎八分空腹服渣煎七分服

單方

治同前

黑丑頭末

七錢

空腹熱酒調服或汗或下下後以

粥飲止之



北京中醫藥大學圖書館藏

五虎湯

治同前有元氣者服之

全蝎

姜蚕

川山甲

炙各一錢五分

蜈蚣

班毛

三個去頭足糯米拌炒

生大黃

二錢

右研為末分二次空腹酒服

內托散

治便毒腫痛將作膿者服之

地榆

兩

黃芪

粉草

忍冬花

川山甲

白芷

各二錢

用酒二大鍾煎至一鍾空腹服渣再煎服

透膿散



治便毒有膿未破作癰作脹

皂角刺

黃芪

牛膝

各三錢

川芎

一錢

當歸尾

川山甲

忍冬花

漢防已

各五分

錢

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分若服前

方不効者感毒必重當服甲字化毒丸收功

解毒湯

治下疳初起

連翹

荊芥

木通

黃連

生地

牛膝

忍冬花

滑石

甘草

何首烏

各等分



告然

水二大鍾煎八分服渣再煎七分服

解毒丸

治同前

白芷

兩

班毛

四十個

二物和一處用酒拌濕透

文火炒燥揀出班毛用白芷全蝎胡桃肉各

兩二物新瓦上焙微焦生大黃一兩晒燥四物

共研細末酒麵打糊爲丸如菜菔大每服三錢熱

酒送下

參藥方

治下疳瘡

海巴子

煨存性一名貝子

研極細每一兩末加水片五

分五色粉霜三分再研盛磁罐聽用

又方

兩前茅茶

麻黃

細切各一錢五分

連四紙方

老寸許

用鉛粉錢半擦在紙上鋪前二味捲筒火灼存性
研細加水片一分再研盛罐聽用

薰洗方

苦參

川椒

忍冬花

各兩許

用水三四碗煎數

沸先薰後洗瘡口拭乾用摻藥從四沿摻之用薰
洗摻藥不効者毒中必深當服壬字化毒丸收功

化毒飲

下疳瘡腐爛陷下有凹或包皮腫如雞肫或肌

膚見形如班如疹將發瘡者當服此方

漢防已

當歸

忍冬花

白蘚皮

連翹

羌活

川芎

各三兩

牙皂

五錢

右切片分作七帖每帖加奇良四兩猪胰子一枚

水四碗煎至二鍾分二次服渣再煎一鍾服七帖

後倘或不効者當服化毒丸收効

解表飲

治下疳便毒同起內作筋骨疼痛者服之

麻黃

紫蘇

桔梗

各三錢

川芎

升麻



當歸

忍冬花

各五錢

姜蚕

蟬退

各三錢五分

子羊肉

十兩

用煮酒十碗煎至三鍾頓服厚衣蓋覆出

汗透為度

加味風流飲

治瘡初起不生疔瘡便毒者服之

防風

荊芥

川芎

升麻

鼠粘子

花粉

白蘚皮

姜蚕

甘草

川山甲

牛膝

何首烏

芍

木通

五加皮

各等分



水三大鍾加猪脾半隻可良一兩煎至一碗熱

服取微汗爲度渣再煎服兼服庚戌二子化毒丹

牛黃蟾酥丸

發表化毒能治一切疔腫癰疽瘡瘍

西黃

錢一

蟾酥

錢二

麝香

分二

硃砂

雄黃

乳香

各一錢五分

先以蟾酥切片熱酒化軟將五味

細末和蟾酥搗丸如黍米大每服七丸蔥頭熱酒

送下出冷汗爲度

萬病解毒丹

治瘡毒初起可作下藥勝用大黃克伐胃氣



山茨姑

二兩須擇嚴處土產色紫而價重者方是白者用之効薄

紅芽大戟

去木切薄片取頭末一兩五錢

干金子

去根土淨

文蛤

三兩

硃砂

雄黃

各五錢

麝香

二錢乾燥者抵三錢用須擇當門子

右製爲細末以糯米稀粥搗成錠子量人大小虛

實服一錢上下白滾湯磨化

凡患疔瘡便毒未愈有生瘡之兆預煎此油服之可

免面部生瘡

麻油

八兩

用自已頭髮三五錢煎化作二次服再

亦可



滄頭面及不便處者先薰洗後點藥五日即愈

製生生乳法

煨煉礬石

三錢

雲母石

二錢五分

硝石

一兩六錢即盆硝

朱砂液

九錢六分即朱汞色粉紅者為上

晉礬

一兩二錢

汞礬

八錢

食鹽

兩半

枯礬

五錢六分

青鹽

三錢五分

右件共研不見星入羊錫罐內三方一頂火候藥

化面上有霜頭起離火候冷用鐵盞蓋扎鹽泥固

濟待罐口泥乾入八卦爐內先用文火候盞底熱

透微微擦水加炭平口用武火三香足離火先用

甘草牙皂各二錢煎濃汁收盞底白丹砂棉紙包



裹浸汁內片時取出連紙埋土中三日夜取來晒
乾每兩加水麝各七厘辰砂九分共研極細外用
乳香錢二分滾水燉化和前末研勻爲丸每重一
錢一分外以黃蠟封固卽名生生乳照方配合服
之刻日奏効每見公子王孫沾染此疾百藥無効
者皆因方之不當藥之不真也余願此方公之海
內而後世易爲采擇永無差誤然世之毒藥古方
往往用之各有製度耳如水銀一物得雲母礬石
同煉其毒卽解不比粉霜輕粉之酷烈也余用生
生乳配風藥而治大麻瘋配癆藥而治傳屍癆配

蟲藥而治諸蟲疾配膈藥而治噎塞翻胃配瘡藥
而治頑毒頑癬久漏骨痛種種奇効不獨治瘡瘡
毒氣之聖藥也大凡藥性與稟性有異人有殺藥
者毒藥服之竟不覺察奏功亦緩性有不殺藥者
服之便覺眩冒奏効亦速所以爲醫全在活潑經
曰大積大聚衰其大半而止不必盡劑須要體察
病情効未全者再宜進藥或間日再服或停兩
三日再服務宜消息增除毋使過劑以生藥病

製金鼎砒方法

淨白砒

二兩五錢
研細爲末

出山鉛

十六兩開如大
豆許敲爲薄片

用小城礮一個以鉛片挑砒末重重疊在礮內用
文火鎔化俟青煙起白煙來霜飛礮口方離火
定鉛面清如水色如金者無渣質者爲妙若色青
黑非出山鉛也用之無効

結毒方法

夫結毒者癰瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易
散解作痛作腫久則塊破潰爛不已治此症者不
外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所
湊其氣必虛虛者空也無也譬諸國內虛則人民
靡散百禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能治

其虛安問其餘蓋言虛者為百病之本宜首與以冠諸症也

毒結於肝膽二經者內作筋痛攻走脇肋上至於頭下至於足轉側艱難手不能舉足不能步或頸項發塊或破爛上下或傳他經致生別病當用乙字化毒丸兼用煎劑調理

乙字化毒丸

治已上諸症

牛黃

丁香

牙皂

各五分

琥珀

須擇體堅燥者用之

鬱金

生生乳

各一錢

硃砂

雄黃



月月紅

白蘚皮

乳香

川山甲

各一錢五分

製大黃

錢二

姜蚕

錢四

右製爲末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻

桐子大另研硃砂爲衣每早空心服十三丸

每服

空腹服九丸人參湯送下炒米湯亦可病去藥減

如餘邪未盡藥不可徹百日內勿使大勞大怒順

時調理

煎藥方

當歸

錢二

芍藥

錢一

川芎

錢七

人參

丹皮

各八分

膽草

柴胡

紅花

各五分