

# 医纲提要

三



醫綱提要卷之三

開陽一亭李宗源纂集論註

旌德王汝謙鏡堂氏評刊

表裏部

傷寒傳經熱邪表裏總論

外感症莫備於傷寒但傷寒二字所包者廣難經曰人之傷寒

有五有中風有傷寒有濕溫有熱病兼痢疾暑喝等有溫病汪苓友言

仲景傷寒法凡溫暑濕瘧痢喝時疫皆是以其貪涼飲冷而得

之故溫暑亦謂之傷寒也源按小雪至小寒六十日始為正傷

風寒而溫疫四時皆有內經言冬時一切發熱不惡寒者皆為

溫病吳又可曰治數百溫病才遇一二傷寒治數百傷寒才遇

一二陰寒直中陰經之症活人書曰虛人太陽感寒直入少陰

不惡寒者  
雖在冬亦  
不可用麻  
桂辛溫之



北京中医药大学图书馆版权所有

藥也直中寒已入臟原無表裏傳經屬熱故有表裏也傳經熱入陽明之府女科小兒治法皆同孕婦亦以大黃逐邪邪去而胎自安也此三陰傳經之熱有淺深次第不比直中之一于寒也

是也故直中之寒由少陰而入此表裏傳也此表裏二字既屬指臟腑言也虛寒不過溫散溫補理中四逆等湯及升提之法而已仲景少陰前篇是茲所謂表裏者指傳經熱邪而言也傳經熱邪由太陽及陽明少陽皆從經絡及腑而入三陰之臟經絡為表入腑入臟則為裏將入三陰先由太陰此誤下傳也岐伯曰傷寒一日巨陽受之二日陽明受之三日少陽受之此三陽經絡皆受其病上皆言三陽在經之邪也而未入腑者可汗而已太陽主羌活湯陽明主葛根少陽主柴胡而加表汗藥四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之三陰三陽皆受病營衛不行五臟不通則死矣然此言其常耳不可拘也凡外感雖在夏秋亦有虛寒冬春亦多實熱或初起即有兼症或數日不離一經或一經而表裏並行故表裏法不拘時令之寒

寒熱頭痛  
身痛在表  
之邪  
謔語口渴  
潮熱陽明  
入裏之候  
皆下証也  
中暑因食  
涼者亦由  
經絡入因  
飲冷者亦  
由口入

喻氏以猪  
苓置陽明  
篇實乃太  
陽之裏勝  
肫之熱也  
其寒邪初

暑日數之多寡傷寒溫疫雜症之名目總之見表症者酌用解  
表法見裏症者酌用滲利攻下法見兼病者用兼病之法其中  
**陰陽補瀉升降潤燥利濕通結壅脫**等法俱隨表裏之治而並  
用故表裏一法實兼一十六字之法也吳又可曰傷寒邪由毛  
竅入溫疫邪由口鼻入由竅入者亦使之由竅出經云未入腑  
者可汗已入腑者可下麻徵君增一吐法總是導引邪氣從門  
戶而出耳源按邪從竅出一語已盡外感之蘊仲景太陽表用  
桂枝麻黃今用羌活冲和陽明表用葛根所以導邪由毛竅出也  
太陽表用五苓猪苓陽明裏用承氣所以導邪從前陰後陰之  
竅而出也少陽半表半裏以柴胡湯散寒為表以黃芩湯清熱  
為裏以和解為導邪之法也在胸中者亦半表半裏以瓜蒂散

入時氣化  
不行故五  
苓用桂兼  
溫表之意

九法兼用  
始備表裏  
一法此傷  
寒法所以  
為萬法之  
祖也

病之死于  
實實者十  
之八九悲  
夫  
舌色白病  
在表色黃  
則熱入裏  
由黃而黑

涌吐為表以陷胸湯攻下為裏亦導邪從上竅下竅而出也其  
表**中兼清熱法者**葛根黃連黃芩白虎等湯兼**溫散法者**麻黃  
附子細辛等湯兼**補虛法者**芍藥甘草附子細辛等湯**裏中兼**  
**清熱法者**大小承氣湯兼**燥濕法者**五苓猪苓是也**裏中兼潤**  
**燥法者**麻仁丸炙甘草湯故表裏者汗滲吐下和解而兼散寒  
**清熱潤燥補虛九法兼用之道也**喻嘉言於太陽三篇分營衛  
而不分表裏少陰二篇雖分寒熱而未指明傳經直中寒熱相  
反之所以然故治外感症者始焉以正傷風寒之麻桂等湯施  
于溫疫之表症繼又以三陰直中之理中四逆施之三陰傳經  
之熱邪明明熱甚神昏反投參桂以助其熱豈知同一三陰而  
傳經之熱與直中之寒相去天淵惟初病時邪尚在表舌白惡

則熱毒愈深矣舍清熱潤燥攻下無他法也

陽明腑症無非潮熱譫語口渴便秘或協熱下利及發斑發狂等症雖在三冬皆屬大熱不外白虎承氣法也陰症只有惡寒腹痛或吐瀉面唇青白絕無口渴便

寒尚可暫用溫散溫補若邪既入太陽裏症則小便不利宜用

五苓猪苓入陽明裏症則舌心漸黃但發熱不惡寒與溫疫之

首尾皆一于熱者無殊故傷寒溫疫通謂之熱病也因病由寒

入受暑受熱之病皆因貪涼飲冷故暑暘溫通謂之傷寒也傷寒傳經之熱

與溫疫熱入三陰及三陰轉陽明腑症者均用白虎承氣經曰

陽明中土萬物所歸無所復傳生死關頭都決于此其脉浮者

應從表解不離白虎其脉沉者應從裏解不離承氣觀仲景少陰後篇自

知但麻葛之表表中之表白虎之表裏中之表已入陽明之承

氣之裏裏中之裏耳故萬病以傷寒法為綱外感病以表裏二

字為綱而白虎承氣二方又表裏綱中之至要方也後世善用

白虎法者明之繆氏仲醇廣筆記是也善用承氣法者吳氏又

秘症其人  
神氣清醒  
不似熱甚  
神昏狀也

可溫疫論是也。白虎承氣用各有殊。皆歲運六氣所感。故脉有  
浮沉之異。奈何。白田集竟闕仲醇而溫疫論舉世亦多未醒也。  
讀仲景書者。兼取繆氏吳氏之書而讀之可也。



太陽經表裏辨

在經為表  
入腑入臟  
為裏

有汗不得  
用麻黃無  
汗不得用  
桂枝恐犯  
實質虛虛  
致人于死  
二者表藥  
中大關鍵  
也

太陽者足太陽膀胱手太陽小腸也其經脉行身之後故頭  
痛自腦項背脊腰間及周身俱痛者皆太陽也太陽職司寒  
水故外感寒邪皆由太陽而以在冬者為正傷風寒也風寒  
在經必見發熱惡寒其有汗也表虛而脉浮者名曰傷  
風當以羌活為主而兼散邪實表之藥不必拘用桂枝湯也  
其無汗也表實而脉浮緊者名曰傷寒亦以羌活為主而兼散  
邪發表之藥不必拘用麻黃湯取大汗也以上太陽之表也  
至於邪入膀胱之腑則為太陽裏症有膀胱蓄尿者寒邪初  
入膀胱氣化不行小便不利五苓散症也有蓄熱者熱閉膀  
胱便亦不利猪苓湯症也又熱甚而蓄血者自利其人如狂

此表裏乃臟腑之表裏也

節菴所云邪雖傷足必傳于手者此也大抵膀胱熱而實者小便癰閉不行熱而虛者小便短赤頻數熱到氣分則白濁熱到血分則便血寒入邪實氣化不行則小便不利寒而正虛關

桃仁承氣症也足太陽與足少陰腎相爲表裏有表裏兼傳者寒邪兼入腎臟此麻黃附子細辛湯症也其足太陽膀胱失于利導或熱入漸深傳入手太陽小腸故令人憤亂如狂則導赤散症也又手太陽小腸與手少陰心經爲臟腑之一表一裏腑病及臟心君亦昏冒不寧此瀉心導赤湯症也以

上皆太陽之裏也至於直中陰寒則甫及太陽經絡已直趨少陰腎臟而見脉細唇青腹痛吐瀉等症則本氣虛寒之故一於溫補無所謂傳經故亦無表裏法也凡此皆外感太陽之邪來路去路其淺深次第有如此者又因傷家心中鬱熱移于小腸亦令便赤胃移熱于膀胱亦令白濁或服澁精等藥亦致小便不利令心如狂不安寧者均不外利水導赤之

門不禁則小便自遺

李挺張介

賓所注陽

指三陽陰

指三陰甚

是喻氏指

為營衛不

可從蓋中

篇寒傷營

症均有發

熱等症也

法猪苓湯桂苓飲子等症也經曰心煩頭痛過在膈中手巨陽少陰是也

# 仲景太陽表裏摘要

**太陽上篇**風傷衛症曰太陽之為病脉浮在經為表頭項強痛而惡寒凡

太陽者皆本此而腰背及病有發熱惡寒者發于陽也三陽無

熱惡寒者發于陰也陰寒直發于陽者七日愈發于陰者六日

愈以陽數七陰數六也此本河圖生成太陽病欲解時從已至

未上指經氣旺時也欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脉浮

在表故知汗出解也

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

太陽中風陽浮舒氏關前為陽以候衛分而陰弱關後為陰以候營分陽浮者熱自發

諸病是皆三陽三陰之別也



病狀稍不  
似此不可  
用桂枝湯  
也  
漢之分兩  
今不可從  
多至二三  
錢足矣餘  
倣此  
一之氣厥  
陰風木司  
令是正傷  
風症故立  
桂枝一湯

陰弱者汗自出。啗啗。寒束惡寒。漸淅。肌理疎。惡風。翕翕。狀滋潤。  
發熱鼻鳴乾嘔。此兼陽明經也。者桂枝湯主之。

桂枝湯○桂枝 白芍 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚

味水煎每服一升。日三服。服已啜稀粥一升。餘以助藥力。溫覆。

取微汗。無汗再服。忌粘滑肉麵五辛酒醋臭惡等物。

喻氏曰桂枝使邪從汗出而汗自止。非桂枝能止汗也。觀復

發其汗宜桂枝湯其意可見。○陶節菴加白朮川芎羌活防

風飴糖名疏邪實表湯治同。按加白朮燥土不如加當歸以

和血風尤易散俗謂當歸寒滑引寒入裏不經之言也。

酒客不可與桂枝得湯則嘔以酒客不喜甜故也。○發汗後水

藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止。○太陽病發熱汗出



桂枝之不  
可妄用也  
如此

吳氏審係  
協熱下利  
即用承氣  
逐去宿矢  
利乃止用  
歸芍清燥  
養榮

者。此為營弱衛強。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯。○病常自汗出者。為營氣和。營氣和者。外不諧。以衛氣不共營氣和諧。故耳。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。  
王宇泰注。活人書。言萬歷間。士子應試。時盛暑熱病。一醫投以桂枝湯。入腹即斃。蓋麻桂二湯。冬時用之。尤必慎之又慎。若施之溫暑熱病。寧無害乎。

太陽上篇病桂枝症。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。葛根黃連黃芩湯主之。  
此方兼治暑暍溫疫

葛根黃連黃芩湯。○葛根半斤 甘草二兩 黃連三兩 黃芩二兩

按太陽誤下。遂協熱下利。火逆而上喘。已犯陽明。裏熱故重。用葛根以升下陷之胃陽。餘皆清熱之品也。其症必見發熱。

口渴便赤方可用之無疑而分兩亦不可從也

惡寒惡風  
脉緊無汗

太陽中篇

寒傷  
營症

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體重嘔逆

病狀稍不  
合不可妄

脉陰陽俱緊者

名曰傷寒

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節

用麻黃也  
無汗脉緊

疼痛惡風無汗而喘者

麻黃湯主之

此方大表故例禁甚多

與桂枝症  
有汗脉緩

麻黃湯

麻黃

桂枝

各三  
兩

杏仁

十七枚  
去皮尖

甘草

虛實反對  
不可忽暑

微汗中病即止不必盡劑無汗乃再服

○凡用麻黃去根節醋

六之氣太  
陽寒水司

湯暑泡曬乾或蜜炒庶免大發冬月生用

令是正傷  
寒症故立

節菴加羌活防風白芷升麻川芎薑葱引名升陽發表湯治

前症頭痛如劈神效若汗不止加黃芪寒氣重甚其人本氣

麻黃一湯

素寒服表藥不得汗者則為陽虛不能作汗節菴用再造散

古之人參  
即今之黨

黃芪熟附人參桂枝白芍甘草細辛羌活防風川芎夏加黃

黃芪熟附人參桂枝白芍甘草細辛羌活防風川芎夏加黃

黃芪熟附人參桂枝白芍甘草細辛羌活防風川芎夏加黃

參病在表可偶用之  
熱入裏及咳家皆不可用又陽虛之症必日重夜輕而惡寒之狀必甚發熱必輕又溫疫病桂枝不可用也陰虛症必日輕夜重而不惡寒桂枝尤不可用也此言其序耳不可以時拘也

芩石膏藥多止汗而反發汗以其大助陽氣鼓舞陰寒而汗

始出也又津液素虧人服表藥不汗者為陰虛不能作汗

大熱病在午後劉松峯用歸柴引當歸一兩柴胡五錢甘草二錢便

漚加蒼朮錢一葛根錢一虛加洋參錢一生薑源按肥人陽虛不

作汗者雖有表症其熱不甚其病多在已前故可暫用參附

溫補雖在夏石膏黃芩不必加也瘦人陰虛不能汗者身必

燥熱其病多在午後表藥中當兼歸地以助津液可也

傷寒一日巨陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若煩躁脉數急

者為傳也傷寒二三日陽明少陽症不見者為不傳也○脉浮

數者可發汗宜麻黃湯服藥已微除其人發煩目瞋劇者必衄

衄乃解所以然者陽氣即熱重故也○太陽病脉氣緊發熱身

無汗自衄者愈

忌表諸症○咽喉乾燥者津液已虧不可發汗○淋家不可發汗發

汗則便血○瘡家身雖疼痛不可發汗汗出則瘡項強反張有汗為柔瘡無

汗為衄家不可發汗汗出必額上陷將轉陽明脉緊急筋失養也目直視

不能眴不得眠熱甚胃不和故臥不安已入陽明矣○亡血家不可發汗汗則寒

慄而振○汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹餘糧丸

喻氏云禹餘糧丸原方闕然不

按心中原有津汁三合汗出于心過汗令人津汁枯竭致人

不壽故悞汗之害甚于悞下常見時人服麻黃至五錢者大

汗亡陽而死舒氏所謂津液既去亦兼亡陰者此也又有汗

悞用麻黃為虛虛無汗悞用桂枝為實實如此死者醫殺之

也故麻桂二方為表中之一虛一實不可不知也

二條表中  
兼虛實法  
也

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗後惡寒者虛也不惡寒反惡熱者實也當和胃氣與調胃

承氣湯

方見陽明

芍藥甘草附子湯○芍藥三兩甘草三兩附子一枚

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩

新加湯主之

舌心黃者服此反為大害

即桂枝湯內加芍藥生薑各一兩人參三兩

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁

甘草石膏湯主之發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

麻黃杏仁甘草石膏湯○麻黃四兩杏仁五十枚甘草二兩石膏半

發汗後腹痛脹滿者厚朴生薑半夏人參湯主之

實痛手不可近不可

此條表中  
兼升降法  
也

大陽表  
李光明注



北京中醫藥大學圖書館藏  
1664

用參虛痛  
喜手按乃  
可用參

汗出解後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利宜生薑瀉心湯主之

生薑瀉心湯○生薑 甘草 人參 黃連 大棗

太陽下篇風寒兩傷營衛太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出

而煩躁者大青龍湯主之若脉微汗出惡風者不可服服之則

厥逆筋惕肉瞤此為逆也以真武湯救之

大青龍湯○麻黃六兩桂枝 甘草各二兩杏仁四十粒生薑三兩

大棗十二枚石膏如雞子大七味煮三升溫服一升取微似汗凡汗出

多者以溫粉撲之白朮 藁本 川芎 白芷等分研末每一

兩入米粉三兩盛絹袋周身撲之

喻氏曰青龍名者取內經人之汗如天雨之義後云無少陰

喻氏太陽  
上篇風傷  
衛用桂枝  
中篇寒傷  
營用麻黃  
下篇風寒  
兩傷營衛  
用大青龍  
湯然亦不  
必盡拘