

卷十一
春溫門

冬傷於寒春必病溫為一大例

金匱啟鑰

金匱啟鎖卷十一


漉江黃朝坊妙山輯著

春溫門

讀仲景書其論傷寒詳矣。獨治溫法度錯出。傷寒之中。後人鮮悉義例。漫無成法。可師。西昌喻氏嘉言奮起百世之下。勒爲定論。如云。冬傷于寒。春必病溫。卽傷寒邪中三陽之謂也。又云。冬不藏精。春必病溫。卽傷寒邪中三陰之謂也。兼云。冬傷於寒。冬不藏精。卽陰陽兩感之謂也。于是併分三大例。以爲綱。大開二十九條法門。以爲目。夫固班班可考矣。乃世之業醫者。見聞未廣。如三註上論等篇。及治溫諸

書所謂春陽大泄。解肌自散。均未一觀。故一見寒熱輒舉麻黃湯。暨五積九味。表劑諸方。此初彼繼。展轉於表。葯中者不一而足。夫以陽葯治不藏精者。勢必令陰中之真陽因之外越。能不促其亡耶。且以發汗治冬傷於寒者。汗愈出而邪愈熾。甚至津枯便燥。本非邪入內結。又投通聖等葯。內外俱傷。而有不危困而同歸于斃者。未之有也。此予素所目擊。心愴不勝撫膺而悼嘆矣。仍臚列三條。采証治之錯。散集而成歌焉。但其中有以芩連干葛施于汗下后。汗出而喘者。有以麻黃升麻湯治下后咽痛唾血。下利不止者。有醫以充瀉誤下。投枝子干薑者。謂此爲叔和之僞撰。誠如集証所逐指也。且兩感中領

邪則用桂枝。加生地清陽。濕火則用桂枝加大黃立法如斯。不幾事
治大陽而遺少陰乎。況生地能領少陰之邪。彼溫經散表之方。將安
用哉。久懷疑竇。以候明哲。其折之焉。



此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertong

謹將冬傷於寒春必病溫定爲一大例

有化論四
昌而泥不
受化者死
不見溫症
辨耶

人之冬傷于寒也。其始藏于肌膚。感春月之溫氣而乃發焉。肌膚者。陽明胃經之所主也。陽明經久鬱之熱。一發而外達於大陽。脈多浮緩。間亦浮數。有客惡寒而卽發熱者。有大熱而全不惡寒者。有表未除而裡已先寔者。有邪久據大陽一經者。有從陽明而外達大陽者。有從大陽轉歸陽明者。有自三陰傳入胃腑者。亦有從大陽循經偏傳三陰者。如冬月傷寒之例者。大率大陽陽明二經是邪所蟠踞之地。在大陽則寒傷營之証十不一見。在陽明則譫語發斑衄血發黃脾約等証。每每兼見。而凡發表不達熱之法。適足以增溫病之

困阨耳。況乎治大陽之症。其法不與冬月同。蓋春月風傷衛之証。或有之。而寒傷營之証。則無矣。若用大發大表之藥。則必大汗出而變起矣。一解肌而自散。比之傷寒。大有不同。而世之掘指云某日某經某日傳經已盡。究竟於變病之經。不能摸索。以求良治。所謂一盲而引衆盲。將入火坑也。冤哉。生命古今誠無所控告矣。

証治歌

內有三法。解肌法。吐法。下法。

治瘟法。首解其肌。發熱頭疼。湯桂枝。有汗惡風。桂枝加葛妙。汗無升。

麻葛根湯相宜。葛根葱白湯難少。瘧症施方莫妄爲。人參敗毒散。參。

蘇飲。醫櫬用春和未熟。如當時。熱時溫病暑病。療此二。解肌未罷寒。

仍惡肌熱。治身病。肌熱。肌解。后。新加湯。可。

維持解肌。多汗。悸。思。按桂枝。草湯。按古用之。不及附者。湯極美。桂枝。

不用畏陽離。奔豚。欲作。臍痺。悸。枝。甘草。大棗湯。投。謬。后。批。桂枝散。陽。

陰愈盛。吳英。四逆。湯。治無遺。肌經散。後腹中滿。厚朴。生薑。人參。湯。欠。

養滋。過汗。傷中。厚朴。又損黃芪湯。服效。堪期。解肌熱。渴。脈微。數。溺。澹。

五苓正可。醫肌解渴。煩洪。大脈。人參。白虎湯。難移。渴而身熱。洪長脈。

白虎湯。投壽考。祺。濕熱。重身。蒼朮。入桂。加白虎。可清肌元。參。升。麻。泄。

胃兼清腎。竹葉石。羔。湯。徹熱。熾。氣結。痠。凝。痛。用吐。枝。子。豆。豉。湯。灰。粉。

散。無分岐。未經。誤。下。方宜用。切莫輕投。致怨。咨。和。鮮。小。柴。胡。最。妙。熱。

微參去桂枝隨渴兼寒熱亦參去花粉當加無細疵。薑棗人參因咳
棄干薑五味可加。齊疎風小續命除麻黃附獨活湯風引湯皆起危
發熱脈浮渴欲飲。猪苓湯利下開。鋋辰砂天水散獨天水散分利兼
清人少知。瘥后脾虛腎水泛腫浮腰下漫驅馳。古方壯力澤瀉散不
無議。新立鹿參湯思匪夷。胸按痛疼需蕩結。一投小陷胸湯功堪推。
古人三物散難棄。全賴醫通酌解圍。肌解渴蒸寒不惡。湯宜調胃。承
氣蕩中羈。僅形惡熱症無下。知母石羔清莫追。胃熱無虛津液燥。便
鞭腹滿舌芒。韓大柴胡湯調胃大承氣湯視病輕重分倍莖。下后仍
煩有燥矢。大承氣湯進莫印須下。而脈促滿胸膈。去芍桂枝湯稍變。

規力附因寒於鮮合新方芪附不余其用九訓下微煩熱梔子干薑

湯內忌梔。大下氣衰陽外薄。六君薑附復陽虧。下而汗利。脈促兼喘。

干葛芩連恐愈衰。下損脾陽腎氣煥。湯宜參附建功奇。下而身熱。結

痛用梔。鼓砂蔻理中。湯有異思。下后腹疼煩不卧。若抄梔。子厚。朴啟

譏詞。胸陽下損難宣布。砂半湯投福履綏。下后利頻脈不至。厥而寸

脈切沉遲。咽喉不利吐膿血。雖進麻。黃升。麻湯。莫起瘕。病連附湯加

阿膠。麥冬。入此湯不效。倘依誰下而傷血脈來瀉。葶。苦。酒湯調不

可師。汗下陰陽俱已敗。十全。大補。湯加附而培滋。黃連湯妙熱清解。犀

角黃連涼不辭。黃連。龍骨。湯黃連。阿膠。湯及黃連。解毒。湯。橘皮。湯。同

金匱要略卷之十一 春溫冬傷于寒 五

全圖... 卷一... 五

上黃連隨發斑痘毒嘔而逆。葑汁黑膏和豕脂養血生津。炙甘草湯。

妙。棗仁湯。五味子散。起衰羸。芍藥甘草阿膠散。古定均於養血是專。

司滋陰涼血亦難緩。犀角地黄湯。一厄補益養營。湯。君子六理中湯。

好或歸脾。湯。建中用。小助脾胃。不足虛勞加熟者。兩角大陽疼痛苦。

鼻中灰蒂。出黃水。愈。蓄揚眉。

脈

傷寒之脈弦緊。溫病之脈浮弱。是故脈浮者。須知邪熱之勝微浮者。

必是胸中有寒。乍緊邪結在胸。脈數客熱在胃。脈寔晡熱症在陽明。

其脈浮虛。大陽之病。脈見微數。陰虛陽熾之診。若見洪大。虛中實熱。

之候。辨后脈細。症未罷。解后脈沉虛。宜知身熱洪長。陽盛之症。發熱脈浮。寒鬱之形。下后脈促。寒未罷。汗下脈促。損陽虧。下后不至。或沉遲。寒抑真陽。宜升舉。下后脈滿。必陰被戕。六部不至。陰陽俱敗。細審詳診。庶幾無悞。

方歌

葛根葱白湯

葛根葱白及川芎。知母生薑芍藥均。配合水煎宜熱服。溫中解散古方遵。

人參敗毒散

治傷寒頭痛憎寒壯熱。項強睛暗。鼻塞身重。風痰咳

嗽及時氣疫厲等証。

人參敗毒甘草雲苓枳壳桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎白芍

少許薑三片時行疫癘用皆靈。

參蘇飲 治外感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰塞中焦眩暈嘈煩傷

風泄瀉及傷寒已汗發熱不止。

參蘇飲內有陳皮只壳前胡半夏宜乾葛木香甘草枳梗茯苓

生薑紅棗紫蘇隨。

人參新加湯 治傷寒汗后身痛脈來沉遲。

新加本是桂枝湯加入人參與生薑倍芍收陰薑解表和同甘

獨活湯 治風虛痠疼。昏憤不覺。或爲寒熱。

獨活湯中羌

活獨活

防風川

芎藭

當歸細辛

半夏

桔梗人參

黃芩

扶神遠志白微

甘草

昏憤痠疼用皆良。

風引湯

風引湯治風火熾滑

石石

羔龍

骨杜

蠲甘

草大

黃役

赤石

脂白

石脂

紫石英干薑桂枝凝水石。

天水散

治傷寒中暑。表裏俱熱。煩燥口渴。小便不通。瀉痢熱瘧。霍

亂吐瀉。下乳滑胎。解酒食毒。偏主石淋。

河間天水卽六一散
消石甘草配宜的研末調服用之良可療
寒暑痢瘧疾。

辰砂天水散

辰砂天水藥無多卽是六一滑石甘草和加入辰砂水飛研服之亦可起沉痾。

元參升麻湯 治發斑咽痛。

元參升麻甘草散 毒制火用皆良。一入陽明一入腎發斑咽痛急須嘗。

砂礬理中湯

人加減施。

麻黃升麻湯

麻黃升麻

湯內首麻

黃當歸

白芍

芩

茯苓

白朮

甘草

草薢

桂參

石羔天冬

桂枝

陰虛

陽陷

脈沉

良

葶藶苦酒湯

葶藶苦酒

艾汁

艾

無新葉

陳

猶鮮

一酸

一苦

交相

濟瀉

熱助

陰和服痊。

黃連龍骨湯

黃連龍骨湯黃連龍骨黃芩芍藥全不用引煎溫服好熱清毒
解效通仙。

黃連橘皮湯

黃連橘皮湯麻黃干葛橘皮厚朴良甘草杏仁不用引水煎一
服自然康。

黑膏

黑膏治瘟嘔逆艱猪脂生地沒鼓摻入雄豆大射少許服之諸
症自能刪。

炙甘草湯

治傷寒脈結代心動悸及脈痿咳唾多心中溫溫夜夜