

景岳全書卷之四十七賢集

曾稽 張介賓 曾卿著

曾稽 魯 超 謙菴訂

外科鈴

下

發背

四十二

發背屬督脉膀胱經凡陰虛火盛或醇酒厚味或鬱怒房勞或

丹石熱毒皆能致之若腫赤痛甚脉洪數而有力者熱毒之

證也爲易治若漫腫微痛色黯作渴脉雖洪數而無力者陰

虛之證也爲難治若不腫不痛或漫腫色黯脉微細者陽氣
虛甚也尤爲難治大抵發背之證其名雖多總惟陰陽二證
爲要若發一頭或二頭其形焮赤腫高發熱疼痛頭起者爲
癰屬陽易治若初起一頭如粟不腫不赤悶痛煩躁大渴便
秘睡語咬牙四五日間瘡頭不計其數瘡口各含如粟形如
蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至數日或八九日其
頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛爲一
瘡其膿內攻其色紫黯者爲疽屬陰難治且此證不可大痛
又不可痛若見煩悶者多不治總之瘡瘍雖云屬火然未有

不由陰虛而致者故經云督脉經虛從腦而出膀胱經虛從背而出故不可專泥于火

陳良甫曰背疽之源有五一天行二瘦弱氣滯三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙燂服丹藥

立齋曰大抵發背之證雖發熱疼痛形勢高大煩渴不寧但得脉息有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸證悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒藥攻之反致誤事若有膿急針之膿一出苦楚卽止膿未成而熱毒作痛者可用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡證則投以大補之劑肉最

易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不掀痛脉無力不飲食
腫不潰腐不爛膿水清或膿多不止皆屬元氣虛也爲難治
宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚濃水臭敗煩躁時嗽腹
痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡證也皆不可治

又灸法曰予常治發背不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚
但未成膿或不潰者卽與灸之隨手取效或麻木者明灸之
毒氣自然隨火而散或瘡頭如黍者灸之不效亦有數日色
尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更
服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑其有勢未定者或先用箍藥

圍之若用烏金膏點患處尤妙凡人初覺發背赤熱腫痛莫辨其頭者但以濕紙覆其上立候視之其紙有先乾處卽是結癰頭也取大蒜切成片如二三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方止最要早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六七活五日六日三四活過七日則難爲力矣若有十數頭作一處生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上一初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚者正安于瘡上灸十四

壯多至四十九壯蓋如此惡證惟隔蒜灸及塗烏金膏有效
又治法曰腫硬痛深脉實者邪在內也可下之○腫高熇痛
脉浮者邪在表也宜托之○熇痛煩躁或咽乾火在上也宜
瀉之○腫高或不作膿者邪氣凝結也宜解之○腫痛飲冷
發熱睡語者火也宜清之○不作膿或不潰不斂者陽氣虛
也宜補之○瘰肉不腐或積毒不解者陽氣虛也宜助陽氣
○膿多或清者氣血俱虛也宜峻補之○脉浮大或濇而肌
肉遲生者氣血俱虛也宜補之○右關脉弱而肌肉遲生者

又諸毒治法曰如頭痛有表證者宜先服人參敗毒散一二劑○如焮痛發熱脉數者用金銀花散槐花酒神功托裏散○如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸○腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沉實者內疎黃連湯或清涼飲○大便已通欲其作膿宜仙方活命飲托裏散蠟礬丸外用神異膏○如飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處俟有瘡口卽用紙作撚蘸烏金膏紐入瘡內○若有膿爲脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者

去之若瘀肉腐動用猪蹄湯洗之○如膿稠或痛飲食如常
瘀肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用前二膏塗貼○
若腐肉已離好肉者宜速去之○如膿不稠不稀微有疼痛
飲食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裏藥○若瘀肉
不腐或膿清稀不焮痛者急服大補之劑亦用桑木灸之以
補接陽氣解散鬱毒○常觀患疽稍重未成膿者不用蒜灸
之法及膿熟不開或待腐肉自去則多致不救○天抵氣血
壯實或毒少輕者可假藥力或自腐潰若怯弱之人熱毒中
隔內外不通不行針灸藥無全功矣○此證若膿已成急宜

開之否則重者潰通臟腑腐爛筋骨若使透膈則不可治輕者延潰良肉難於收功因而不斂者多矣

又諸補治法曰若腫厥作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘也先用仙方活命飲後用托裏消毒散解之○漫腫微痛或色不赤飲食少思此形氣病氣俱不足也用托裏散調補之○不作膿或膿成不潰陽氣虛也托裏散倍加肉桂參芪○膿出而反痛或膿清稀氣血俱虛也八珍湯○惡寒形寒或不收斂陽氣虛也十全大補湯○腫熱內熱或不收斂陰血虛也四物加參朮○作嘔欲嘔或不收斂胃氣虛

也六君加炮薑○食少體倦或不收斂脾氣虛也補中益氣湯加茯苓半夏○肉赤而不斂血熱也四物加山梔連翹○肉白而不斂脾虛也四君加酒炒芍藥木香○小便頻數者腎陰虧損也加減八味丸○大抵瘡毒勢甚若妄用攻劑怯弱之人必損元氣因而變證者衆矣

又三證治法曰若初患未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊也仙方活命飲若口乾飲熱漫腫微痛此元氣內虛也托裏消毒散若飲食少思肢體倦怠此脾胃虛弱也六君子湯如未應加薑桂其有死者乃邪氣盛真氣虛而不能發

出也在於旬餘之間見之○若已發出用托裏消毒散不腐
潰用托裏消毒散如不應急宜溫補脾胃其有死者乃真氣
虛而不能腐潰也在於二旬之間見之○若已腐潰用托裏
散以生肌如不應急溫補脾胃其有死者乃脾氣虛而不能
收斂也在於月餘見之此三證雖不見於經籍余嘗治而歷
驗者

千金方灸法治發背已潰未潰者用淡荳豉以水和搗成硬泥
依腫大小作餅三四分厚如已有瘡孔勿置瘡孔上但四布
豆餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉如熱痛急少起之日

灸二度如先有瘡孔孔出汗卽瘥
一驗透膈法凡背疽大潰欲驗穿透內膜者不可用皂角散噫
手法但以紙封患處令病者用意呼吸如紙不動者未穿透也
倘用取噫法鼓動內膜則反致穿透慎之慎之

都憲周弘圖背患疽腫而不潰脉大而浮此陽氣虛弱而邪氣
壅滯也用托裏散倍加參芪反內熱作渴脉洪大鼓指此虛
火也用前散急加肉桂脉證頓退仍用托裏而愈若以爲熱
毒而用寒藥則誤矣○上舍張克恭患此內服外敷皆寒涼
敗毒遍身作痛欲嘔少食晡熱內熱惡寒畏寒余曰遍身作

痛營衛虛而不能營於肉裏也欲嘔少食脾胃虛寒而不能
消化飲食也內熱晡熱陰血內虛而陽氣陷於陰分也惡寒
畏寒陽氣虛弱而不能衛於肌肉也此皆由脾胃之氣不足
所致遂用補中益氣湯諸證漸退更以十全大補湯腐肉漸
潰又以六君子湯加芎歸肌肉頓生而愈○府瘁彭碧溪患
腰疽服寒涼敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪黍背重不能安
寢耳聾目白面色無神小便頻澀作渴逆悶氣粗短促脉浮
數重按如無余先用滋水之藥一劑少頃便利渴止背卽輕
爽乃砭出瘀血以艾半觔許明灸憲處外敷烏金膏內服參

芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不
用手足並冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一
錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補
氣血而愈○上舍蔡東之患此余用托裏之藥而潰瘡口尚
未全斂時值仲冬且兼咳嗽余曰瘡口未斂脾氣虛也咳嗽
不止肺氣虛也法當補其母一日與之全宴見忌羊肉余曰
補可以去弱人參羊肉之類是也最宜食之遂每日不徹旬
餘而瘡斂敎亦頓愈矣○一男子年踰五十患發背色紫腫
痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血卽

鼾睡覺而諸證如矢服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆
出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而歛夫瘡勢
熾甚本宜峻劑攻之但年老血氣衰弱况又發在肌表若專
於攻毒則胃氣先損必反誤事

俱薛按

予長男於二週患背疽治按在腫瘍條中

新按

一論外通用方

神仙薰照法

外一二三

腦疽

四十三

立齋曰腦疽屬膀胱經積熱或濕毒上壅或陰虛火熾或腎水

虧損陰精消涸所致○若腫痛未作膿者宜除濕消毒○大
痛或不痛或麻木者毒甚也隔蒜灸之更用解毒藥○腫痛
便秘者邪在內也宜泄之○不甚痛或不作膿者虛也托裏
爲主○膿成脹痛者針之更以托裏○上部脉數實而痛者
宜降火○上部脉數虛而痛者宜滋陰降火爲主○尺部脉
數而作渴者滋陰降火○脉數而虛細無力或膿清或不斂
或膿多者大補血氣○不作膿或不潰者托裏藥主之○煩
躁飲冷脉實而痛者宜瀉火
又治法曰初起腫赤痛甚煩渴飲冷脉洪數而有力乃濕熱

上壅當用黃連消毒散並隔蒜灸以除濕熱○若漫腫微痛
渴不飲冷脉洪數而無力乃陰虛火熾當用六味丸及補中
益氣湯以滋化源○若口舌乾燥小便頻數或淋漓作痛乃
腎水虧損急用加減八味丸及前湯以固根本而引火歸經
○若不成膿不腐潰陽氣虛也四君加歸芪○若不生肌不
收斂脾氣虛也十全大補湯○若色黯不潰或潰而不斂乃
陰精消涸名曰腦爍爲不治若攻補得宜亦有可愈○大凡
腫焮痛甚宜活命飲隔蒜灸之以解散瘀血拔引鬱毒但艾
炷宜小而少若欲其成膿腐潰生肌收斂並用托裏爲主