



丹溪心法

卷五



丹溪先生心法卷五

新安吳勉學

校

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血。六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也。若夫要害處近虛怯薄處前哲已曾論及。惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽。理宜預防。以其多氣少血肌肉難長。瘡久未合必成死症。遽用驅毒利藥以伐其陰分之血。禍不旋踵。陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱瀉陽滯以寒治之陰滯以



熱治之 人中年以後不可生癰纔有痛脉參之脉

証但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅

熱拔毒紓氣之藥虛虛之禍如指諸掌 內托之法

河間治腫燉于外根盤不深形証在表其脉多浮病

在皮肉非氣盛則必侵於內急瀉內托以救其裏宜

復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料

飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱

已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能

內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於此

小瘡與冬月時今即可若潰瘍於夏月用之其桂朴

之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚杖  
一婦年七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉  
且瀉急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌人  
參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身  
汗睡覺病已失此內托之意又一男子年五十形  
實色黑背生紅腫及脾骨下痛其脉浮數而洪緊食  
亦嘔正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附瓜蒌子  
甘草節羌活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消此  
正內托之法非精要內托散乳香萊豆等藥想此方  
專為服丹石而發疽者設不因丹石而發恐非必用

之劑、瘡先發為腫、氣血鬱積、蒸肉為膿、故其痛多  
以瘡之始作時也、膿潰之後、腫退肌寬、痛必漸減、而  
反痛者、此為虛、宜補、亦有穢氣所觸、宜和、解風寒通  
者、宜溫散、

○腸癰

大腸有痰積、死血流注、

桃仁承氣湯加

連翹、秦艽、近肛門破入風者、難治、防風之類、

○乳癰

乳房陽明所經、乳頭厥陰所屬、乳子之母、

不知調養、怒忿所逆、鬱悶所遏、厚味所釀、以致厥陰

之氣不行、故竅不得通、而汁不得出、陽明之血沸騰、

故熱甚而化膿、亦有所乳之子、隔有滯痰、口氣燉熱、

或時而腫熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛  
揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤  
治法踈厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行  
汙濁之血以生甘草之節消腫導毒以瓜蒌子或加  
凌藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減  
隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三壯於  
腫處其効尤捷不可輒用針刀必至危困若不得於  
夫不得於鼻姑憂怒鬱悶斯夕積累脾氣消阻肝氣  
橫逆遂成隱核如大棋子不痛不痒數十年後方為  
瘡陷若曰妳岩以其瘡形■凹似岩穴也不可治矣

若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

乳癰方

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節

破多加參茸

右以水煎入酒服

乳癰妳勞燼腫

石膏煨

樺皮燒瓜蒌子

甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核



南星

貝母

甘草節

婁略

連翹半兩

右以水煎入酒服

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節

乳岩小破如柴胡川芎

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢甘草三錢當歸三錢



吹煉  
右作一服水煎入酒少許熱飲

金銀花 大蕎麥 紫葛藤等分

可  
右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦

乳栗破 少有破必大補

人參 黃芪 白朮 當歸

川芎 連翹 白芍 甘草節

右以水煎服

附骨癰



熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破散  
養血初腿腫以人參黃連茯苓各二錢瓜蒌子四  
十八粒作二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼朮佐黃柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月  
加條芩芩體虛者加牛膝以生甘草為使大料煎  
入姜汁帶辣食前飲之病深者恐木栢桂枝十數  
貼者不動加少麻黃二三貼又不動恐癰將成矣  
急掘地坑以火煨紅沃以小便赤體坐其上以被  
席圍抱下截使熱氣重蒸腠理開氣血暢而愈



鐵圍散

治癰疽腫毒

乳香

沒藥

半兩

大黃

黃連

南星

半夏

皂角

木鱉子

瓜蒌

草烏

阿膠

甘草節

防風

黃柏

圍藥

諸般癰疽傳上消散

右為末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌



阿膠

皂角刺

石研為細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒

用

圍藥鐵井欄

貝母

南星各七錢連翹

五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右碾為細末用水調傅四向腫處止留中間一竅

出毒氣

隔反取膿法

馬蹄

細切

蕎麥麵一兩白鹽半兩草烏四錢

丹溪心法

卷五

六



右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末  
醋調成膏目白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫

自退

騎馬癰

用大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙  
水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頓服效

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

又疽癰方

草烏

黃連

紫荆皮

白芷



大黃

芙蓉皮

樛硝

粳米各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調

黃末圍疔

穴大小前後敷前藥末

一人肚門生癰久不收口有針竅三孔勞力則有膿

黃芪

條芩

連翹

秦艽

右為末神麴糊為丸

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火

煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸

如粟大以帛撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸五分

瓜蒌仁三錢

代赭一錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌

桃仁

草龍膽

右咬咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服一方加酒大黃

附方



中國醫藥大學圖書館版權所

消毒飲○治便毒初發三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

瓜蒌仁等分

立效  
咬咀水酒各半煎食前溫服仍頻提製頂中身

機要內托復煎散○

癰疽托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

白芍

人參

黃芪

白朮

桂枝

甘草

防已

當歸略一

防風三兩

右咬咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去木入



北京中医药大学图书馆版权所有

前十二味再煎至二四盞取清汁分三四次終  
日飲之又煎蒼朮粗為湯去粗依前又煎前  
二味粗分飲之

內疎黃連湯

洪實者

治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便秘

黃連

芍藥

當歸

枳櫛

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草略一連翹二兩大黃二兩半

右吹咀每服一兩入姜煎

疔癰八十六

