

醫燈續焰卷二

錢塘後學潘 樞碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人 汪之琦奇玉 校

支希璋玉森

浮脉主病第十六

浮脉主表。裏必不足。有力風熱。無力血弱。浮遲風虛。

浮數風熱。浮緊風寒。浮緩風濕。浮虛傷暑。浮芤失血。

前一段浮脉  
止言脉狀此

一段以浮脉  
爲宗而以諸

症統屬自得  
學脉之要後  
沉脉及遲數  
等做此

浮洪虛火。浮微勞極。浮濡陰虛。浮散虛極。浮弦痰飲。  
浮滑痰熱。

皮毛曰表。言在外也。浮脉與皮毛相得。亦有勢汎  
汎外浮者。皆主表。氣應於表。其裏必虛。故裏不足。  
浮亦主風。浮而有力。風熱所爲。蓋風爲陽邪。其性

輕浮動蕩。加之以熱。勢必壅盛。故有力也。宜荆防  
羌活。芩

梔石羔無。力。則浮而虛矣。血主裏。氣主表。血弱不  
之類。

能諧氣。故反浮。亦裏不足之義。宜參耆四  
物湯之類。脉浮而

每症下註以  
方藥欲便選  
劑施治此不  
過言其大槩  
在人擴充不  
可拘執故曰

類所該甚

遲則至數遲

緩為來勢緩

須細心體會

濕為陰邪故

濡漫緩懈

遲。乃鼓動之不及也。為風虛。宜四君子湯。或防桂參耆之類。脉浮

而數。乃鼓動之太過也。為風熱。宜荆防膏薄。梔芩丹皮生地之類。

脉浮而緊。緊則緊飲。寒之性也。風中有寒。宜九味羌活湯。

麻黃湯。或蘇薷羌杏姜葱之類。脉浮而緩。緩則緩漫。濕之性也。風

中有濕。宜羌防蒼白朮。防已黃耆桂附之類。浮虛傷暑者。暑傷乎氣。

氣主浮外。而暑性張散。故傷暑者多汗。經曰。脉虛

身熱。得之傷暑者是也。宜清暑益氣湯。十味香薷飲之類。浮乳失

血者。血去脉空耳。蓋衛行脉外。榮行脉中。血失則

榮損。榮損。則脉中空如芤草之狀也。

宜參耆歸芍。或當歸補血

湯。瓊玉膏之類。

脉浮而洪。充湧指下。火之象也。但浮則有

表無裏。故曰虛火。

宜當歸補血湯。四物湯。六味丸。八味丸之類。

浮微勞

極。陽氣欲絕也。素問生氣通天論曰。陽氣者。煩勞

則張精絕。辟積於夏。使人煎厥。目盲不可以視。耳

閉不可以聽。潰潰乎若壞都。汨汨乎不可止。蓋言

陽氣清淨。煩勞。則陽精張散而竭絕。積于夏長之

時。當振發而反退陷。故變病如上。是名煎厥。煎厥

者。氣應振而反糜。應出而反入。如煎迫之自外及

裏。煎熬之由多漸少。卽難經十四難所謂。自皮毛

以及于骨之五損。從上下者是也。今之五勞六極。

虛怯損瘵。皆煎熬之類。陽主浮。以其因于耗陽。故

脉浮微耳。

宜十全大補湯。生脉散。大造丸。四君子湯。八珍湯之類。

脉浮而濡。

衰薄之甚。僅有其上。若無其下。故主陰虛。

宜四物湯。六味

丸之類。

若浮而散。則又陰虛之極矣。陽在外。陰之使。

陰在內。陽之守。陰虛極而不能爲守。則陽無所依。

三焦宣布描  
寫曲盡蓋人  
身穀精運用  
毋容停滯三

浮越而散。略無陰凝內歛之象。故陰虛劇。然而孤

精於內。氣耗於外。謂之陰陽兩虛亦可。宜十全大補湯。金匱

腎氣丸之類。脉浮弦者。痰飲。痰飲何自而生乎。素問經

脉別論曰。飲食入胃。遊溢精氣。上輸于脾。脾氣散

精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經

並行。又榮衛生會篇曰。上焦如霧。中焦如漚。下焦

如瀆。二說雖殊。其理則一。方飲之。由胃遊溢而上

輸于脾也。腐熟如酒酵之噴發。炊釜之沸騰。卽中

焦宣布之力也。停則爲飲。滯則爲痰。隨所在而見症。非唯痰飲爲然。節噎膈反胃吐瀉閉瘕之候。其機亦不外此。所謂知常始能達變。達變始可復常。若不了然。恐難下手。

焦之如漚。由脾散精而上歸于肺也。拔粹升純。氤氲若喫。卽上焦之如霧。由肺之通調而下輸膀胱也。氣化開通。溲便注泄。卽下焦之如瀆。名雖有三。實則一氣。若氣虛寒不運。則飲亦停畱不行。隨不運之處停畱。則隨停畱之處見病矣。大約暴則爲飲。久則成痰。清薄則爲飲。濁厚則成痰。寒多則爲飲。熱多則成痰。熬汁收膏。煮水結鹽之義也。弦乃陰脉。爲陽不足。仲景云。弦爲陽運。正言陽之不能

運也。又云。沉潛水蓄。支飲急弦。俱言陽氣衰弱。不

能運行其飲。故見此弦歛不鼓之脉耳。

宜金匱苓桂朮甘湯。

小青龍湯之類。

水飲應沉而言浮者。當在上焦。若浮而滑。

則非弦歛不鼓之脉。寒當化熱。飲當成痰。此必然

之理也。

宜二陳湯。或梔芩花粉玄明粉之類。

### 附方

參耆四物湯

治血虛。氣不能與之諧。反上氣喘

促。自汗惡寒。面白脉浮。按之空澁。或曾經失血

者。

人參 一錢

黃耆 二錢 蜜炙

當歸 二錢

熟地黃 二錢

白芍藥 酒炒 一錢半  
芩薊 八分

右爲粗末水二盞煎七分溫服

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脉弱加陳皮名

異功散加陳皮半夏名六君子湯。

白朮 人參 茯苓

甘草 各等分

釋曰白朮強  
土健運茯苓  
滲濕燥脾其  
草守氣于中  
宮人參益氣  
于五藏皆主  
脾胃者以人  
身真氣卽水

穀之氣也四藥中和平澹而能補氣維陽誠君子哉

梔曰雖是攔江網然亦平正可用

右爲粗末。每服五錢。水一盞。煎至七分。食遠溫服。

九味羌活湯

羌活

防風

蒼朮

各一錢二分半

甘草

白芷

川芎

生地黃

黃芩

各一錢

細辛

四分

加生薑三片。大棗一枚。水二盞。煎八分。熱服取

汗。陶節菴云。春夏秋感冒。頭疼發熱。惡寒無汗。

脉浮緊。見太陽表證。宜服此。平正方也。其加減法。在人自變通耳。

仲景麻黃湯 治傷寒太陽脉浮。頭項強痛。腰脊疼。發熱惡寒。身體痛。無汗而喘者。

麻黃

一兩半

桂枝

一兩

甘草

五錢

杏仁

去皮尖  
五十粒

爲粗末。每服五錢。水二盞。煎初沸。去上沫。再煎至七分。溫服取汗。汗出不必服盡劑。

清暑益氣湯

黃耆

一錢半 汗少減五分

蒼朮

一錢半

升麻

一錢

人參

去蘆

白朮

陳皮

神麴

澤瀉

各五分

甘草

炙

黃藥

酒浸

葛根

青皮

去瓢

當歸身

麥門冬

去心各三分

五味子

九粒

水二大盞。煎至一盞。去滓。食遠稍熱服。劑之多

少。臨時斟酌。此東垣所製以治長夏土令濕

勝非獨暑也其論云暑濕蒸熾人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃數大便溏頻或痢如黃糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗或汗少血先病而氣不病也其脉洪緩若血氣相搏必更加遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃耆

其溫補之爲君人參橘皮當歸甘草其微溫補  
中益氣爲臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻  
葛根其苦平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則  
食不消而作痞滿故炒麴其辛青皮辛溫消食  
快氣腎惡燥惡食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒  
借其味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味  
子麥門冬酸其微寒救天暑之傷於庚金爲佐  
名曰清暑益氣湯

百一十味香薷飲 消暑氣和脾胃

香薷 一兩

人參 去蘆

陳皮 湯泡去白

白朮

白茯苓

白扁豆 炒去殼

黃耆 去蘆

乾木瓜

厚朴 薑汁製炒  
黑色

炙甘草 各半兩

右爲細末。每服二錢。不拘時。熱湯或冷水調下。

當歸補血湯 治氣血俱虛。肌熱惡寒。面目赤色。

煩渴引飲。脉洪大而虛。重按似無。此脉虛血虛。

也。此病多有得于饑飽勞役者。

黃耆 一兩炙

當歸 二錢酒洗

右咬咀作一服。水三盞。煎至一盞。去滓溫服。食前。

瓊玉膏 治吐血欬嗽。

生地

新鮮者取汁四斤

白茯苓

十三兩

人參

六兩

以參苓爲極細末。以地黄汁和蜜拌入。用瓶貯。紙箬包其口。用桑柴火重湯煮三晝夜。取出水。

楫曰熟地質

重潤色黑補

水體澤瀉揚

液于上茯苓

淡滲于下行

水用丹皮瀉

陰火而水不

枯葉莖澁精

氣而水自固

乃山藥者又

補土以防制

其汎濫也

佑賢曰此滋

左腎化源內

浸三日。白湯點服。

六味丸 一名地黃丸。治腎經不足。發熱作渴。小

便淋閉。氣壅痰嗽。頭目眩暈。眼花耳聾。咽燥舌

痛。齒牙不固。腰腿委軟。自汗盜汗。便血。諸血失

音。水泛為痰。血虛發熱等證。其功不能盡述。

熟地黃 八兩酒蒸杵膏 山茱萸肉 乾山藥 各四兩

牡丹皮 去骨 白茯苓 去皮 澤瀉 去毛各三兩

右各另為末。和地黃膏加煉蜜。丸桐子大。每服