

頭部 面部 頸部 背部 腹部 臍部 腎部 膽部 口腔部
唇部 齒部 舌部 喉部 胸部

醫宗金鑑外科

卷之三

下古

拾捌冊

宋士光



編輯外科心法要訣

頭部

百會疽百會穴在頭中央百面側龍之正對耳尖

百會疽圖



外敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬脣痛根散惡寒便鴻脈見細數者此屬陽虛宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍膏若面赤腫熱實清毒火平塌陽虛溫補怯腫連耳項動瘻聲七日不漬命必絕註此百會疽久名玉頂發生在顛頂正中屬督脉經百會穴由膏梁太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高尖紅腫焮熱寒痛瘻根收束惟寒壯熱大渴隨飲隨乾苦昏焦便祕煩燥脈見洪數者此屬氣實宜眼黃連消毒散以清毒以

黃連消毒飲 蘇木分 甘草分 陳皮分 桔梗分 黃芩分 黃藥分 人參分 菊本分 防己分 防風分 知母分 羌活

分四獨活分 連翹分 連黃芩 生地黃分 黃耆錢 淾鴻分 當歸尾分 水煎食遠溫服 註黃連消毒清毒火諸般火證

服最良蘇木甘草陳皮桔芩藥人參棗二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤鴻當歸尾服後最忌飲寒涼

冲和膏 回陽玉龍膏俱見腫瘍門 生肌散 十全大補湯 黃靈藥 大膏俱見清瘍門 桂附地黃丸 附子餅見前 琥珀膏頭瘻

透腦疽生在百會穴前額會前

透腦疽圖

傳腦疽生在透腦疽前側下五處穴



透腦疽 透腦疽生百會穴前形如雞子痛而堅軟漫腫稀虛塌陷紅硬脣稠實腫尖註此證生於百會穴之前額頭之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘻頂塌陷根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖脣稠者屬實速漬者順遲潰透

脣稠者逆其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽 侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫逆要審詳註此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫脣無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而

難治初起宜服荆防敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將漬服託裏透膿湯已清服託裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘外治法俱按癰疽潰瘍門

託裏透膿湯

人參

白朮

穿山甲

白芷

升麻

甘草節各五

當歸錢

皂角刺五錢

生黃耆錢

青皮五分

水

佛頂疽

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

水

荆防敗毒散

見項部

佛頂疽

內疎黃連湯

冲和膏

俱見項

頭疽

託裏排膿湯

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

水

荆防敗毒散

見項部

佛頂疽

內疎黃連湯

冲和膏

俱見項

頭疽

託裏排膿湯

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

水

荆防敗毒散

見項部

佛頂疽

內疎黃連湯

冲和膏

俱見項

頭疽

託裏排膿湯

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

水

頭疽

佛頂疽

內疎黃連湯

冲和膏

俱見項

頭疽

託裏排膿湯

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

見項部

魚尾毒

琥珀膏

見髮際

瘡內

頭疽

水

勇疽

仙方活命飲

見項部

託裏透膿湯

見項部

透膿散

冲和膏

俱見項

勇疽

連湯外敷二味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲

內疏黃連湯

二味拔毒散

俱見腫

傷門

鬚疽

三焦膽二經證由欲怒火凝成此經氣多而血少潰瘍惟宜少見膿

註此證發於鬚角屬少少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾念人生疑結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬚角肌肉澆薄不宜鍼灸候其自潰漫後不宜多見膿

外敷

三味拔毒散已潰內外治法俱按

癰疽潰瘍門
後不宜多見膿者過耗血液難愈初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裏消毒散外敷三味拔毒散已潰內外治法俱按

癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡 生地各一錢

當歸錢二

赤芍一錢五分

川芎一錢

連翹去心二錢

牛蒡子一分炒研

黃芩錢一

生蠶子研

天花粉

甘草半錢

防風錢一

水二鍾煎八分食遠服

勸柴胡清肝治怒證宣血疏通解毒良四物生用柴翹蒡黃芩橘

草節防

託裏消毒散

二味拔毒散

俱見腫

天疽

近春生右耳後一寸三分高骨後

天疽 銳毒 天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太遇鬱火此處肉薄當急救

註此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之大銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如爪堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險證急當治避則熱氣下入淵前傷

任脈內薰肝肺惡證恐深必致不救若紅腫速潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應

耳後疽

耳後疽生耳摺間三焦風毒膽火炎紅腫有頭焮為順黑陷譽痛冷潰難

註此證生於耳摺之間無論左右屬三焦經風毒乘膽經怒火上炎而成初起如果漸增腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭焮熱易潰爛者為順若黑陷堅硬譽痛引腦甚則項頸肩肘俱痛不熱遲潰紫血者為逆初治法同天疽已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門又有初起失於託裏或誤食寒涼則毒不能好發遂攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者其愈最緩老年得

柴胡清肝湯

見前

託裏消毒散

烏龍膏

俱見腫

耳後疽

見前

耳後疽

此證者易於成漏

十全大補湯見潰瘍門

耳根毒耳根生疽相隔連繫輪轉根急則腫多不發根左右相同



仙方活命飲見腫門

二味拔毒散見腫門

耳根毒圖



耳根毒耳根生疽直後偏左或右左右相同

仙方活命飲見腫門

荆防敗毒散見項部

透膿散見腫門

遇虛者

膿水清稀或瘡口斂遲即服

香目養榮湯

石疽

遇虛者

膿水清稀或瘡口斂遲即服

香目養榮湯

補之自斂

太乙膏見潰

膿門

太乙膏

具見潰

王枕疽圖



神授衛生湯

託裏消毒散

沖和膏見腫門

王枕疽王枕疽生於王花骨或脣肉及舌苔合分處四寸半

王枕疽 王枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高腫為順紫陷凶註此證由督脈經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如粟麻癩相兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌臉潰出血水者屬凶險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服託裏消毒散外敷冲和膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

耳發 耳發三焦風熱或初微漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬吉紫血凶註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦穿眼孔破赤疼痛腫連耳輪者乃癰證之毒甚者也不可聽其自潰或潰遲膿通耳致盲在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷二味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

腦後發圖



腦
鑠
圖

惡瘻在腦後人髮際一寸風府穴
天筋云此穴中火發即瘻本



難治若初起熱如火燎利痛屬陽證速服黃連消毒散外敷回陽玉龍膏此證若百尾純見五善之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法 艾壯炙法

俱見前卷

仙方活命飲

見瘡門

十全大補湯

見清

黃連消毒飲

見前百

回陽玉龍丹

見附



圖

油

風

神應養真湯

羌活

木瓜

天麻

白芍

當歸

菟絲子

熟地酒

酒蒸

川芎

等分

為末入地黃膏加蜜龙桐子大每服百丸溫煮

酒或鹽湯任下

方神應養真治油

風養血

髮復生

毫毛

頭髮

生長

無

病

不

脫

落

皮

紅

光

亮

癢

如

蟲

行

俗

名

鬼

刺

頭

由

毛

孔

開

放

邪

風

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

寒

虛

白屑風圖



白屑風 白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌癰此患
註此證初生髮內延及面目且項燥癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風寒邪
侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥裂者用
潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸 大胡麻 蒼木炒 牛膝酒洗
右為細末陳煮酒跌丸菉豆大每服二錢白
鲞起白屑落復生歸芎胡麻蒼木膝葛蒲花
潤肌膏 香油四兩 奶酥油二兩 當歸五錢 紫草

石菖蒲 苦參 何首烏 生 花粉 蔡靈仙各二
水送下 忌魚腥發物 大酒 納換肌毛治白屑風燥癬日增若蟲行風燥血去潤養
半歲靈苦參何首烏為末煮酒跌瓦茶豆形
成 將當歸紫草入二油內浸二日文火燥去渣加黃蠅五錢溶化盡用布瀝候變

秃

國

先宜艾葉鵝糞煎湯洗淨瘡加再用豬肉湯洗之隨擦躡躅花油以殺蟲散風蟲死則瘡止風散則髮生立潮則肌膚潤久擦甚效
防風通聖散 防風 當歸 白芍酒炒 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏煅 黃芩 薄荷 麻黃 滑石略一 荆芥
白木土 炒 山梔子各二錢 甘草生二兩 共為末 去防風 防風通聖治瘡瘍經積熱致風傷連翹梔子麻黃去白木歸甘 滑石防黃芩
甘草石膏芍薄荷荆芥并硝黃共末酒拌晒乾研白湯調服發汗良 油膏 番木鱉錢六 當歸 藥蠶各五 黃藥 杏參 杏仁
狼毒 白附子各三錢 魷魚膽二 用香油十兩將前藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布瀝過罐收每用
少許用藍布裹於手指蘸油擦瘡

脚肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃藥苦參白附子茴蔻狼毒杏仁良熟薑當歸鯉魚膽煤焦入蠟實奇方
躡躅花油方 蹤躅花根四兩搗爛用菜油一盞燶枯去渣加黃蠅少許布瀝候冷青布蘸擦日用次早晚戴勿令見風
脚癩躡躅花油療癰瘡驅蟲止癢擦之良躡躅花根研極爛采油燶枯入蠟強

散肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃藥苦參白附子茴
蔻狼毒杏仁良薑蘆薈歸鯉魚膽蝶角入蠟寶奇方

蠻
蛇
蠅
瘡



蠻蛇瘡 蠻蛇即蠍拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多衣膜暑熱形大功易收
設此證多生小兒頭上俗名貉貓未破如曲蠍拱頭破後形似蠻蛇串穴有因胎而受
毒者其瘡腫勢雖小而根則坚硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發
本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂宜用三品一條槍插於孔內化盡堅硬反膜換
撤生肌散貼玉紅膏以收斂之不致再發也亦有暑熱成毒者大如梅李相研三五

枚潰破膿出其口不斂日久頭皮串空亦如蠻蛇串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用木泔水日洗
一次乾散生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相迎成片形類黃水瘡者宜用取銅散

搽之忌魚腥發物

三品一條槍 白砒五錢 明礬兩 破礬二味共研細末入小罐內加炭火煅紅青烟已盡疊起白烟片時約上下紅撤住大取罐安

地上一宿取出約有破礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搓成線條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先
用鍼連孔竅早晚插藥二條插至三日後孔大者每插十餘條插至七日孔內藥條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日
前後其堅硬衣膜及疔核應瘳痔漏諸管自然落去隨用湯洗搽玉紅膏虛者兼服健脾補腎自然收斂

款神奇三品一條槍能醫堅硬衣膜瘡雄乳白砒礬生用研末煅煉搓條良

敗銅散

化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能痊癒祛瘡口易斂

款敗銅散治瘡風傷瘡瘍破津脂水瘡化銅舊罐研細末香油調敷搽患處

紺珠膏 萬應膏 生肌散 玉紅膏

俱見瘡

髮際瘡

髮際瘡 髮際瘡生髮際邊形如黍豆瘡瘍堅項白肉亦初易治肥人肌厚最繩綿

茲此證生項後髮際形如黍豆項白肉亦堅硬痛如錐刺瘡如火燎破津膿水亦有
浸淫髮內者此由內鬱濕熱外兼受風相搏而成也初宜紺珠丹汗之次用酒炙防

風通聖散清解之外搽黃連膏效惟肥人項後髮際肉厚而多摺故其髮反刺瘡內
因循日久不瘥又兼受風寒凝結形如卧瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經

年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也琥珀膏 定粉兩 血餘粉一 輕粉四 銀朱錢
花椒粒十四 黃蠟四 琥珀五分

麻油十一兩 將血餘花椒麻油燶焦撈去渣下黃蠟溶化盡用夏布瀝淨傾入磁盞內預將定粉銀朱輕粉琥珀四味各研極細共合
一處徐徐下入油內用柳枝不時攪之以冷為度綿煎脂攤貼亦可

髮
際
瘡
圖



勸琥珀膏能治諸瘡活瘀解毒化腐良定血輕朱椒蠟珀油熱膏亦療瘡

舶珠丹即萬靈丹見頭瘡門

防風通聖散見前羌瘡門

黃連膏見鼻瘡部

頭風傷目 頭風引目眉棱痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後破風侵註此證畏風惡寒其痛走注不定得煖少減若風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣不渴小水白者寒痛也身重肢痠胸煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證鑑有古方羌活冲和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉棱痠痛眼皮跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛所致損目若只眉棱痠痛以碧雲散常服之甚效

羌活冲和湯 防風 白芷各一 細辛 甘草各五分 生地 蒼朮 黃芩各一 先活一錢五分 川芎錢 引加葱頭三根生薑一片 紅棗肉一枚水煎遠食服 痛由項後起屬膀胱經倍加藁本 痛由耳後起屬膽經加柴胡痛由太陽牽引頭額兩腮屬胃經倍白芷加葛根煅石膏 頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮 頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減薄荷 頭痛兼有嘔逆沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸 頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏 便祕者加生大黃 頭痛吐痰沫四肢不冷者加半夏 勸冲和頭風風傷目風火寒痰四因生日久眉棱痠痛跳躡睛損目此能清防風白芷細辛草生地蒼朮羌活芍藥桂枝加引經藥葱薑紅棗水煎成

面部

「顏瘡呈暗色赤丘石同」



顏瘡顏疽 顏瘡顏疽漸褪形風熱積熱小腸經癆起城紅浮腫痛疽紫漫硬木麻疼註此二證發於頸骨尖處屬小腸經不論左右初小漸大如榴發陽分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰名為顏瘡毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七方潰名為顏疽毒甚根深難愈瘍證初宜仙方活命飲痘證初宜內疎黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按瘡疽肿瘍瀉瘍門

仙方活命飲

內疎黃連湯

麥靈丹俱見頭瘡門

圖 疗 頭

蟾酥丸

麥靈

見腫門

黃連消毒飲見頭部
百會疽



癩疗色赤坚硬形小根深左右相间

顧疔 顧疔初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深固葉熱火作麻癢疼計此證生在顧骨之間屬陽明胃經不論左右初如粟米黃色小胞次如赤豆頂凹堅硬按似疔頭麻癢疼痛多因過食火燭藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次服黃連消毒飲清之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺即當急治遲則毒火攻心令人昏濶譁語惡症悉添多致不救

圖毒發面

A black and white woodblock-style illustration of a man from the waist up. He has a shaved head with a small bun at the top. He is wearing a traditional Chinese robe with a wide collar and a belt. He is looking slightly to his left. His hands are clasped in front of him, holding a long, thin object, possibly a scroll or a staff.

面發毒面發毒在煩車骨初少漸多赤豆形腫硬焮痛津黃水證屬風熱客陽明此證生面上煩車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服荆防敗毒散汗之若胃火盛則昏眩渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

涼膈散
散熱涼

黃芩 薄荷 施子研 連翹去
膈散醫肺胃熱口渴唇焦便燥結芩
毒散 白及 乳香 雄黃 天花粉
消毒去風熱及乳癰黃花粉麝烏藥

石膏生 甘草生 芒硝 大黃各等分 水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙和服
薄施翹石膏草芒硝大黃苦竹葉
麝香 烏藥 山慈姑 黃藥 各等分共研細末雞子清和蜜水調敷
慈姑黃藥研雞清蜜調毒即滅

圖風遊面

面遊風 面遊風燥熱成面目浮腫癰蟲行膚起白屑而癰極破津黃水津血疼
茲此證生於面上初發面目浮腫癰若蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極癰抓破熱
溫感者津黃水風燭感者津血痛楚難堪由平素血燥遇食辛辣厚味以致陽明胃
經濕熱受風而成癰甚者宜服消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外抹摩風膏緩緩
取效

摩風骨 麻黃五錢 羌活一錢 白檀香一錢 升麻一錢
黃蠟 五錢 溶化盡用絹濾過攬冷塗抹瘡上
消風散 銀硝一錢 黃連一錢 水煎服
百會推

麻錢一
白及錢一
防風錢一
當歸身錢一
用香油兩將藥浸五日文火煤黃即撈去渣加
勦摩風骨抹遊風證麻黃羌活白檀升防歸身香油泡
燥黃去渣加蠟凝

瘧

瘧腮圖



宜平補之其餘治法按癰疽清瘡門此證初起若過服涼藥令攻疾者

柴胡葛根湯 柴胡 葛根 石膏煅 花粉 黃芩各一 甘草生五分

牛蒡子研 連翹心 桔梗各一 升麻加一水二錢烈火

分不拘時服 柴胡葛根發表證痄腮腫痛或平行石膏花粉黃芩草牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲 防風 桔子研 連翹去心 甘草生當歸 赤芍 羌活各一 大黃錢

水二錢燈心五十寸煎八分食遠服

溻四順清涼攻裏強口乾便秘痄腮防風橘子連翹草歸芍燈心羌大黃

託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

痄腮 痘腮胃熱是其端初起焮疼復寒高腫焮紅風與熱平腫色淡熱濕原註此證一名髮發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不著骨之處無論左右總發端於陽明胃經也初起焮痛寒熱往來若高腫色紅焮熱者係胃經風熱所發若平腫色淡不

鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宣四順清涼散解之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者鍼之虛症者

鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宣四順清涼散解

之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者鍼之虛症者

柴胡葛根湯 柴胡 葛根 石膏煅 花粉 黃芩各一 甘草生五分

牛蒡子研 連翹心 桔梗各一 升麻加一水二錢烈火

分不拘時服 柴胡葛根發表證痄腮腫痛或平行石膏花粉黃芩草牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲 防風 桔子研 連翹去心 甘草生當歸 赤芍 羌活各一 大黃錢

水二錢燈心五十寸煎八分食遠服

溻四順清涼攻裏強口乾便秘痄腮防風橘子連翹草歸芍燈心羌大黃

託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散

見腫瘍門

煩 瘡 圖

頭瘡生頭車骨



託裏消毒散</p

骨

桔風圖



後人壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷殼蠶下之後減大黃加如生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜用中和湯託之已潰按癰疽潰瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非殼蠶不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片蟄火煩車大二七壯其穴在耳垂下五分陷中度曰火之秉用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削瘦盛不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散 薑黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處

歌方清胃散擦牙腫疼臺黃白芷細辛芎同研先以鹽湯漱後擦此藥有奇功

中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆絲一
二錢薑三片棗三枚煎八分加酒一杯食遠服 劾中和湯治膏槽風日久不消欲清膿正結參耆薑桂草木芍歸芍麥門冬
理中湯見_{膏槽風門}真君妙貼散_{見睡} 升陽散火湯方見

發

頤

圖

發頤 發頤腫痛結核般經屬陽明身熱寒傷寒腫毒汗失表腫至咽喉調治難_{詳此證又名汗毒發於頤頸之間屬足陽明胃經初起}
身發寒熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李疼痛增由傷寒發汗未盡或疹形未透壅積而成初起宜荆防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必清膿宜服託裏透膿湯潰後按癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼耗伐

之藥毒必內陷腫至咽喉痰氣堵湯水難嚥者逆

膏槽風 膏槽風大三焦胃耳前頤頸隱隱疼痛筋官仍硬痛牙關拘急火邪風證此證一名牙火發一名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於年前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪火深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不收初

起熱不感者內宜服清陽散大湯外以清胃散擦牙真君妙貼散敷腮初起發表之



時

毒

圖

時毒在子午兩卦之間互反

刺防敗毒散

頭部 時毒

二味拔毒散

頭部 訣裏透膜湯

見頭部

時毒 時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感四時不正氣治分壯弱疎解痊註此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠痛或兼咽痛一二日間發於項腮頸頸作腫無頭漸漸微亦疼痛或似結核有根漫腫色亦俱由感冒四時不正邪氣客於經絡醞結而成非發於病後之頤毒也惟在醫者精察蒼色辨別虛實治法須宜疎解不可驟用寒涼致毒不外發而內攻咽喉者散矣初服利防敗毒散汗之其腫不消者宜服連翹消毒飲腫仍不消腫勢將成壯者宜服透膜散弱者宜服託裏透膜湯外敷二味拔毒散

清按癰疽清瘍門治法

荆防敗毒散

頭部 觀頭部

連翹消毒散

見背部 腹部

透膜散

見頭部

二味拔毒散

頭部

鳳眉痘

鳳眉痘生眉棱骨左右同



仙方活命飲

見頭部 頭門

託裏透膜湯

見頭部

透膜散

見頭部

鳳眉痘

鳳眉痘生兩眉稜形長如爪漫腫紅膀胱小腸肝膽熱煩悶渴並不食少陽膽經積熱所致形長如爪疼痛引腦二目合腫堅硬色赤按之有根六日內

刺之得膿則吉無膿則險甚則十四日不潰煩悶渴不食者凶初宜服仙方活命飲次服託裏透膜湯速清為妙遲則恐攻眼損精矣其餘內外治法按癰疽清瘍門

眉心痘

眉心痘



龍泉痘

龍泉痘在人中之正中



眉心痘 眉心痘生在印堂硬腫為痘浮腫瘡督經風熱氣凝滯根堅木痛當疔防註此證生於兩眉中間痘名曰印堂痘毒初起色暗根平腫硬疼痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆瘡名曰面風毒瘡毒初起色赤浮腫焮痛易治七日清膿若色黑木痛麻癢太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作即眉心疔也俱由督脈經風熱壅結氣滯所成痘瘡二證俱按百會痘眉心疔治法同疔龍泉痘 龍泉痘起在人中麻癢堅疼赤豆形上焦風熱攻督脈憎寒壯熱治同疔註此證生於水溝穴即人中是也屬督脈經形如赤豆勢小根深坚硬木痛色紫頂焦寒熱交作不時麻癢由上焦風熱攻於督脈而成宜按疔門急速治之遲則毒氣內攻令人煩悶惡心乾嘔神亂昏憤腮項俱腫多致不救

虎蛇毒圖



虎蛇毒 虎蛇毒在頸下生胃腎積熱入任經癰焮腫痛速潰易疽堅硬痛麻癢形小似豆麻癢痛甚惡寒發熱心煩作嘔者疔也當從疔治皆由過食火燄以致腎二經積熱上攻任脈而成癰疽二證初起宜服仙方活命飲加升麻桔梗消之若便秘渴焦大渴者宜內疏黃連湯清之其餘內外治法俱按癰疽腫毒內初起

麻癢如疔治法按疔門

仙方活命飲 內疏黃連湯

俱見腫毒門

燕窩瘡圖



缺高僧生子下類

燕窩瘡 燕窩瘡在下頸生如攢粟豆癢熱疼形類黃水瘡破爛此證原來溫氣成註此證生於下頸俗名年鬚子瘡初生小者如粟大者如豆色紅熱痒微痛破津黃水形類黃水瘡浸淫成片但尤密如攢由脾胃濕熱而成宜服芩連平胃湯外搽碧玉散即效

芩連平胃湯

黃芩一錢

黃連錢 厚朴一錢
姜炒

蒼朮二錢
炒 甘草生五分

陳皮錢 水二錢薑一片煎八分食後服

歌芩連平胃

熱蕩除濕清熱服更涼
姜炒各五錢燒

共研細末香油調搽患處

歌碧玉散

黃藥末

紅棗肉各五錢燒

共研細末香油調搽患處

歌碧玉散搽燕窩瘡色紅光浮津水黃豆炭藥末香油拌消疼止癢滲濕方

雀斑圖



雀斑

雀斑淡黃碎點形火鬱孫絡血風成雀角升麻丸常服

正容散洗漸無痕註此證生於面上其色淡黃碎點無數由火鬱於孫絡之血分風邪外搏發為雀斑宜常服雀角升麻丸並治一切粉刺酒刺駭瘡雀子等證外用時珍正容散早晚洗之以澤其肌久久自愈亦有水虧火滯而生雀斑者宜服六味地黃丸

雀斑圖

雀斑

犀角升麻丸

犀角一兩

升麻一兩

羌活一兩

防風一兩

白附子錢

白芷錢

生地黃一兩

川芎錢

紅花錢

黃芩錢

甘草錢

各研細末合均蒸餅為小丸每服二錢食遠臨卧用茶清送下

歌犀角升麻治雀斑

野鷺蓼子亦能痊

雀斑升麻防白附

芷生地芍紅芩草丸

生子下類

時珍正容散 猪牙皂角 紫背浮萍 白梅肉 甜櫻桃枝各一 烤乾兒鷹翼白三錢共研為末每早晚用少許在手心內水調滾

搓面上良久以溫水洗面用至七八日後其斑皆沒神效

粉正容散洗雀斑客猪牙皂角紫背浮萍白梅櫻桃枝鷹翼研末早晚水洗靈

六味地黃丸 懷熟地酒 山萸肉 懷山藥各四

淡鹽湯送下 粉六味地黃善補陰能滋腎水並生津更苓山藥丹皮鴻研末蜜丸服最神

黑子膏見資瘡門



黑子膏

此證生於面部形如微點小者如黍大者如豆比皮膚高起一線有白筋生者亦有中年生者由生孫絡之血滯於衛分陽氣不結而成宜用線鍼挑破以水晶膏貼之

三四日結痂其瘡自落用貝葉膏貼之兼成醫脂愈後無痕

水晶膏 磺子石灰水化開取末五錢又用濃鹹水多半茶鍾浸於石灰末內以鹹水高石灰二指為度再以糯米五十粒撒於灰上如

鹹水滲下陸續添之泡一日一夜冬天兩日一夜將米取出搗爛成膏挑少許點於患處不可太過恐好肉

粉水晶膏能點黑瘡鹹水浸灰入糯米一日一夜米泡紅取出搗膏效無比

目葉膏見資瘡門

黎黑肝黯 肝黯如塵久煩原於憂思抑鬱成大如蓮子小赤豆玉容久洗自然平訖此證一名黎黑班初起色如垢日久黑似煤形

枯暗不澤大小不一小者如粟粒亦豆大者似蓮子次實或長或斜或圓與皮膚相平由思抑鬱血弱不華火燥結滯而生於面上婦女多有之宜以玉容散早晚洗之常用美玉磨之久久漸退而愈戒憂思勞傷忌動火之物

玉容散 白牽牛 團粉 白斂 白細辛 甘松 白鵝糞 白及 白蓮蕊 白芷 白朮 白僵蠶 白茯 苍朮 荆芥

獨活 羌活各五錢 白附子 鷹條白 白扁豆略一 防風 五錢 白丁香 一兩 共研末每用少許放手心內以水調濃搽搓面上良

久再以水洗面早晚用二次

粉玉容散退黧肝黯牽牛團粉敘細辛甘松鵝糞及蓮蕊並木槿靈白茯苓荆芥獨活白附子鷹條白扁豆防風白丁香共研為末早晚洗面去班容

腦疽圖 偏腦疽圖



偏腦疽 生員後入髮際內側者

荆防敗毒散 荆芥 防風

羌活 獨活 前胡

水二鍾煎八分食速服

寒甚加葱三根

荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良充獨前柴

桔梗 川芎 枳殼 枸杞

茯苓一錢 人參 甘草各五

錢 甘草強

內疎黃連湯

見脢湯門

天柱疽圖



天柱疽生於項後髮際下兩傍角陷處也左右同

魚尾毒圖



魚尾毒生於項後髮際兩旁角陷處也左右同

魚尾毒 魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱之日漬暖出腫消毒自
寧註此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝結而發其毒或在
左或在右皆屬輕淺初起宜荆防敗毒散膿將成宜服託裏排膿湯其外治之法
同瘡疽腫瘍清湯諸證

託裏排膿湯 當歸 白芍酒 人參 白朮土炒 水二鍾牛膝下部加 白芷頭加甘草四分

葛根一錢 甘草四分 薑一片水三鍾食速溫服

葛根一錢 金銀花 淋貝母各一錢 生黃耆二錢 陳皮少分 肉桂少分 桔

腦疽 腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同註

此疽有正有偏正屬督經入髮際名為腦疽俗名對口偏屬太陽膀胱經名為偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生其證多焮赤腫痛色鮮紅活潑來項尖時止督脈純陽起於尾閭上貫顛頂挾毒上升故易腫易腐易破多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰於頭太陽降陰凝難腐難斂多屬逆證更有兼虛濕者其瘡根又易於散大旁流放順逆二證治法當辨別是瘡是疽腦疽者皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人寒熱往來宜服荆防敗毒散有裏證令人口唇焦紫大渴大便結燥宜服內疏黃連湯若瘡勢已成按瘡疽腫瘍清湯門大法治之

妙記裏排膿清瘡排膿消腫實稱強歸芍四君翹桂芷銀香目桔梗陳良
荆防敗毒散見臘疽

百脈

脈疽圖

百脉疽生清



結喉圖

結喉疽生項前項下結喉處



百脈疽 百脈疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見瘰者順見血者逆餘治法按瘻疽清湯門
結喉癰 結喉癰發項前中肝肺積熱塞喉山脹成若不急速刺清穿咽喉何以生註此癰發於項前結喉之上又名猛疽以其毒勢猛烈也蓋項前之中經屬任脈兼肝肺二經積熱憂憤所致腫甚則堵塞咽喉湯水不下甚凶可畏若脹成不鍼向內清穿咽喉者則難生失初宜服黃連消毒飲外敷二味拔毒散將清調治之法按瘻疽腫瘍清湯門
黃連消毒飲 頸部 二味拔毒散 見瘻疽門

夾喉癰 圖



夾喉癰生頭項下結喉處

經陽少陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

經陽瘻疽圖



重臺瘻疽圖

馬刀瘻疽圖



形如長哈名馬刀瘻疽



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

夾喉癰

夾喉癰

夾喉癰生候兩旁肝胃毒發其瘡瘍與結喉癰同治尤嫌瘦虛不時噏註此癰一名夾道生於結喉之兩旁屬足厥陰肝經

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖



陽明經瘻疽形大小一追醫教戒

重臺瘻疽圖



重臺瘻疽少陽陽明二經皆生此症

太陽經瘻疽圖



太陽經溫瘻疽生頭項下結喉處

經陽瘻疽圖

