

金鑑外科
卷八十九

19

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣目錄

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

湧泉散

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

乳癰吹乳乳巖妬乳乳懸總括

乳癰證治

消毒飲

加味消毒飲

益氣養榮湯

吹乳證治

栝蒌散

外敷法

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

芎歸飲

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽湯

薰洗法

騰熨法

陰痛證治

加味逍遙散

乳香四物敷法

逍遙散

四物湯

陰癢證治

桃仁雄黃膏

逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰瘡證治

加味四物湯

四物湯

加味逍遙散

補中益氣湯

陰痔證治

烏頭薰法

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯

陰冷證治

溫中坐藥

桂附地黄丸

陰吹證治

膏髮煎

十全大補湯

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心金墨散

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

刺期門法

清熱行血湯

血分水分總括

血分證治

加味小調經散

水分證治

茯苓導水丸

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

歸脾湯

梅核氣證治

半夏厚樸湯

血風瘡證治

加味逍遙散

益氣養榮湯

臙瘡證治

桂附地黄丸

人參敗毒散

補中益氣湯

六味地黄丸

足跟痛證治

六味地黄丸

八珍湯

出癰圖



此癰在臍上寸

腹部

幽癰○幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼憂患厚味火毒發咬牙寒戰毒陷攻註此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鵝卵其則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通火鬱成毒自內而外發也初起腫痛皮色未紅時若心煩嘔噦脈沉實者當疎火毒以絕其源宜內裏散毒外用文壯隔蒜片灸之既見沈遲其膿未成用補中益氣湯託之脈見洪數其膿已成用託裏散散外刺金銀花黃芩牡蠣當歸赤芍朴硝大黃花粉連翹各等分共研粗末每用五錢酒水各一鍾煎八分去渣服

中脫疽圖

中脫疽圖



中脫疽在臍上四寸

癰癰圖



癰癰生在臍上三寸

疽衝圖



衝疽在臍上二寸

內疏黃連湯見脫方託裏散醫諸瘡腫其癰癰煎服消臍刺銀花牡蠣歸芍硝黃花粉翅
中脫疽○中脫疽由胃火生臍上四寸隱隱疼堅硬漫腫無紅熱不食嘔噦毒內攻此証一名胃疽發於心膈之下臍上四寸任脈經中脫穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙烤以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裡作嘔不食咳嗽膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲內消散膿勢將成內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門若起長膿遲或瘡不焮痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之回陽

錢炒 酒水各一鍾煎八分空心服渣再煎服大便秘行三四次方食稀粥淡味調理 山甲內消火毒積色紫堅硬中脫疽歸尾大黃 蠶草節木鼈牽牛加酒宜 ○仙方活命飲 見腫瘍門

衝疽○衝疽臍上二寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛速潰言若見七惡定然凶此證生於任脈臍上二寸下腕穴一名中營疽又名癰腎
瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二十一日潰破膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消之膿將成時內外治法俱
按癰疽腫瘍潰瘍門其證若平塌紫黑膿水清稀七惡證見者逆○瘡科流氣飲見背節○仙方活命飲見腫瘍門

臍癰生在肚臍

A black and white woodblock-style illustration of a man from the waist up. He is wearing a long, flowing robe. On his right side (viewer's left), there is a large, dark, circular swelling on his abdomen, representing a navel abscess. He is holding a small object, possibly a flower or a fruit, in his left hand. The background is plain.

腦癰生在肚臍

臍癰附臍中出水○臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅熱宜蒜灸稠膿為苦污水凶註此證由心經火毒流入大腸小腸所致生於臍中屬任脈經神闕穴此穴禁鍼腫大如瓜高突若鈴無紅熱最宜隔蒜灸之初宜服仙方活命飲加升麻消之便結實者內疏黃連湯通利之將欲成膿肉外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後得稠膿者順時出污水臭穢者逆亦有臍中不痛不腫甚癢者

津黃水此屬腸胃濕熱積久宜服黃連平胃散外用三妙散乾撒滲濕即愈當忌酒麪生冷果菜不致再發若水出不止者亦屬逆

黃連平胃散 黃連_{五錢} 陳皮 厚朴_{各三錢} 姜炒 甘草_{二錢} 生 蒼朮_{一兩} 炒 共研細末 每服三錢白滾水調服

歌黃連平胃散陳甘厚朴蒼朮共細研專除濕熱兼消積能令膽水立時乾

三妙散 檳榔 蒼朮 黃蘗 各等分 共研細末 乾撒臍臍出水 津液成片 止癢 又治濕癬 以蘇合油調搽甚效

歌三妙最用檳榔蒼黃蘗同研參濕瘡蘇合油調治濕癬收乾止癢效稱強

隔蒜灸法見首卷灸法○仙方活命飲○內疏黃連湯俱見腫瘍門

少腹疽圖

A woodblock illustration of a man in traditional Chinese scholar's robes, standing and holding a book or tablet. The man has a beard and a topknot. The style is characteristic of Ming or Qing dynasty book illustrations.

少腹疝

少腹疽○少腹疽生臍下邊証由七情火鬱纏高腫紅疼牽背易漫硬爛腐水膿艱註此證由七情
火鬱而生每發於氣海丹田關元三穴氣海在臍下一寸五分丹田在臍下三寸皆屬任脈經此三穴或一穴發腫即為少腹疽高腫紅活疼痛牽背易潰稠膿者易治若漫腫堅
硬綿潰腐爛膿稀如水者難治凡遇此證初起急用艾炷腫頂七壯至三七壯以痛養通徹為度宜

服仙方活命飲氣實之人大渴便秘者宜服內疏黃連湯通利之老弱之人宜服內補十宣散令其速潰若潰遲恐透內膜外治宜同癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲○內疏黃連湯俱見腫瘍門○內補十宣散見胸部瘰癧瘰癧

腹皮癰○腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱痠腹痛不上膿成癰管由胃火毒入主生此癰金天丁之應藥者濕土月令乃陰月主血

腹皮癰



後腹痛不止膿將成也急用託裏透膿湯清後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用剋伐之劑若布
圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危亡矣
雙解貴金丸 見腫瘍門
託裏透膿湯 見頭部侵腦疽

緩疽



緩疽○緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅又或數月不潰生寒熱食少削瘦或難成此證由太陰脾
經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅硬如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者屬嚴
證但不可棄而不治初宜服山甲內消散不應不可強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡
蘆巴溫補之外用木香餅熨之兼用獨頭蒜搗爛鋪於患上艾壯灸之以知熱為止次日再灸以或

消或潰為效若潰後即按癰疽潰瘍門治法
山甲內消散 見中脫疽○十全大補湯 見潰瘍門○木香餅 見乳部乳中結核

癰疽



癰疽○癰疽暴腫生腋間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼忿怒初宜清解清補痊此證一名夾肢
癰發於腋際即俗名腋窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消
必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散如金銀花甘草節桔梗膿脹痛
者鍼之已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾忌用寒涼中年易愈老弱之人難痊

疽



柴胡清肝湯 見頭部發疽○冲和膏○透膿散 俱見腫瘍門
疽○疽初起若核形肝志脾憂氣血凝滯腫硬堅宜蒜灸日久紅熱潰先疼此證一名米疽
又名灸疽發於虎肢窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思忿怒氣結血滯而成漫腫堅硬

疔



皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛也初宜艾壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯加烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏
早治或有全消者遲則脹成宜服託裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門此證初終內外
治法禁寒涼中年易愈老難痊
隔蒜灸法 見首卷
烏龍膏 見腫瘍門○託裏透膿湯 見頭部
香貝養榮湯 見項

黯疔○黯疔藏於腋下生肝脾火毒瘰而瘰寒熱拘急色紫黑急按疔門治即寧此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬勢若釘頭瘰而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩燥作嘔痛引半身宜服參靈丹其次內外急按疔門治之即愈

麥靈丹 見腫瘍門

肋部

肋疽○肋疽始發屬肝經火毒鬱結腫形紫痛極甚如盤急宜鍼砭免內攻此證一名夾焚疽生於肋條骨間由肝經火毒鬱結聚而成初如梅李漸大如盤色紫焮痛連及肩肘患在左痛牽右肋患在右痛牽左肋二十一日之內膿潰稠粘者順屆期不潰既潰出清水者逆初腫急宜磁鍼砭出紫血庶免毒氣攻裡後赤腫痛甚煩燥脈實作嘔為有餘之證宜服雙解貴金丸下之腫硬不潰宜服透膿散脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者即同胃虛治之若感受寒邪及偶觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助氣為主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用卧鍼開之餘按癰疽潰瘍門治法

雙解貴金丸○透膿散 俱見腫瘍門 香砂六君子湯 見清瘍

淵疽



淵疽在腋下三寸堅硬不紅

淵疽○淵疽肝膽憂慮成生於肋下硬腫疼潰破有聲內膜透末潰當服護膜靈此證因憂慮太過以致肝膽兩傷而成生於肋下初起堅硬腫而不紅日久方潰得稠白膿者順如豆漿水者險瘡口有聲似乎兒啼此屬內膜透也即於陽陵泉穴二七壯其聲即止穴在膝膑骨外膝下一寸陷中蹲坐取之即得內外治法皆同肋疽凡肋胸膈腰腹空軟之處發癰疽者當在將潰未潰之時多服護膜散可免透膜之患

內發丹毒



內發丹毒

護膜散 白蠟 白及 各等 共研細末輕刺一錢中刺二錢大刺三錢黃酒調服米湯亦可

脾二經熱極生風所致生於肋骨延及腰膝色赤如雲遊走如雲痛如火燎急向赤腫周圍破出紫血以瘦牛肉片貼之羊肉片亦可其毒即可減半初服雙解貴金丸汗之次服化斑解毒湯投方應病者順若嘔噦皆潰胸腹脹偏身青紫者則為毒氣內攻屬逆

化斑解毒湯 升麻 石膏 連翹 牛蒡子 炒研 人中黃 黃連 知母 黑參 各一 竹葉二十片水二鍾煎八分服

雙解貴金丸 見腫瘍門

雙解貴金丸 見腫瘍門

雙解貴金丸 見腫瘍門

雙解貴金丸 見腫瘍門

雙解貴金丸 見腫瘍門

腸癰○腸癰焮紅高腫瘰疽堅痛冷不紅皆屬肝脾火結遲潰敗瘰令虛山此證生於臍肋有硬骨者為肋下瘰癰

癰疽圖



五臟六腑

諸募穴圖



破膿稠為癰若堅硬平塌漫腫木痛不紅不熱月餘潰破稀膿為疽若失治屆期不潰攻擊成膿腫如鼓脹破出敗漿腥臭膿者逆癰疽二證初腫時俱宜急服柴胡清肝湯解鬱瀉火如已成者服託裏透膿湯熱脹痛俱用卧鍼開之已潰以排餘膿補氣血為要餘按癰疽潰瘍門治法投補不應者難治

內癰部

肺癰○肺癰肺熱復傷風肺藏生癰隱痛胸狀若傷寒燥數甚稠渴痰涎腥臭膿未潰射干麻黃汁壅不得卧葶藶散清後稠膿能食舌腫清兼血不食山註此證係肺臟蓄熱復傷風邪鬱久成癰以致胸內中府穴隱隱疼痛振寒脈數狀類傷寒咽燥不渴欬而喘滿唾稠粘黃痰兼其微膿血也治之者於未潰時乘膿未成風鬱於表者法宜疏散用射干麻黃湯以汗之如氣壅喘滿身不得卧者急服葶藶大棗湯以瀉之如欬有微熱煩滿胸中甲錯膿成者宜千金葶藶湯以吐之若吐膿腥臭形如米粥者宜桔梗湯以排餘膿若吐膿腥臭咳而胸滿者宜外臺桔梗白散以開痰塞若咯吐膿血兼午後身

熱煩燥宜金鯉湯主之兼飲童便若潰後胸膈肋隱痛不止口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠卧不得咳吐稠痰腥臭此係癰膿不盡而兼裏虛宜寧肺桔梗湯主之若癰膿已潰喘滿腥臭濁痰俱退惟咳嗽咽乾咯吐血脇肋微痛不能久卧者此屬肺癰潰處未斂宜紫苑耳湯清補之渴甚去半夏加石膏服之若癰膿潰後咳嗽無休膿痰不盡形氣虛羸者宜清金寧肺丸主之凡治此證惟以身溫脈細膿血交粘痰色鮮明飲食甘美膿血漸止便潤者為吉若手掌皮粗潰後六脈遲數氣急額紅污膿白血懶食及大便結燥者為凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨間

射干麻黃湯 射干十三枚 麻黃 生薑各四兩 細辛 紫苑 欬冬花 各三兩 大棗七枚 五味子 半夏各半升洗 水煎溫服

射干麻黃散 射干三兩 麻黃 生薑各四兩 細辛 紫苑 欬冬花 各三兩 大棗七枚 五味子 半夏各半升洗 水煎溫服

葶藶大棗湯 葶藶 乾者五錢 重者一兩 大棗 輕者五枚 重者十枚 去核 以水三鍾煎至一鍾服之

千金葶藶湯 葶藶二升 薤白仁 炒 瓜瓣 各半升 即冬瓜仁 桃仁 五十粒 去皮尖炒研 水煎服

射干金葶藶散 射干 葶藶 乾者五錢 重者一兩 大棗 輕者五枚 重者十枚 去核 以水三鍾煎至一鍾服之

桔梗湯 苦桔梗 甘草二兩 生 水煎服

射干金葶藶散 射干 葶藶 乾者五錢 重者一兩 大棗 輕者五枚 重者十枚 去核 以水三鍾煎至一鍾服之