

豆

卷の五

金匱啟鑰

漣江黃朝坊妙山輯著

雜症上

發熱論

痘之一症。始終不可盡除其熱。蓋熱非壯熱。乃和緩之熱也。以寒則收。縮熱則宣發。故初不熱。則出不齊。脹不熱。則漿不行。收不熱。則痂不結。然熱雖不可除。若自初出。以至起脹時。壯熱皮膚乾燥無汗。此熱在裏也。以升麻葛根湯加荊芥穗防風主之。蒸熱有汗。此熱在裏也。加減消毒飲主之。至行漿時。熱不減者。此爲毒熱薰蒸。宜用清毒

活血湯便秘者去人參黃芪加酒炒大黃至結痂後發熱壯盛胸腹
手足俱熱二便秘澀者此爲餘毒過盛宜用大連喬飲治之

証治歌

痘生發熱辨初終。表裏攸分莫渾同。若自初時至起脹乾枯無汗熱

如烘此爲表熱。升麻膏根湯進荆芥穗防丰加入工有汗熱蒸爲在

裏飲名。加減消毒自消融行漿時熱仍不減。清毒活血湯投許建功

便秘。人參黃芪宜選去大黃酒炒入其中結痂壯熱兼便秘熱在四

肢及腹胸此症原因餘毒盛大連喬飲效無窮

升麻

牛子

炒研

山荳根

連翹

去心

赤芍

甘草

生地

川連

紫草

石人燈心水煎服

升麻葛根湯

見發熱

清毒活血湯

見起脹

大連喬飲

見收攝

金匱要略

卷四 痘疹

石

本館新書

久吾聶氏曰身熱至二三日或痘欲出而未出或出而初見報痘一二顆忽然驚搐大作不可驚惶失措惟詳審虛實寒熱而用藥有毒氣壅盛於內不能驟發於外而驚搐狂燥者宜用清解散以止之痘出而驚搐自定有內毒本甚外爲風寒所束鬱滯而不得出以致驚搐者宜用蘇解散以發散之有氣血虛弱不能送痘出外而驚搐狂燥或搐在靨後者宜用溫中益氣湯以補之辨此驚狂諸症最宜細心體認觀形察色聽聲問症又參之以脈然後可以分別看其痘暈紅紫面赤唇紫聲音亮口氣粗身熱手足亦熱脈洪數此毒氣壅盛

者也。或形色多同於前，但聲重鼻塞，或鼻流清涕，脈浮緊而數，此毒甚而爲風寒所束者也。然此症多在寒涼之月，或不謹避風寒者有之。看其痘影淡白，在皮膚之間，不見紅活，唇淡面白，或帶清色，脈又遲緩，雖煩燥驚搐，有似於熱，其寔因氣血虛弱，逆毒不出者也。前症分別明白，而用藥合宜，當一劑之後，痘出而驚狂立止。昔人有云：痘未出之前，驚搐爲順，可不必治，豈其然乎？然毒氣壅甚，不能發出，痘苗鬱遏於內，而驚搐抽掣，眼目斜弔，口鼻歪斜，宜用敗毒和中散，加熟大黃一錢二分，羌活五分，蘇葉五分，白芷五分，表裏兼治。賴芩連以清毒火，熟大黃以逐毒火，羌活蘇葉白芷前胡防丰制芥以敗毒。

三里在兩脚直下外膝在膝骨之下正膝之外以脚之脛骨而通算之約有一尺長則上三寸之下也言三里者謂此穴去膝蓋最近也按之正膝骨之外去膝不遠陷肉處卽穴也一兩脚鞋帶各一穴在兩脚直下與脚背交接屈曲之處世人繫鞋帶之所故俗名鞋帶穴按之骨縫中窪有穴而脚大指與次指相近之極處俗名脚虎口穴男從左手曲池起以燈火焯之隨焯左手虎口又焯右手曲池又隨焯右手虎口又隨焯左脚三里及左脚鞋帶左脚虎口又隨焯右脚三里及右脚鞋帶右脚虎口男從左上焯下女從右上焯下切不可下焯上左右上下共十穴每一穴止用燈心焯一下不可多焯凡用燈心先取大白燈心一莖長不過三四寸蘸香油潤之又將各穴招定用黑筆點定然後燃灼燈心按穴焯之聽燈火有爆聲上吉次第如法焯之抱定睡一個時辰看見痘苗出現而驚搖自止依此治之百發百中

若煩燥頓悶昏沉不省人事者則不可救矣揔之用清解散蘇解散溫中益氣湯痘後太香大安丸四方分門別症亦可謂詳矣若毒火壅甚於內大便結燥又用加味敗毒和中散以下之如此用藥

之何哉。出於不得已而設法以救之。再用燈火以攻托之。但穴法要審視的確。方無差謬。倘或元氣虛弱。又兼大吐大瀉。或專大瀉不止。瀉又淡白色。又有餒餒氣。不惟元氣虛弱。而脾氣又下陷矣。此燈火之不能成功者。必宜用溫中益氣湯。倍加參朮苓苓以壯脾元。痘出而驚搐自定。要知脾元虛弱。燈火切不可用。火能劫其有餘。不能治其不足。慎之慎之。抑有瀝後發搐者。此真氣虛弱。火邪內攻也。以寧神湯主之。有痘後食蒸發搐者。此脾胃虛弱。必面潮熱。以木香大安丸主之。前後具備。驚搐有不治者乎。

証治歌

痘時驚搐勿驚惶。寒熱寔虛貴細詳。毒氣內含難驟發。散宜清解效
非常。毒涵更受風寒感。蘇解散投罔不臧。氣血虛虧難送毒。忽然驚
搐燥而狂。搐生屬後皆同治。宜用溫中益氣湯。毒盛痘苗多鬱遏。口
歪眼吊勢倉皇。敗毒和中散內加羌活。白芷紫蘇熟大黃。更有幼童
牙緊閉。燈心油蘸燂之良。倘逢毒盛兼便結。加味敗毒和中散可嘗。
元氣虛虧還吐瀉。或專大瀉或餽餒。此爲元弱兼脾損。火攻妄用必
多傷。惟用溫中益氣好。參芪苓朮倍加將。搐從屬後中氣弱。湯用寧
神自吉祥。痘後食蒸憑發搐。木香安神丸進利無疆。

寧神湯

人參

麥冬

去心

生地

炙甘草

當歸身

黃連

酒炒

枝仁

炒

石菖蒲

辰砂

入燈心水煎服。

木香大安丸

山查

麥芽

炒

神曲

各一兩炒

只寔

麴炒六分

白朮

土炒兩分

萊菔子

炒四分

黃連

薑炒三分

連翹

去心五分

木香

三分

砂仁

五小

陳皮

八小

右爲細末水泛爲丸炒陳粘米煎湯下量兒大小兒之。

清解散

溫中益氣湯

敗毒和中飲

均見發熱

蘇解散

見見点

頭痛者乃邪氣與真氣相搏。壅遏毒氣。上干清道而然也。故毒熱上騰。與風熱鬱閉。皆能爲害。如頭面痘出稠密。身體壯熱。悶亂昏痛者。此毒火上騰也。以大連喬飲主之。若頭面痘出稀疏。微覺身熱頭痛者。此風熱鬱閉也。宜清解散治之。

証治歌

邪氣相侵痛在頭。風邪毒熱致生愁。倘逢毒火上騰症。壯熱在身面。痘稠悶亂昏疼何藥治。大連喬飲正堪投。若因風熱多鬱閉。頭面稀疏已不侔。身熱尙微頭亦痛。散宜清解自無尤。

方

大連齋飲

見收屬

清解散

見發熱

凡痘當發熱時而腰痛者最爲惡候。蓋腰爲腎之府也。毒火亢極。真陰不能勝邪。故頻頻作痛。須用加味歸宗湯速瀉其毒。不使傳於腎。經脈可望生治。若少緩。毒冲熾。痘必乾黃紫色。腎陰絕。則難救矣。

証治歌

痘逢腰痛最爲凶。邪勝真陰毒火烘。加味歸宗湯速進。莫教毒熾禍無窮。

方

加味歸宗湯

當歸尾

大黃生

赤芍

青皮炒

元參

穿山甲

炙

生地

荊芥穗

木通

羌活

牛子炒研

山查

石水煎服