

民國十二年仲春月出版

版權
所有
翻印
必究

編輯者

章

納川

甄別者

神州醫藥總會

印刷者

上海會文堂書局

總發行

上海會文堂書局

分售處

各省大書局

每部四冊定價洋四角



經絡歌訣小敘

古云。不熟十二經絡。開口動手便錯。如審病在某經。必用某經之藥以治之。庶乎藥病相
當。成功可必。而不然者。病源莫辨。部分差訛。舍此有辜。伐彼無過。其序貽致。邪未正之禍
者。幾希矣。靈樞經脉一篇。為證治之綱領。奈其文句參差。繁複諷誦。不易記憶。尤難讀者
苦之。偶閱東垣醫宗起懦書中。有經絡歌訣十二首。煅為七言。以便誦習。良為盡善。第其
中詞句音韻未盡諧暢。不揣愚聾。僭為增潤。復加奇經歌訣四首。補所未備。其經脉所行
病症所發。下為詳注。使攷者無煩鉤索。讀者不復贅牙。昔日蠶叢。今成理道。適口爽心。詎
不快與。此醫家必讀之書。特為梓之。以公同好。

康熙甲戌休寧汪昂題

經路歌汪昂訥庵著

十二經脉歌

徑而直者為經支而橫者為絡

手太陰肺脉中焦起下絡大腸肺與大腸相表裏胃口行胃之上脘上膈屬肺從肺系

腋下臑肉紫臑下對腋處前於心與心包脉行少陰心下肘循臂骨上廉臑處為肘

自寸口上魚際關前動脉為寸口大指後肉大指內側爪甲根少商穴止支絡還從腕後出

為腕接次指交陽明經隆起處為魚際其間穴名大指內側爪甲根少商穴止支絡還從腕後出

為腕接次指交陽明經隆起處為魚際其間穴名大指內側爪甲根少商穴止支絡還從腕後出

臂之內前廉痛為厥或為掌中熱脉行少陰心主之前肩背痛是氣盛有餘脉絡交于

便數而欠便頻或短或汗出肺主皮毛氣虛亦痛寒病背溺色變及母病少氣不足以報息虛

手陽明經大腸脉次指內側起商陽穴名循指上廉出合谷穴名兩骨兩指岐兩筋中

間行手背外側兩筋循臂入肘廉外行臑外廉肩臑音臑肩前廉柱骨傍上出臑腕經之上

大會此六陽經皆會于大椎故經上下入缺盆內肩下橫絡肺下膈屬大腸表裏支從缺盆

上入頸斜貫兩頰下齒當挾口人中鼻下交左右上挾鼻孔盡迎香本經穴此經血盛

氣亦盛是動齒痛頸亦腫是主津液病所生大腸主津目黃大腸熱口乾無津鼻衄鼻血喉

痺金燥痛在肩前臑大指次指痛不用不隨人用皆

足陽明胃脉鼻頰起山下循鼻外入上齒環唇俠口交承漿下唇頤後大迎頰車裏總下



領下為頤耳下為頰耳前髮際至額顙又循喉嚨缺盆入下膈屬胃絡脾宮相為表裏直者下

乳俠臍中支者起胃口循腹裏下行直合氣街達即氣街遂由髀關抵伏下膝臑為臑臑者下

膝循脰外脈下一足跗足面中指通支從中指入大指屬足之穴經盡矣交足此經多氣復多

振寒呻欠呵欠而顏黑病至惡見火與人血氣盛忘聞木聲心惕惕陽明土閉戶寒臑欲

獨處甚則登高歌棄衣而走奔響腹脹相救而作聲為肝厥足脰狂瘡溫淫及汗出

陽明法多汗歔歔目喝并唇脢音軫唇痛脈頸腫喉痺循喉腹水腫水制膚乳膚乳皆本經乳關六

膝臑股伏兔肉起處肝外足跗上皆痛氣盛熱在身以前身之前有餘消穀消穀溺黃

不足身以前皆寒胃中寒而腹脹壅

太陰脾脉起足大指循指內側白肉際過核骨後孤拐骨張景岳曰非內踝前曰踝上腠

音善足肚也一作端音短循脰側股裏股內前廉入腹中屬脾絡胃相為表裏上膈通俠咽連

舌根也散舌下支者從胃上注心宮此經血少而氣旺是動即病舌本強聲上食則嘔出胃

腕痛心中善噫噫即而腹脹得後與氣大便快然衰衰病脾病身重脾主不能動搖瘕泄積

泄水閉及黃疸脾濕煩心心痛脫即胃食難消食不強立股膝內多腫脾主不能卧因胃不和

手少陰心脉起心經下膈直絡小腸相為表裏支者挾咽繫目系直者從心系上肺膈下腋

循膈後廉出太陰脉心主心之後行之行二脉下肘循臂內後抵掌後銳骨之端掌後小指

傳少中穴交此經少血而多氣是動咽乾少陰心心痛應目黃脇痛繫目渴飲飲臂膈內

廉痛掌熱蒸。

手太陽經小腸脉。小指之端起少澤。本經循手外上腕處為脫出踝中。掌側腕下上臂骨

廉下出肘內側。兩筋之間。臑外後廉。出肩解。脊旁為臂齊上而繞肩胛。肩下成

缺盆。肩下橫直絡心中。循咽咽下。膈抵胃屬小腸。小腸與心表裏支從腋盆上頸。至目銳眦。

入耳中。至本經支者別頰復上頰。音杜抵鼻至于目內眦。內絡顙交足太陽。接溢痛頰腫。

循頰頭難回。不可肩似拔兮。臑似折。出肩耳聾目黃。腫頰間。入耳至是所生病。為主液。

主頰頰肩臑肘臂。廉痛。此經少氣而多血。

足太陽經膀胱脉。目內眦上額交顙。支者從顙入耳上角。直者從顙絡腦間。還出下項循

肩膊。肩後之挾脊。去脊各一寸五分抵腰循脊旋。脊旁絡腎正屬膀胱府。相為一支貫臂

入臑傳。從腰脊下中行行上申下一從臑別貫胛。脊肉挾脊。去脊各三寸行附

臑外為臑合臑行。臑者合貫臑出踝循脊骨。本經穴足外小指外側至陰穴。足交

少此經少氣而多血。頭痛脊痛腰如折。目似脫兮。項似拔。臑似結兮。喘如裂。痔脉入瘡。太

癰狂癰疾並生。癰狂篇亦有軌行太陽經氣不能循經。下目黃而淚出。顙項背腰尻切。高

臑臑病若動時皆痛徹。以上病皆

足腎經脉屬少陰。斜從小指趨足心。湧泉出于然骨。一作谷足內循內踝入跟。足後上喘

臑內廉。尋上股內。後廉直貫脊。會于腎脉屬腎下絡膀胱深。相為直者從腎貫肝膈。入肺

湯頭錢數扶微

卷四

挾舌本循喉嚨支者從肺絡心上注于胸中交手厥陰心包此經多氣而少血是動病飢

不欲食腹內飢而咳唾有血肺入肺故咳腎主喝喝喘腎氣上奔目眩屬腎心懸下刺火坐

起輒陰虛不寧善恐心陽如人將捕之恐志咽腫舌乾葉口熱少陰上氣腎水而為心心痛或

心煩心脈絡黃疸腎水乘脾或腸澼腸或痢或便血及痿痿厥則上厥脊股後廉之內痛

嗜卧少陰病但欲睡足下熱痛切

手厥陰經心主標心包下膈絡三焦心包與三焦為表裏起自胸中膈中支者出脇下腋三寸循臑內

逆太陰肺少陰心中間走入肘下臂兩筋起掌後兩筋行掌心勞宮從中指出中仲後

小指次指交小指內之次是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下重甚則支

滿在胸脇心中憺憺時大動面赤目黃笑不歇是主脈所生病者心主掌熱心煩心痛掣

皆過經脈

手少陽經三焦脉起手小指次指間無名指循腕表手出臂外之兩骨天井貫肘循臑外

上肩交出足少陽胆之後入缺盆布臆中傳兩乳散絡心包而下膈循屬三焦表裏聯焦

與心包支從臆中缺盆出上項出耳上角顛以屈下頰而至頤支從耳後入耳中緣出走

耳前過胆經客交兩頰至目銳眥外膽經連交足是經少血還多氣耳聾噤腫及喉痺少

相氣所生病氣分三焦心汗出多火蒸頰腫痛及目銳眥耳後肩臑肘臂外皆痛廢及小

次指小指次指不用

足少陽脉膽之經起于兩目銳眥邊上抵頭角下耳後循頸行手少陽前三焦至肩都出少

陽後入缺盆中支者分耳後入耳中耳前走支別銳眥下大迎胃經穴在頰前合于少

陽抵于頰下下加頰車下頸連復合缺盆下胸膈絡肝屬膽表裏表裏相為循脇裏向氣

街出使動寸動脉繞毛際入脾厭橫積入脾厭直者從缺盆下腋循胸季脇過章門季脇即肝

經章門穴下合髀厭即髀髀陽外循髀外行太出膝外廉外輔緣外輔骨即膝下抵絕骨出外

踝穴外踝以上為絕骨少循跗面入小次指間支者別跗入大指循指歧骨出其端本節後

為交肝經此經多氣而少血是動口苦胆汁善太息不舒心脇疼痛轉側難足熱反熱面塵

體無澤木鬱不榮頭痛頷痛銳眥痛缺盆腫痛亦腫脇馬刀俠癭頸瘍生少陽痛瘍汗出

相振寒多瘧疾少陽居半表半裏故胸脇脾膝外脛絕骨外踝皆痛及諸節皆經脉

足厥陰肝脉所終大指之端毛際叢乾穴大循足跗上廉上內踝中封出太陰後之脾脉入臍

中內循股陰入毛中繞陰器上抵小腹使胃通屬肝絡膽相為表裏上貫膈布于脇肋循喉嚨

後之上入頰頰頰頰本經系連目系出額會督頂顛達與督脉會于支者復從目系出下行

頰裏交環唇支者從肝別貫膈上注于肺乃交宮交于是經血多而氣少腰痛俛仰難為

工不可俛仰婦少腹腫男瘻瘻脉抵小腹嗌乾喉脉後脫色面塵蒙木胸滿嘔逆及飧泄木狐

疝遺尿肝虛或閉癰肝大

奇經八脉 訥庵補輯

任脉起于中極底臍下四寸穴名中極任脉起于其下二陰之交以上毛際循腹裏行中極穴

上于關元臍下三寸穴名至咽嗑上項循面入目是承結于衝脉起氣街並少陰腎使臍上行胸

中至任脉當臍中而上並出素問骨空論衝為五藏六府海衝起氣街並少陰血海五藏六府所稟氣上滲諸陽

經灌諸精上出下衝上取茲義衛亦有並腎下行者注少陰絡氣街出陰股內廉入

臍中膝後曲處伏行胛骨內踝際下滲三陰胃肝脾灌諸絡以溫肌肉至跗指此篇出靈樞經

足大指入腎脉起少腹骨中央入繫廷孔女人陰廷溺孔絡陰器合篡交名篡至後別繞

臀與巨陽絡太陽少陰比二脉相合上股內後貫脊屬腎行上同太陽起目內眥上額交

巔絡腦間下項循肩內仍俠脊抵腰絡腎此腎脉並太陽循男莖陰莖下篡亦與女子類又

從小腹貫臍中央貫心入喉頤及唇環上繫目下中央際此為並任此腎脉並任亦同衝

脉大抵三脉同一本衝任督三脉皆出于會陰之體靈素言之每錯綜靈樞五音五味篇衝

上循背裏是又言衝任行背故經亦有謂衝脉為督脉者古國經有以任脉循背者謂之

督自少腹直上者謂之任亦謂之督今人大率以行身背者為任從中起者為衝然考任

衝脉居則無穴道似當以此說為正督病少腹上衝心痛不得前後不通衝疝攻此

于衝脉者其在女子為不孕衝主胞胎嗑乾咽喉遺溺及痔瘡絡陰器合篡間此督任病

男病內結女瘕帶帶下瘕聚即衝病裏急氣逆冲骨空論○督者督領諸經之脉也衝者

其氣上衝也任者女子得之以任養也驕脉陰驕乃少陰腎之別脉起于然骨足內踝大骨至內踝直上陰

股入陰間上循胸入缺盆過出人迎前胃經動脉入頤頤皆目內眥合于太陽陽驕和陽驕

于膀胱經之甲脉穴足外踝此皆靈素說奇經。任脉衝脉督脉帶脉陽脉陰脉謂之奇經八脉帶及二維
下陷中此段出靈樞經度篇為一。帶脉約束一身如帶陽維陰維周圍
說破。帶脉約束一身如帶陽維陰維周圍
敘

敘

天地人物一氣而成者焉。女媧氏煉石補天。而天可補。古聖王嘗藥辨性。而民疾瘳。醫之
一術。奪造化增年壽。與天地人合德。道非不高也。智非不遠也。補偏救弊。古今中外。無一
不賴醫師。技之精。術之仁也。故泰西各國視為最尊最重之專門學術。余何人斯。敢以一
知覺抵掌而談乎。然一事必有一義。一義必有一理。義雖繁而理則一。六感七情之發。候
不外乎寒熱虛實。七劑十方之治法。不外乎溫涼補瀉。三百六十之方法。不外乎內傷外
感。五味六性之藥石。不外乎陰陽表裏。入藏入府之錢數。不外乎單雙輕重。此簡而言之
者也。若煩言之。竊恐紙短言長。硯池加水。而亦未遑矣。因症有千端。變成萬計。藥出千方。
君臣錢數配偶之間。變化無窮。而無極。故方書充棟。而症藥終不齊者。全藉臨證而補備
之也。如達疑難重症。無成法可考。古人雖有方。而仍云不治者。謂之不能脫體或遵法而亦
不愈。余必參古說。加以手法開方。每多取效。兼有加劇者。即易法治之。無不效而愈也。蓋
既效矣。恐致散失。故錄醫案。以備查閱。乃本集共成三卷。尚缺一卷。因以向所購求於世
醫各家之秘本。惟所受之時。言明不傳於世。不得自主。茲將前後所記之疑難案。配成一
卷。共成四卷。隨診隨記。故不分門類。方雖有效。鄙陋無文。不足登諸几席。識者尚須深諒。

之耳。

按病症百出。變幻迷離。譬如心病。治及於腎。而病又重者。若徒論脉息。見証祇知心腎病而已矣。不易分辨。如治者。作腎病治。及於心。病即轉劇。故必須轉方多。始有救而愈矣。

章納川疑難雜症醫按

右產後血虛自汗。小腹跳動。脉洪兼數實。右寸脉盛。左寸微。仲聖謂氣傷於熱。肺脉微。合此症類推。心脉微。属血熱血虛。治以清氣血。兩火。則汗自止。

北沙參

麥冬

細生地

錢各三

丹皮

連翹

生芍

半各錢

焦桅皮

象貝

錢各二

桑葉

錢一

竹葉心

支十

辰砂拌燈心

丸一

右產後血脈空虛。寸口搏緊而長。若洪數實之象。兩尺弱。小腹仍似有一物異常跳動。心膽如驚。必大汗出。前刺汗止。跳動如常。胃口頗好。乳汁亦多。此由少陰血熱不固。汗為心液。故泄。內經云。心脉搏緊而長。病名心疝。小腹當有形也。故小腹跳動。然此症究非心疝。不過跳動則一。跳動者。衝任之絡空虛。當以填瀆腎竅。清心熄風。鎮固方法。候請高明者政之。

山藥

錢四

玳瑁

分六

熟地

錢三

生芍

當歸

麥冬心

地龍炭

錢各二

川芎

錢一

補骨子

分八

牛膝

錢半

雞子黃

沖一

枚

右前劑已效小腹跳動既減其六七仍以原方加減然此項脈證先聖先賢本無成方成法醫者是當隨機應變然尚須防有變端

右據述小腹微有跳動補瀆腎竅可也然濕熱下注白帶較多加清涼濕熱以交通金水

鹽水炒山藥

錢五

地龍炭

牛膝

茯苓

龍骨

錢各三

生芍

錢二

川貝

錢二

通草

錢一

川連

分四

薏仁

錢四

右據述向有白帶時時眼目暈暗今帶止也腫由脚起已至小腹咳嗽氣急多痰寤寐即若有鬼與語白日打睡亦然晝夜不安其鬼語至醒時不忘均謂其心神不安予診脉脉雖虛皆平惟左關細軟此乃久鬱於中惟胆所受書曰十一臟皆取決于胆蓋胆為鬱所結故有是夢非鬼也開鬱可也逍遙散加烏藥香附○後聞此人只吃兩劑百病全除藥能對症愈竟如是之速故誌之

左向有肝陽脾胃必敗今腹痛似痢欲解不解肛門痛甚而後重作痢疾醫日下四五十次延余診治脉弦兩尺浮浮部有不能充足之勢肝木尅脾土乃風泄症仿紹醫陳免亭法最屬相當

醋炒柴胡

生成茂

煨防風

錢各三

烏梅肉

炒殭蠶

生甘草

廣皮

半各錢

黃土

兩二

谷芽

兩二

先煎代水

左前劑痛瀉已止脉息大轉仍以原方去烏梅加生白朮煎一沸取起

左吐血四載。脉已牢實。而盜汗咳嗽頭重且痛。胸悶腹脹。四肢無力。胃少納食。大便溏泄。小便數欠。時黃時清。此皆陽盛陰虛之現症。閱服諸方。均以涼血補陰。或滋陰清熱。不合脉症。混以吐血為陰虧。無怪成為不治之重症。雖然。症虛脉實。病家最忌。血症尤甚。先賢本無成法。脉經直曰不治。今醫生僅知不治而已。何不補先人之未備耶。然補陰滋陰。緩不濟急。合此脉症。法當敗陽以和陰。立方請先嘗之。

烏藥

鬱金各錢半

青皮

川芎

廣皮

青蒿

各錢半

香附

浮小麥

各錢半

姜黃

各錢半

白芍

錢二 炒枳壳

分五

左前劑散氣敗陽。則陰自和之法。而病不加損益原方加柴胡錢半。以升散厥陰之陽。左診脉牢實已減。據述服藥之時。胸中甚快。如分開狀。盜汗已止。各症少寬。以開鬱補血治之。

小茴香拌炒當歸

丹皮

鬱金

香附

柴胡

各錢半

白芍

茯苓

各錢半

薄荷

各錢半

地骨皮

錢三 青皮

錢一

左據述胸中氣悶全消。納穀稍旺。當補血以養陰。

小茴香拌當歸

砂仁拌熟地

地骨皮

破麥冬

北沙參

各錢三

鬱金

錢半

白芍

錢二 川芎

錢一

左據述服前劑。頭暈腹脹加增。脉又見弱。知不當進凝滯血藥。仍用前意。

鱉血炒柴胡 白芍 茯苓 丹皮 烏藥各錢半 煨防風 青皮分八 桑葉錢一 丹皮錢半

左前劑大效。少有腹脹未盡。此乃肝風乘脾之餘波。此後可保永不見血耳。貴恙必起。可無慮也。

明天麻 當歸 桑葉各錢半 生朮錢二 炒芍錢二 鬱金 焦山桅 丹皮各錢半

左前方四劑。其病悉退。全無苦楚。當以順氣養神立方。

香附 骨皮各錢半 炒芍錢半 南芩錢四 砂仁分六 烏藥錢一 棗五枚

左據云。與尊聞爭鬧。頭重腹脹心悸。不睡妨食。此乃心火上升。當鎮陽法治之。

生牡蠣錢四 桑葉錢半 丹皮 白芍 香附各錢三 炒青皮錢一 金箔張一

左氣血並虛之氣症。氣愈虛而愈逆。故伐肝神爽。補血無功。但肝愈伐而愈強。久伐非宜。補氣有碍於肝邪。補血又碍於陽陷。前製之方。尚稱合法。今日惟有遵用東垣調中益氣湯。去升麻。必須照用其錢數。則效。服二十劑。

右懷孕五月。氣火侵胎。上衄下崩。藥不能進。診左關脉動滑。氣與血爭。不能收瀦。故崩。以

順氣清涼肝木治之。

香附 青黛包煎 生芍 焦梔皮 黃芩各錢三 砂仁錢一 桑葉錢半 生草分八

炒青皮分八

右前方入口不吐。崩漏已止大半。仍以清肝順氣立方。不致傷胎。

地榆炭

錢三 香附 錢三

砂仁

青皮

各八分

烏藥

半錢

生芍

錢三

焦山梔

錢三

炒子芩

夏枯草

錢四

按此症本非疑難。在紹服藥與物嘔吐不能進。入滬而求西醫。服藥仍嘔吐。安治於余。服頭煎不吐。復看中醫兩人。一以止血藥中加五味子。一以止血藥中加荳蔻。皆以止血用收斂之藥。異矣。夫聖訓氣火發之。輕則折之。今業醫者。以遏之斂之。寧不知醫法。而話病開方。如此症者。若服其方。禍不旋踵矣。幸而吾方先救耳。

素有疾飲喜吃熱湯。陰寒可知。去冬感受風寒。咳嗽較增。醫以清肺下氣消痰。愈醫愈劇。以致腹脹且硬。及手足至頭。惟左手不脹。初春肝木旺令。脾胃益衰。大便水瀉不止。小便點滴不見。每日食粥碗許。值至仲夏。毫無轉機。據云諸醫覆絕。不治之症也。診脉細弱。左手不脹。非旦夕可危之症乎。痰濁附過三焦。阻滯氣道。水食不分。故盡從大便而出。今先開達肺氣。合下病治上之法。又合經旨。氣化乃能出也。必得小便。

桔梗

荊芥

杏仁

清炙甘

蘇葉

各一錢

生姜

橘紅

各八分

砂仁

沖

六分

麻黃 分三

服前兩劑。小便頗見點許。而中寒濕滯。以桂枝五苓散加川朴。

前劑未效。小便仍屬點許。乃痰涎壅附三焦。氣不運化。草木何功。必得大降痰濁下出。並扶中陽。必無妨礙。

炒朮

錢二

益智仁

錢一

乾姜

半錢

大腹皮

炒芍

各三錢

黨參

八分

礞石滾痰丸

錢四

前劑以礞石滾痰丸打痰從大便而出腹脹稍退而軟然肺中之痰不動醫法治上焦痰飲當吐今久病不可用此治寔證之法以羌活勝濕湯使其風濕之痰自出亦合經義治法蓋汪詒庵云此湯發汗升陽有異功非虛語也何以故要知陽升則濁降如不降者必上出斷不能仍留肺中耳此湯取肺中之痰予可必也○錢數輕重照本方用加減不效

服前湯吐痰極多一嗽吐出二三口上身腫脹皆退而瀉利傷陰今當立止

柯子 炒朮 姜夏 茯苓 黨參各二錢 益智仁錢一 陳皮錢半 砂仁錢一 升麻錢四分

瀉止腹中不爽此由脾虛下陷滑久而然氣不旺運仍補中宮原方去柯子加木香荷葉山藥

便溏不瀉頗能進食惟小足肚脹猶不盡而脾通四肢必得脾胃健運可愈仍以原方去木香加南星白芥子不可貪涼多食切切

據云胃能進食兩碗四肢無力此乃餘痰留在筋絡所致

老東參錢三 炒朮錢二 炙草分六 棗枚五 送服挖涎丹錢三

藥停不旬日寤寐吹風時時納食面目浮脹腹又瀉利咳嗽以金沸草散加減

金沸草 前胡 細辛各一錢 荊芥錢半 姜夏分五 甘草分三 赤苓分六 生薑片一

薄荷分三 炒朮 乾姜錢各二 炒枳壳錢半

腫退咳緩仍以健脾和胃而愈。

左稚年自遺先天本薄數年前連遺竅滑不固以致赤色乃全身氣液下注不及化而然據述吸洋烟後遺勢少緩至今難出自日痰中帶紅虛陽上越面白氣餒證屬陰陽兩虛六脉弦細無力左關尤甚但知無夢自遺病在肝腎夫腎為胃關木得所侮以致精竅常開失司無管束之權久遺竅滑當胃腎肝同治。

姜汁炒山藥

錢四

茯神

錢三

當歸

錢二

江西朮

各錢半

炒芍

錢二

熟地

錢三

肉桂

沖

五分

五味子

錢七

鎖陽

錢一

夫遺精之症患者亦多余熟審之矣照古法固精潰竅百無一愈安心定志亦不見效凡遇此等證候余必以別開心法用壯陽種子海狗腎丸夾以湯藥醫全甚眾因此症玄奧竅滑者腎氣無根故也細底甚煩告大略耳。

中年肥胖內氣不充微咳口乾或以潤燥生津或以下氣止咳潤肺反加嘔吐且有作消渴治者亦均無效余看舌苔多津此乃痰氣積阻中脘脾土不升生肺金以致發渴嘔吐用小半夏茯苓湯一劑先清痰氣則渴嘔可止矣不可謂半夏性燥渴家所忌此乃金匱之法必為飲家所宜半夏本為嘔家之聖藥茯苓為渴家之要劑可放心服之。後以二陳湯而愈。

診治氣火入脹肝脾為病已經達到頭足眼白面黃黑腰重及內脹痛穿於尾脊兼有寒

凜熱蒸頭重無汗。大便澹泄。一日兩三次。此臟腑絡衝督之脉。皆受熱毒。阻滯不通。丹事紫黑如渣。尺脉不見。寸關微細。手足中一撞甚痛。此乃氣火又積于皮膜。毫管煉毒而然。理宜解毒而清氣血。以銀翹散法。即王孟英熱毒發瘡瘰之法也。

銀花

錢六

烏藥

錢半

米仁

錢四

桔梗

丹皮

連翹

川貝

焦山梔

赤苓

錢三

中

中

病家問曰。尺脉既無。寸關微細。何知熱毒之症。余曰。仲聖云。氣傷於熱。肺脉微。而合內經。壯火食氣。故微。今血分亦熱。左寸關亦當微也。尺脉不見。謂之無根。病當不久。今觀形體無傷。月況如渣。手足無恙。撞着甚痛。以脉合症。熱毒熱氣何疑。且病在肝經尤甚。與病者如此言。對牛彈琴。不入耳。後聞下部發馬刀瘡。大用清涼解毒之藥。數月而愈。瘡痕未發之時。豈非亦疑難乎。

女子二七而天癸至。七七而天癸絕。此其常也。今臻年。咳嗽經閉。醫不得法。多致不救。經曰。月事不來者。胞脉閉也。因熱氣攻于上。迫肺作咳。病肺勞不病血瘕也。與血瘕血枯等證有別。

當歸

錢半

白芍

錢一

川芎

分六

製軍

錢一

黃芩

分六

連翹

分七

焦梔

錢一

薄荷

分三

疑醫莫用。用醫莫疑。余向少用見症治症之藥。真病必須真方治之。此名三和湯也。肺勞而不病血瘕之對症方。出自醫宗金鑑。醫生豈敢無學以欺人耶。但此一二劑恐難見效。○因病家不信余方。又為我不用湯頭。故方後又批之。