

傷寒呃逆例

夫呃逆者俗謂呃忒是也纔發聲於咽喉則遽止然連續數聲其聲短促不長古謂之噦非也噦與呃無異但濁惡而長比之呃忒大相徑庭矣若將呃逆混為噦與咳悞人尤甚然呃逆有因胃中實熱失下而作有因胃中痰飲而作有因服寒涼之藥過多胃中虛冷而作且其氣皆逆胃起至胸膈之間而為呃

或矣胃熱失下大便不通者承氣湯下之便軟者

瀉心湯主之有潮熱小柴胡湯胃虛有熱者橘皮

茹湯主之有痰飲者橘皮半夏生姜湯主之

加茯苓

枳實陳皮桔梗若胃冷者橘皮乾姜湯主之甚者丁

附理中湯加吳茱萸主之若過服寒涼藥多胃寒呃

忒者丁附理中湯加吳茱萸木香姜汁主之凡其氣

自臍下直冲於胸噎間呃忒者此陰症呃忒也其病



下虛內伏陰火或誤服寒藥遂至冷極於下迫其相
火上冲卒集於胸中而為呃忒病人煩燥自覺熱甚
他人以手按其肌膚則冷此為無根失守之火散亂
為熱也非實熱也乃水極反似火陰症似陽也若不
識此誤用涼藥下咽即死當用羌活附子湯加官桂
人參木香青皮半夏砂仁急溫其下令其陽回陰火
降呃忒乃止也若陰症及因胃寒呃忒不止者外用

乳香硫黃散嗅法內用丁香柿蒂散服之則止再灸
奇門中腕氣海關元此良法也但手足溫煖脈至者
為有生矣又有瘀血而呃瘀有形物也壅塞其間雖
柿蒂不應矣

瀉心湯

治胃熱呃逆而便軟者

半夏_下 黃芩_中 乾姜_下 人參_下 黃連_上 甘草_下 加

茯苓 陳皮 水姜煎服

加味小柴胡湯

有加減法

治陽症口苦脉弦發熱呃忒者或潮熱呃忒者

軟柴胡

上

黃芩

中

半夏

下

炙甘草

下

人參

中

當歸

下

痞加枳實黃連渴加花粉知母心煩加姜汁黃連

水姜煎服

橘皮半夏生姜湯

自有加減



治伏痰飲呃忒者

陳皮 半夏 生姜 加白苓 枳寔

桔梗

砂仁 心煩加姜汁黃連 水姜煎加姜汁服

羌活附子湯

自有加減

治陰疰寒極嘔逆呃忒者 水姜煎磨木香姜汁

溫服之

羌活 上 附子 上 茴香 中 丁香 中 乾姜 下 甚者加吳



茱萸官桂砂仁人參陳皮寒氣逆上加沉香腹中痛加良姜

丁附理中湯

自有加減

治胃寒呃逆及治服寒涼藥過多傷胃呃忒者

丁香

上

附子

中

乾姜

中

人參

中

甘草

下

加吳茱萸

官桂

中

砂仁

陳皮

中

甚者加良姜

水姜煎磨

木香姜汁溫服



橘皮乾姜湯

治胃中虛寒呃逆者

橘皮 乾姜 加半夏 白朮 砂仁

寒重不止用前丁附理中湯甚良

乳香硫黃散

治陰寒呃忒不止者用此劫之

乳香

硫黃

錢各二

為末用好酒一鐘煎數沸乘熱



北京中醫藥大學圖書館版權所有

氣使病人鼻嗅之外用搗生姜擦胸前氣效

丁香柿蒂散

治陰疝呃逆及胸中虛寒呃逆不止者

丁香

柿蒂

各一錢五分

茴香

乾姜

良姜

陳皮

錢共為細末用熱姜湯調下不止再服

灸期門法

婦人屈乳頭向下盡處骨間動脈是穴男女乳小



者以手一指為率陷中動脈是六男左女右

五壯

傷寒胸脇滿例

胸脇滿者胸滿乃腹間氣塞滿悶非心下滿也脇滿

者脇肋脹滿非腹中滿也蓋表邪傳裏必先胸以至

腹入胃是以胸滿多帶表症宜微汗脇滿多在半表

半裏之間宜和解之又有邪熱或痰食結在胸內為



寔者必須湧吐之也傷寒胸滿心煩者柴胡陷胸湯
脇下硬加青皮牡蠣粉往來寒熱胸脇滿者小柴胡
加桂白芍脇下痛加青皮川芎木香若胸中痞氣滿
悶小柴胡加枳寔未效加瓜蒌黃連渴去半夏加貝
母乳葛渴甚加天花粉治痞悶須用枳殼桔梗為要
藥經云病人手足冷脈乍緊邪結在心胸中心下滿
而煩饑不能食病在胸中宜吐之又寸脈微浮或伏

胸中痞硬氣上冲咽喉不得息此為胸中有寒者宜
吐之有痰寔結胸中亦宜吐之用瓜蒂散著胸脇不
快腹滿悶唇青手足冷脉沉細少情緒或腹痛欲嘔
者此因生冷傷於太陰脾土用理中湯去參朮加砂
仁枳殼木香內寒甚者加丁附兼有外感寒者用五
積散加減治之大抵枳殼瀉至高之氣枳寔瀉至低
之氣故心之上胸之分枳殼瀉之心之下胃之分枳

寔瀉之瓜蒌仁能瀉肺洗滌胸中痰垢之要藥故胸
滿而煩者加之外用生姜搗杵去汁炒熟揉熨胸脇
大抵陽症不可太熱絹色漸：揉熨胸脇或痰或滿
或痛或氣或硬或食或寒俱用此法以辛散之自然
寬矣若悞服寒涼藥過多反成寒寔結胸脹滿不通
湯藥不入者又當用姜附丁桂以溫開之及中寒邪
結胸脇間與此同治

傷寒結胸例

結胸痞氣雖開前條恐論未盡故再明之蓋結胸者緣太陽痞自汗當服桂枝湯散其邪悞用承氣下之

表邪乘虛內陷結於心胸間及成結胸也當分輕重

治之未經下者非結胸也乃表邪傳至胸中未入乎

腑症雖滿悶尚為在表正屬少陽部分只須小柴胡加枳桔以治其悶如未效以小陷胸合小柴胡去半

夏一服如神世俗皆不知其妙若真結胸不按自痛
連臍腹硬手不可近大渴大熱者名大結胸用大陷
胸湯若按之方痛心下硬名小結胸用小陷胸湯右
懊懷發熱煩渴心下痛硬大便秘昏悶名熱結胸少
與大陷胸湯加黃連若懊懷滿悶身無熱口不渴者
名寒結胸用枳實理中湯重則三物白散若心怔冲
頭汗出無大熱先渴後悶揉之有聲汨汨者名水結

胸用半夏茯苓湯傷寒陽症吐衄血不盡蓄在上焦
胸腹脹滿硬痛身熱漱水不咽喜忌如狂大便黑小
便利名血結胸用犀角地黃湯又有食結支結微結
痰結治各不同要在明辨治之凡結胸症悉具煩燥
者死結胸脉浮大者不可下下則死陽明病心下硬
滿不可下下之利不止者死此邪氣自表傳裏猶未
為寔宜吐之凡結胸有兼發黃斑發狂或呃忒者最