

名醫類案

弟十二

S28

1783

1p11



名醫類案卷第十一

新都篁南江瓘集

後學

仁余 錢塘 魏之秀 王橫 重校
和沈 鮑廷博 以文

經水

太倉公治一女病腰背痛

少陰病 兼太陽

寒熱

厥陰病 兼少陽

衆醫皆以寒

熱治公診之曰內寒

內寒當作 陰病解

月事不下也即竄以藥旋

下病已病得之欲男子不可得也所以知其病者診其脉

時切之腎脉也。嗇而不屬。嗇而不屬者其來難堅。

氣鬱血 滯而脉

結

故曰月不下肝脉弦出左口。

相火熾盛 脉乃上溢

故曰欲男子不



可得也。琇按以上史記本文下所增入祇泛論無病之人乃以弦出左口爲血盛之脉與原文相背何耶

蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛則思室女子血盛則懷胎夫肝攝血者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知矣。痕按此案已見腰痛門

東垣治一夫人病寒熱月事不至者數年矣又加喘嗽醫者悉以蛤蚧桂附等投之李曰不然夫人病陰爲陽所搏大忌溫劑以涼血和血之藥服自愈已而果然

一婦人年三十歲臨經預先臍腰痛甚則腹中亦痛經縮二三日以柴胡錢半羌活一錢丁香四分蝎一個當歸身一錢生地一錢都作一服水二盞煎至一盞去渣食前稍熱



服丁香本草言其辛散苦降養陰治陰痛諸氣

一婦年三十餘因每洗浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先小腹大痛口吐涎水經行後又吐水三日其痛又倍至六七日經水止時方佳百藥不效久病診其脉寸滑大而弦關尺皆弦大急尺小於關關小於寸所謂前

大後小也

前大後小之故恐有表邪

遂用香附三兩半夏二兩茯苓黃

芩各一兩半枳實元胡索牡丹皮人參當歸白朮桃仁各

一兩黃連七錢川練遠志甘草各半兩桂三錢吳茱萸錢

半分十五貼入薑汁兩蜆殼熟服之後用熱湯洗浴得微

汗乃已忌當風坐臥手足見水并啣生冷服三十貼全愈

半年後因驚憂其病復舉。新發故不用參朮腰腹時痛小便淋痛

心惕惕驚悸意其表已解。冷水淋身之表病獨在裏先為灸少冲

手少陰心勞宮心包絡崑崙膀胱三陰交足太陰脾止悸定痛次用桃仁

承氣湯大下之下後用醋香附三兩醋蓬朮當歸身各一

兩半醋三稜元胡索醋大黃醋青皮青木香茴香滑石木

通桃仁各一兩烏藥甘草砂仁檳榔苦練各半兩木香吳

茱萸各二錢分作二十貼入新取牛膝濕者二錢生薑五

片用荷葉湯煎服愈

一婦頭痛口乾經行後身痛腰甚痛以生地黃一錢白朮芍

藥各一錢川芎歸身尾各五分炒栝炙甘草各三分

一婦年二十餘。經閉二年。食少乏力。以黃連二錢。白朮錢半。陳皮滑石各一錢。黃芩五分。木通三分。桃仁十一個。炙甘草少許。

滑伯仁治一婦年三十。每經水將來三五日前。臍下疔痛如

刀刺狀。寒熱交作。下如黑豆汁。既而水下。因之無娠。脉二

尺沉。瀋欲絕。餘部皆弦急。曰。此由下焦寒溼。尺沈瀋屬下焦寒溼邪

氣搏于衝任。衝任俱奇經衝為血海。任主胞胎。為血室。故經事

將來。邪與血爭。而作疼痛。寒氣生濁。下如豆汁。宜治下焦

遂以辛散苦溫理血藥為劑。令先經期十日服之。凡三次

而邪去經調。是年有孕。



呂滄洲治一女在室病不月諸醫療皆不得其狀視之腹大如娠求其色脉卽怪語之曰汝病非有異夢則鬼靈所憑耳女不答趨入臥內密語其侍嫗曰我去夏追涼廟廡下薄暮過木神心動是夕夢一男子如暮間所見者卽我腹親狎由是感病我慚赧不敢以告人醫言是也嫗以告呂呂曰女面色乍赤乍白者愧也脉乍大乍小者祟也病因與色脉符雖劇無苦乃以桃仁煎下血類豚肝者六七枚俱有竅如魚目病已

汪石山治一婦年踰三十無子診視其脉近和惟尺部覺洪滑耳曰子宮有熱血海不固也其夫曰然每行人道經水

卽來乃喻以丹溪大補丸加山茱萸白龍骨止澁之藥以治其內再以亂髮灰白礬灰黃連五倍子爲末以治其隱處果愈且孕

丹溪治一婦年二十歲兩月經不行忽行小腹痛有塊血紫色以白芍白朮陳皮各五錢黃芩川芎木通各二錢炙甘草少許

一婦氣滯血澁脉不澁經不調或前或後紫色苦兩大腿外

臙少陽經麻木有時痒生瘡大便秘滯以麻子仁桃仁去皮

尖芍藥各二兩生枳殼白朮歸頭葳靈仙訶子肉生地陳

皮各五錢大黃治血澁煨七錢大黃配訶子亦奇爲末粥丸



一婦年四十八歲。因有白帶。口渴。月經多。初來血黑色。後來血淡。倦怠。食少。臍上急。以白朮錢半。紅花豆大。陳皮白芍各一錢。木通枳殼各五分。黃芩砂仁炙甘草各三分。共丸。味煎湯下。保和丸三十粒。抑青丸二十粒。

一女年十五。脉弦而大。不數。形肥。初夏時倦怠。月經來時多。此稟受弱。氣不足。攝血也。以白朮錢半。生芪陳皮各一錢。人參五錢。炒栢三分。虛而協熱

一婦年四十餘。月經不調。行時腹疼。行後又有三四日淋瀝。皆穢水。口渴。面黃。倦怠無力。以白朮一兩。歸身尾六錢。陳皮七錢。黃連三錢。木通二錢。生芪黃芩各二錢。炙甘草一

錢分作八貼下五靈脂九四十粒食前服

一婦月經不勻血紫色來作痛倦怠惡寒爲人性急以青皮五分川芎黃芩牡丹皮茯苓各二錢乾薑一錢炙甘草五分

一婦年二十歲月事不勻來時先腹隱疼血紫色食少無力以白朮四錢黃連陳皮各二錢半牡丹皮二錢木通黃芩人參茱萸各錢半炙甘草五分分作四貼水二盞煎取小盞食前服

一婦年二十餘形肥痞塞不食每日臥至未飲薄粥一盞粥後必吐水半碗仍復臥經不通三月矣前番通時黑色脉



辰時寸關滑有力。午後關滑寸則否。詢之因乘怒飲食而然。遂以白朮兩半。厚朴黃連枳實各一兩半。夏茯苓陳皮。山查人參滑石各八錢。砂仁香附桃仁各半兩。紅花一錢。分作十貼。每日服一貼。各入薑汁二蜆殼。間三日以神祐丸神秘沉香丸微下之。至十二日吐止。食漸進。四十日平復如故。

一婦年三十餘。形瘦。亦痞不食。吐水。經不通。以前藥方加參朮歸爲君。煎熟。入竹瀝半盞。薑汁服之。但不用神祐丸下之。亦平復。或咳嗽寒熱而經閉者。當于欬門溼痰條求之。

子和治一婦人月事不行寒熱往來日乾頰赤喜飲且暮間
咳一二聲諸醫皆用蠶蟲水蛭乾漆硃砂芫青紅娘子殺
藥血竭之類子和不然曰古方雖有此法奈病人服之必
臍腹發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進內經曰二陽之
病發心脾心受之則血不流故不月也既心受積熱宜抑
火升水。流涇潤燥開胃進食乃涌出痰一二升下泄水五
六行。涇水上下皆去。血氣自然周流月事不爲水涇所隔
自依期而至矣。不用蠶蟲水蛭有毒之藥如用之則月經
縱來小便反閉他證生矣。凡精血不足宜補之以食大忌
有毒之藥偏勝而成天閼。

一婦人年三十餘、經水不行、寒熱往來、痰能作寒熱、面色痿黃、

無

症

唇焦、頰赤、時咳三兩聲、向者所服之藥、黑神散、烏金丸、

四物湯、燒肝散、鼈甲散、建中湯、寧肺散、針艾百計、轉劇、家

人意倦、不欲求治、子和憫之、先涌痰五六升、午前湧畢、午

後食進、餘症悉除、後三日復輕涌之、又去痰一二升、食益

進、不數日、又下通經散、瀉訖一二升、後數日去死皮數重

小者如麩片、大者如葦膜、不一月、經水行、神氣清健、

吳茱山治一婦、行經時著氣惱、經過半月後、得心腹腰脇痛、

不可忍、醫作氣治、以香燥止痛之劑服之、愈不安、診其脉、

弦急不勻、早間行經、著惱乃瘀血作痛也、遂以四物入桃

仁紅花延胡索莪朮青皮之類。數服血通其患已矣。

一女子經水過多行後復行面色痿黃人倦無力遂以歸身

炒芍熟地川芎荆芥續斷煨乾薑炙甘草數服而安。

一婦經事欲行臍腹絞痛臨行血澁以四物入延胡索檳榔

青皮香附子之類。數服痛除。

一婦行經色淡若黃漿心腹嘈雜嘈雜爲痰飲此脾胃溼痰故也。

以二陳湯合四物入細辛蒼朮數服卽止。

一女子經水下如黑豆汁此絡中風熱也。經如黑豆汁絡中風熱妙斷亦有

下焦寒溼而經水如豆汁者但症當寒熱腹痛尺沈澁寸關弦一爲寒溼一爲風熱須細辨以四物加

黃芩川連荆芥穗蔓荊子治以辛涼苦寒理血之劑數服血清色轉



各醫案卷二
一婦經來適斷。寒熱往來。以小柴胡湯二服。寒熱即止。繼以四物湯數服而安。

一婦經血過多。得五心煩熱。日晡潮熱。諸藥不效。以四物如胡黃蓮三服而愈。

俞子容治一婦寡居。鬱結成疾。經事不行。體熱如炙。忽吐血。若泉湧。醫用止血藥不效。俞以茅草根搗汁濃磨沉香服。

至五錢許。日以醃醋貯瓶內。火上炙熱。氣冲兩鼻孔。外治法佳

血始得降下。吐血不復作。經事乃行。吐血如泉止而不效。他人必用血脫益氣。

之說。今用降而愈。亦以寡居而經不行。氣升而不降。治法甚奇。當玩體熱如炙四字。蓋吐血湧泉。當四肢冷。未有體

熱如炙者。

莫中一侍人久病經阻發熱咳嗽倦怠不食憔悴骨立醫
往往作療疾治之勢甚危莫曰婦人以血爲本血榮自然
有生理因謝衆醫專服四物湯其法咬咀每慢火煮取清
汁帶熱以啜之空腹日三四服兩月餘經通疾如失

潘璟字溫叟名醫也診屯田郎中張譚妻年四十餘而天癸

不至潘察其脉曰明年血潰乃死既而果然

博按此條已見積塊門

石山治一婦瘦少年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛

惡寒喜熱或時感寒腹亦作痛脉皆細濡近滑兩尺重按

畧洪而滑汪曰血熱也或謂惡寒如此何謂爲熱曰熱極

似寒也遂用酒煮黃連四兩香附歸身尾各二兩五靈脂

一兩爲末。粥丸。空腹吞之而愈。

一婦經行必瀉三日。然後行。診其脉皆濡弱。曰。此脾虛也。脾屬血。屬溼。經水將動。脾血已先流注血海。然後下流爲經。脾血既虧。則虛而不能運行其溼。令作茯苓白朮散。每服二錢。一日米飲調下二三次。月餘經行不瀉矣。

一婦產後經行不止。或紅或白。或淡。病踰八月。面色黃白。性躁頭眩。脚軟。醫用參芪補藥。病益加。用止澁藥不效。汪診之。右脉濡弱無力。左脉畧洪而駛。曰。右脉弱者。非病也。左脉偏盛。遂覺右脉弱耳。宜主左脉。治以涼血之劑。遂以生地白芍白朮各一錢。黃芩阿膠歸身各八分。陳皮香附川