

莆田林清標韋亭氏輯著

救急

縊

溺

冬月溺凍死同

夏月熱死

無故縊

自刎幾斷

中風不語

中風

半身不遂

絞腸沙

陰症腹痛

傷寒同

霍亂吐瀉

乾霍亂

卧忽不醒

中風牙關緊閉

喉風舌大

舌人喉閉

回祿烟薰

穀芒刺喉

飛絲入喉

物壓心頭

鬼壓不省人事

暴死未絕

驚嚇死

續

救縊

治五絕

喉脾危急

牙關緊閉

舌無故出血如泉

舌忽長

舌忽脹出口

毒蛇咬

霍亂

上不能吐
下不能利

解中毒

砒霜

斷腸草

巴豆

百藥毒

桐油

蒙汗藥

鹽鹵

河魴白

諸魚毒

籠毒

蟹毒

鉛毒

燒酒毒

葦磨菰諸藥

及閉口川椒毒

閉口川椒

烏頭附子天雄

杏仁

水粉

半夏

藜蘆

阿芙蓉

卽阿片

川烏草烏附子

飲饌中毒

鱖鼈蝦蟇

鱖魚

茵

食柿與蟹

煤炭

蠱毒

預防中毒法

莆田林清標亭亭氏輯著

救急

救縊二條

凡縊死者。從早至夜。雖僵冷。亦可救。從夜至早。稍難。但心下微溫。一日以上。猶可救。救法不可大聲喧鬧。不可截斷繩帶。若截斷所縊繩帶。則難再救矣。惟用一大力人。輕輕抱起。另一人用物墊腳。將所縊繩帶。細心就其條理。輕解緩鬆。若太遽。則喉

竅一時難通。反致氣壅而死。既解下扶定其頭。勿
令側倒。安放平地。仰面向上。先將大小便處用綿
軟之物塞緊。勿令泄氣。用一人坐於頭前。兩腳蹬
其兩肩。揪其頭髮。當令緊直。一人將益傷之喉。輕
輕撫摩。撚整漸圓。使喉項通順。以手摩擦胸上散
動之。又摩擦臂足曲伸之。若已僵。但漸漸強屈之。
並摩其腹。又用二人將細筆管或葦管入耳內。不
住口吹氣。務要多摩多吹。如有廣西正山羊血。只
用二三厘。不可太多。研令極細。南酒或黃酒灌下。

不可用煖酒無不立活。凡用酒氣急而灌入喉中
塗喉下及滴鼻中。男左女右亦立活。如皆無則以
藍靛青汁灌之亦活。○又法用皂角細辛等分爲
末如大豆許吹兩鼻孔。或皂角末或樛上塵吹鼻
噴嚏卽活。

收溺四條

用牛一頭將溺水人肚腹橫覆牛背上兩邊扶定
徐徐牽牛而行以出腹內之水如醒仍用艾炙臍
上下數壯。或以皂角葱白同搗爛爲丸納下部內。

水盡卽活○又法以酒罈一個紙錢一把草紙亦可燒

放罈口急以罈口覆其臍上冷則仍燒紙覆臍去

水卽活○又法溺死已經半日取大甕覆地以死

人腹覆甕上以微火於甕下燃之須臾甕爇死人

口中水出盡卽甦但不可過燄○又法溺水人尙

有微氣或胸前尙煖卽令活人立脫貼身裏衣爲

之更換抱塋身土將死人微微倒側之令其腹內

水流出一面將粗紙燒烟薰其鼻片時卽用皂角

末吹鼻孔微有一嚏便可得生換下濕衣服鞋襪

不可遠放其外層濕衣。仍加溺人身上。招其魂。使認軀殼而歸也。

救冬月溺水

凍死同一條

冬月溺水。或凍死。但胸前微溫。及微知慟哭。皆可救。倘或微笑。當急打之。使哭。並急掩其目鼻。若笑不止。則寒入心腎。二經便難救矣。切不可驟近火。一近火。則大笑不止。若尙知慟哭者。或一時未及更換濕衣。卽令人架之飛走。不可停止。一面將濕黃酒飲一二杯。一面急以乾衣換之。凍死者止加。

衣仍拉令飛走約三四里若多更好然後以薑椒湯或燒酒飲之百無一失○又法凍死者或毡或藁薦裹之以龜綱定放平穩處令兩人對面輕輕滾轉如赶毡法四肢溫和卽沽仍炙臍中三五艾

救夏月熱死

三條

溫死道上急以刀器掘開一穴入水擣之却取爛漿以灌死者卽沽○又法凡熱倒者急扶在陰涼處切不可冷冷水與喫及冷水噴淋但以布巾等物蘸熱湯覆臍上煖卽漸醒也如道上倉卒無湯

卽取道上熱土壅臍上撥作窩子令眾人溺尿其中以代熱湯亦可取效。○凡覺中暑嚼蒜一大辨冷水送下如不得嚼搗爛調水灌之立醒。

已上數條係

先大夫魯常刊布活人甚多

救無故縊 惠邑副貢此諱初升傳自名醫

人無故而思自縊者名曰扣頸傷寒只以治傷寒法治之自愈世多惑於鬼悞矣

救自刎喉幾斷法 壽春梁文科刻本

須急救遲則額冷氣絕矣其法急以熱雞皮貼患

處安穩枕卧或卽用絲線缝合刀口搽上桃花散
多敷爲要又急以綿紙四五重蓋刀口所敷散上
以女人舊褰脚布周圍纏扎五六轉三日後解去
前藥再用桃花散搽刀口仍卽纏扎過數日再用
生肌散敷之外用生肌大膏藥貼之用絹帛裹候
其肉長收功

桃花散治一切金瘡出血神效

石灰半升同大黃一兩五錢切片炒石灰變紅
色爲度去大黃篩極細末

中風不語 安海高世陶傳其母染此症人傳以此果驗

不可即用薑湯灌先用正蒜油一鍾灌之即能哼

後以薑湯灌之自愈○又方射香二錢清油二兩和勻灌之免癱瘓

中風 出談錄稱極效

荆芥穗爲末以酒調下二三錢立愈

半身不遂二條惠邑孝廉李諱廊傳

用正硫黃一斤入豆腐中蒸十餘遍蒸過換豆腐以

硫黃白爲度搗末用飯粒爲丸每服二錢白滾湯送

下自愈○又趙氏方白金鳳花陰乾浸老酒煮熟去花飲酒服至半月全愈

絞腸沙方

三條

出應驗集

明礬

三四錢

滾水調勻溫服卽效○又方先將兩臂

用頭繩或錢刮下其惡血聚指頭上以針刺其十

指離甲一分半處出血卽安○又方以芎藭或錢

蘸熱水先於頸項刮之次刮兩手臂及手足四灣

處務刮起紅紫泡以針刺出血卽愈

忌卽服湯水已驗

陰症腹痛欲死

亦治陰症傷寒

二條出應驗集

枯礬一錢火硝一錢胡椒一錢黃丹一錢丁香

五分

共爲細末用老醋調成團在手心男左女右以綿

緝扎之出汗而愈○又方用老葱一握如茶鍾大

用快刀切一指厚貼臍上用熱熨斗熨之

霍亂吐瀉

用陰陽湯服即安

一杯熱水 一杯冷水合之名陰陽水

乾霍亂

不吐不瀉 脹痛欲死

三條

地漿飲五杯即安

忌米湯

又方食鹽

一兩生薑

五錢切片

同炒色變水

一碗煎服

不宜熱服

好後不可即飲食○

又方炒紅鹽

一兩

皂角

一錢

煎水服吐即效

地漿

掘土深三尺以新汲水沃人攪濁少頃取清用之名曰地漿

卧忽不醒

切忌火照但痛咬脚大拇指甲際而唾其面則醒
如仍不醒以葑菜汁灌入鼻中則醒

中風厥倒牙關緊閉

先用此藥開之

三條

皂角

二兩去皮弦去

生礬

一兩入水中煎化取皂角晒乾

爲末

北細辛

五錢去葉去土

共爲細末用少許吹鼻中

卽醒又用針刺十指甲一葑菜葉許出血爲妙○

又方皂角少許吹入鼻卽醒○又方白鹽梅或烏

梅擦牙齦涎出卽開

吸風舌大如卵自閉不收自死

冰片一分火硝三分胆礬一分蜈蚣二條殭蚕五分蜩砂三分

共爲細末吹之卽愈

舌卒然腫大硬咽喉閉塞卽時氣將絕

二條

用皂角不拘多少以新灰燻變紅色放地上候冷
研末將病人拘開牙齒以藥擦其舌卽活○又方
用漳黃末糝洗之立愈○

回祿烟薰幾死

用蘿蔔菜頭搗汁灌之卽甦○