

午 1

7

溫熱贅言



溫  
親  
精  
臣



關道書屋珍藏

靈鶴幽房  
吳氏藏板

溫熱贅言

江左寄瓢子述

天倪室道人校

溫熱病大意

蓋聞外感不外六淫而民病當分四氣治傷寒家徒守  
發表攻裏之成方不計辛熱苦寒之貽害遂使溫熱之  
旨蒙昧不明醫門缺典莫此甚焉余不敏博覽羣書廣  
搜載籍而恍然於溫熱病之不可不急講也內經云冬

不藏精春必病溫蓋謂冬時嚴寒陽氣內斂人能順天  
時而固密則腎氣內充命門爲三焦之別使亦得固腠  
理而護皮毛雖當春令升泄之時而我身之真氣則內  
外瀰淪不隨升令之泄而告匱縱有客邪安能內侵是  
內經所以明致病之原也然但云冬不藏精而不及他  
時者以冬爲水旺之時屬北方寒水之化於時爲冬於  
人爲腎井水溫而堅冰至陰外陽內有習坎之象故立  
言歸重於冬非謂冬宜藏而他時可不藏精也卽春必

東垣云冬時嚴寒陽  
氣外泄孰屬鼓舞腎  
水內竭孰屬滋養是  
以冬令不藏精至春  
必不免溫也非病溫  
之原由毒藏肌膚  
之云耳

病溫之語亦是就近指點總見裏虛者表不固一切時  
邪皆易感受學者可因此而悟及四時六氣之爲病矣  
昔王叔和云寒毒藏於肌膚至春變爲溫病至夏變爲  
暑熱致來後人翻駁何不云腎精不藏之人至春易病  
溫至夏易病暑熱便能深入理潭矣內經又云冬傷於  
寒春必病溫註家咸謂冬令閉藏寒邪伏於腎中病不  
卽發至春陽氣大泄內伏之寒邪隨升令而外達天來  
錢氏已大非其說矣謂冬傷於寒者乃冬傷寒水之藏

卽冬不藏精之互詞。何以寒邪悞解。夫寒邪凜烈。中人卽病。非比暑濕之邪。能伏處身中。故內經曰。風寒之中人也。使人毫毛畢直。皮膚閉而爲熱。況腎爲生命之根。所關至大。安有寒邪內入。相安無事。直待春時始發之理。錢氏此說。獨開生面。先得我心。蓋曉然於溫邪之爲病。由於腎精之不藏矣。非特此也。難經云。傷寒有五。有傷寒。有傷風。有風溫。有熱病。有濕溫。夫統此風寒濕熱之邪。而皆名之曰傷寒者。亦早鑑於寒藏受傷外邪。

得入故探其本而皆謂之傷寒也。獨是西北風高土燥風寒之爲病居多。東南地卑水濕濕熱之傷人獨甚。從來風寒傷形傷形者定從表入。濕熱傷氣傷氣者不盡從表入。故治傷寒之法不可用以治溫熱也。夫溫者暖也。熱也。非寒邪之可比也。風邪外束則曰風溫。濕邪內侵則曰濕溫。縱有微寒之兼襲。不同栗烈之嚴威。是以發表宜辛涼不宜辛熱。清裏宜泄熱不當逐熱。蓋風不兼寒卽爲風火。濕雖化熱終屬陰邪。自昔仲景著書不

詳溫熱遂使後人各呈家伎漫無成章而凡大江以南  
病溫多而病寒少投以發表不遠熱攻裏不遠寒諸法  
以致死亡接踵也悲夫

風溫症條例

風溫爲病春月與冬季居多或惡風或不惡風必身熱  
欬嗽煩渴此風溫症之提綱也周禹載曰溫邪伏於  
少陰而達於少陽此雖宗內經冬傷於寒春必病溫  
之旨其實誤解內經也無論春溫冬溫總屬暴感時

氣豈是少陰伏邪不過因少陰真氣先虧溫邪易於  
湊襲耳其病多在春冬而不在夏秋者以夏秋爲暑  
濕熱三氣蒸動之時多病濕溫濕令蒸淫風氣不勝  
濕氣也惟春月風邪用事冬初氣暖多風故風溫之  
病多見於此但風邪屬陽陽邪從陽必傷衛氣人身  
之中肺主衛又腎爲衛氣之本是以風溫外薄肺胃  
內應風溫內襲肺胃受病其溫邪之內外有異形而  
肺胃之專司無二致故惡風爲或有之症而熱渴欬

嗽爲必有之症也。三復仲景書言溫病者再一則曰  
太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病。此不過以不惡  
寒而渴之症辨傷寒與溫病之異而非專爲溫病敘  
症也。再則曰發汗已身灼熱者名曰風溫。夫灼熱因  
於發汗其悞用辛熱發汗可知。仲景復申之曰風溫  
爲病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語  
言難出。凡此皆悞汗劫液後變現之症。非溫病固有  
之症也。續云若被下者直視失溲若被火者發黃色

劇則如驚癇狀時瘳癡若火薰之一逆尙引日再逆  
促命期亦止詳用下用火之變症而未言風溫本來  
之現症也然從此細參則知風溫爲燥熱之邪燥令  
從金化燥熱歸陽明故肺胃爲溫邪必犯之地且可  
悟風溫爲燥熱之病燥則傷陰熱則傷津泄熱和陰  
又爲風溫病一定之治法也反此卽爲逆矣用是不  
辭僭越而於仲景之無文處求文無治處索治敘症  
施治列爲條例知我罪我其在斯乎

風溫症身熱畏風頭痛欬嗽口渴脈浮數舌苔白者  
邪在表也當用薄荷前胡杏仁桔梗桑葉川貝之屬  
涼解表邪

風屬陽邪不挾寒者爲之風溫陽邪必傷陽絡是  
以頭痛畏風邪鬱腠表肺胃內應故欬嗽口渴苔  
白邪留於表故脈浮數表未解者當先解表但不  
同於傷寒之用麻桂耳

風溫症身熱欬嗽自汗口渴煩悶脈數舌苔微黃者

熱在肺胃也當用川貝大力桑皮連翹廣皮竹葉之  
屬涼泄裏熱

此溫邪之內襲者肺熱則欬嗽汗泄胃熱則口渴  
煩悶苔白轉黃風從火化故以清泄肺胃爲主治  
風溫症身灼熱口大渴欬嗽煩悶譫語如夢語脈弦  
數乾嘔者此熱灼肺胃風火內旋當用羚羊川貝連  
翹麥冬川斛青蒿知母花粉之屬以泄熱和陰  
此溫邪襲入肺胃之絡灼燄陰津引動木火故有

煩渴嘔逆等症急宜泄去絡中之熱庶無風火相煽走竄胞絡之虞

風溫症身熱欬嗽口渴下痢苔黃譌語胸痞脈數此溫邪由肺胃下注大腸當用黃芩桔梗煨葛豆卷甘草廣皮之屬以升泄溫邪

大腸與胃相連屬與肺相表裏溫邪內逼下注大腸則下痢治之者宜清泄溫邪不必耑於治痢按仲景傷寒論中有下痢譌語者有燥屎也宜大承

氣湯一症此實熱內結逼液下趨必有舌燥苔黃  
刺及腹滿痛症兼見故可下以逐熱若溫邪下癰  
是風熱內迫雖有譫語一症仍是無形之熱蘊蓄  
於中而非實滿之邪盤結於內故用荷根之升是  
不任硝黃之下逐也

風溫症熱久不愈欬嗽脣腫口渴胸悶不知飢身發  
白疹如寒栗狀自汗脈數者此風邪挾太陰脾濕發  
爲風疹用大力荊芥防風連翹廣皮甘草之屬涼解

之

風溫本留肺胃若太陰舊何伏濕者風熱之邪與濕熱相合流連不解日數雖多仍留氣分由肌肉而外達皮毛發爲白疹蓋風邪與陽明營熱相併則發癍與太陰濕熱相合則發疹也又有病久中虛氣分大虧而發白疹者必脈微弱而氣倦怯多成死候不可不知

六風溫症身熱欬嗽口渴胸痞頭目脹大面發泡瘡者