

醫方選要卷之四目錄

脾胃門

附論

參朮調中湯

參苓白朮散

補中益氣湯

養胃湯

四君子湯

平胃散

調中益氣湯

人參益胃湯

升陽益胃湯

人參開胃湯

嘉禾散

加味進食散

人參啓脾湯

木香啓中湯

葛花醒酒湯

感應圓

二齒味養脾圓

紫沉消積圓

參參壯脾圓

養脾圓

千金大養脾圓

枳朮圓

香砂枳朮圓

半夏枳朮圓

麝香枳木圓

木香枳木圓

橘皮枳木圓

加味枳木圓

沉香溫胃圓

啓脾圓

木香和中圓

參朮健脾圓

養胃進食圓

香砂理中圓

和中益氣圓

諸氣門

附論

七氣湯

木香調氣散

分心氣飲

木香流氣飲

蟠蔥散

聚香飲子

流氣飲子

指迷七氣湯

紫沉通氣湯

三香正氣散

分心氣飲

四七湯

蘇子降氣湯

雞舌香散

三和散

分氣紫蘇飲

順氣木香散

勻氣散

蘇合香圓

烏沉湯

撞氣阿魏圓

復原通氣散

沉香化氣圓

導氣枳殼圓

木香檳榔圓

沉香降氣湯

木香分氣圓

集香圓

沉香降氣圓

積聚門

附論

散聚湯

枳殼散

大七氣湯

半夏湯

枳實散

勻氣湯

蓬莪茂散

奔豚湯

息實湯

木香化滯湯

廣茂潰堅湯

勝紅圓

香稜圓

剪紅圓

荊蓬煎圓

肥氣圓

伏梁圓

三稜煎圓

白豆蔻散

磨積三稜圓

千金不換內消圓

丁香脾積圓

水腫脹滿門

附論

葶藶木香散

白朮木香散

疎鑿飲子

分氣補心湯

當歸散

蘿蔔子飲圓

神助散

五皮散

木香分氣湯

中滿分消湯

廣慈續堅湯

半夏厚朴湯

參香散

大半夏湯

大異香散

中滿分消湯

平肝飲子

大橘皮湯

大沉香尊重圓

十棗圓

茯苓琥珀圓

海金沙散

三花神祐圓

木香分氣圓

沉香琥珀圓

三白散

醫方選要卷之四目錄

畢

醫方選要卷之四

脾胃門

良醫副臣周文承編集

夫脾胃者屬乎中州土也消化水穀榮養五臟六腑
四肢百骸此土能生萬物之義也經云飲食入胃遊
溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下
輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆
度以爲常也凡人之生皆以胃氣爲本又經曰穀入
於胃脉道乃行水入於經其血乃成又曰安穀則昌
絕穀則亡蓋脾胃豈可不保養乎保養之法在乎調
其飲食適其寒溫時其飢飽不以生冷傷之不使寒

暑侵之不爲七情六慾所動則五臟自然平和百病何由而生矣其或攝生不謹將理失宜或爲生冷寒暑七情六慾所傷則變病百出而脾胃虛矣脾胃既虛而五臟六腑四肢百骸又將何所榮養耶經云飲食勞倦則傷脾脾傷則內閉九竅外壅肌肉衛氣解散此謂自傷氣之劑也蓋飲食傷胃勞倦傷脾治療之法當審其脾胃之虛實別其所傷之緣由若傷於飲者飲乃無形之物或微汗散之於表或淡滲利之於下傷於食者或損穀以和之或強脾以磨之果因食物停滯甚盛而作悶亂者吐下以奪之傷於寒者

則溫之傷於熱者則清之寒熱共傷者各從其性以
和之傷於魚肉果菜之類求其氣之相尅而相制者
用之如硃砂阿魏消肉積胡黃連麝香消果積至於
酒積食積痰積非神麴麥蘗礞石巴豆之藥又何以
消之是皆有形之物填塞胃腑不能消化必待驅逐
然後得安不可一例過用香燥之藥恐鬱滯久而火
邪盛則反劇矣若夫飲食勞倦傷其脾胃使元氣下
陷而爲中氣不足之證又當從東垣治內傷法必用
升補氣血之劑以調之和之溫之養之使生生之氣
增益則脾胃壯而完復矣

參朮調中湯

治脾胃虛弱不進飲食發熱咳嗽氣喘

短氣

黃芪去蘆

桑白皮

人參各一錢二分

甘草炙六分

白茯苓一錢

五味子二十箇

白朮一錢半

地骨皮

麥門冬去心

陳皮

青皮各八分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗三枚煎至八

分食遠服

參朮白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉

及大病後調助脾胃此藥取好

白朮

人參

甘草炙

乾山藥

白茯苓

白蘊豆

炒各一錢半

蓮肉

去皮心

薏苡仁

砂仁

桔梗

炒各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服或為細末每服二錢食遠薑棗湯調下

補中益氣湯 治中氣不足飲食勞倦清氣下陷以致

脾胃虛弱發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱

此藥能升元氣退虛熱補脾胃生氣血

黃芪

去蘆二錢

人參

甘草

炙各錢半

陳皮

白朮

當歸

各一錢一分

升麻

柴胡

各八分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉

或有外感寒熱如瘧骨節煩疼宜服之

藿香

洗去上

厚朴

薑製

半夏

湯泡七次

茯苓

各一錢半

草果

去皮

陳皮

去白

人參

附子

炮

甘草

炙各一錢

白朮

七分半

右咬咀作一服用水二鍾生薑五片棗二枚煎至八分食遠服

四君子湯

治脾胃不和不思飲食

人參

去蘆

茯苓

去皮

白朮

甘草

炙各一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食遠服加陳皮半夏名六君子湯腹滿者減甘草一半

平胃散 治脾胃不和嘔吐惡心不思飲食

蒼朮

米泔水浸三錢

厚朴

去皮製炒

薑

陳皮

去白

甘草

炙各二錢

右作一服水二鍾生薑三斤紅棗二枚煎至一鍾食遠服一方加草果名草果平胃散或爲細末每服二錢用鹽湯調服亦可

調中益氣湯 治脾胃虛弱四肢滿閉肢節煩疼難以

屈伸身體沉重心煩口中無味不思飲食大小便不

調或殮泄米穀不化胃滿短氣咽膈不通嗜臥無力
並宜服之

升麻

三分

黃芪

半錢

甘草

五分

蒼朮

一錢

木香

三分

人參

一錢

柴胡

橘皮

各八分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分食遠服

人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠

惰躁熱氣短口不知味腸鳴大便微澀黃色身體昏

悶口乾不喜食冷

蒼朮

半錢

當歸

升麻

陳皮

各五分

人參

白朮

各一錢

柴胡

益智

黃芩各四分

半夏

黃芪

甘草各一分

紅花三分

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前

服

升陽益胃湯 治脾胃弱怠惰嗜臥四肢不收體重節

疼口舌乾燥大小便不調無肺病洒淅惡寒慘慘不

樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃時

值秋燥令行尤宜此服之

羌活

獨活

防風已上並去蘆

白芍藥各一分

柴胡去苗

白朮

澤瀉

茯苓各四分

人參去蘆

甘草炙

半夏薑製各一錢二分

黃芪一錢五分

黃連三分

陳皮六分

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八

分食遠服

人參開胃湯 治脾胃不和不思飲食此藥能助胃進

食

人參

橘紅

丁香

木香

藿香

神麴炒

麥蘖炒

白朮

茯苓

砂仁

蓮肉

厚朴薑製

半夏薑製

甘草炙已上各七分

作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食遠服

嘉禾散 治脾胃不和胃膈痞悶氣逆生痰不進飲食

如五噎五膈並皆治之

方見翻胃膈噎門

加味進食散 治脾胃虛冷及久病人胃弱全不食者

半夏薑製

草果

良薑炒

麥蘖炒

附子炮去皮

肉豆蔻麩裹

丁香不見火

厚朴薑製

陳皮各八分

人參一錢

青皮炒七分

甘草炙五分

右作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至八分食

遠服

人參啓脾湯

治脾胃虛弱不進飲食此藥最効

人參去蘆 三錢

白朮二錢

茯苓去皮

半夏薑製

藿香洗淨

砂仁已上各一錢

橘紅一錢五分

神麴炒

麥蘖炒

黃連微炒

甘草炙已上各七分

木香五分

口渴加乾葛一錢

頭痛加川芎一錢

腹脹加蒼朮一錢

惡心嘔吐加白豆蔻一錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片棗二枚煎至一

鍾食遠服

木香啓中湯

補脾胃進飲食寬膈順氣

木香

人參

白朮

茯苓