

六經病解

吳江徐大椿泗溪著

太陽病解十一條

少陽病解一條

陽明病解十六條
太陰病解一條

少陰病解十七條

厥陰病解十九條
溫熱暑疫一條

風寒異同一條

濕燥番痧一條

傷寒總論十五條

太陽病解第一條

仲景六經各有提綱一條。猶大將建旗鼓，使人知所向。故必擇本經至當之脉證標之。學者須從其提綱，以審病之所在。然提綱只是正面。讀者又要看出底板。細玩其四旁。參透其隱曲。則良法美意始得了然。如太陽提綱。脉浮頭項強痛惡風八字。是太陽受病之正面。讀者要知三陽之脉俱浮。三陽俱有頭痛證。六經受寒。俱各惡寒。惟頭項惡痛。是太陽所獨也。蓋太陽為諸陽主氣。頭為諸陽之會。項為太陽之會。故也。如脉浮惡寒發熱而頭不痛。項不強。便知非太陽病。如但頭痛而不項強。亦非太陽定局。如項強痛反不惡寒。脉不沉。不可謂非太陽病。或溫邪內發。或吐後內煩。或濕流關節。或病關少陰。當救裡者也。因當浮不浮。當惡不惡。故謂之反。所謂看出底板。以此前輩以一日太陽。七日復傳之說拘之。故至今不識。仲景所稱太陽病。太陽又有身痛。身重。腰痛。骨節疼痛。鼻鳴。乾嘔。逆煩躁。胸滿。背強。欬渴。汗出。惡風。無汗。而喘等證。仲景以其或然或否。不可拘定。故散見諸節。而不入提綱。又太陽為巨陽。陽病必發熱。提綱亦不言及。蓋以始受病或未發熱故也。其精神如此。故診者於頭痛項強。必須理會此等。兼識更細審其



六經病解

吳江徐大椿泗溪著

太陽病解十一條

少陽病解一條

太陰病解十一條

少陰病解十七條

厥陰病解十九條

溫熱暑疫一條

風寒異同一條

濕燥番痧一條

六經地四一條

傷寒總論十五條

太陽病解第一條

仲景六經各有提綱一條。猶大將建旗鼓，使人知所向。故必擇本經至當之脉證標之。學者須從其提綱，以審病之所在。然提綱只是正面。讀者又要看出底板。細玩其四旁。參透其隱曲。則良法美意始得了然。如太陽提綱。脉浮頭項強痛惡風八字。是太陽受病之正面。讀者要知三陽之脉俱浮。三陽俱有頭痛證。六經受寒俱各惡寒。惟頭項惡痛。是太陽所獨也。蓋太陽為諸陽主氣。頭為諸陽之會。項為太陽之會。故也。如脉浮惡寒發熱而頭不痛。項不強。便知非太陽病。如但頭痛而不項強。亦非太陽定局。如項強痛反不惡寒。脉不沉。不可謂非太陽病。或溫邪內發。或吐後內煩。或濕流關節。或病關少陰。當就裡者也。因當浮不浮。當惡不惡。故謂之反。所謂看出底板。以此前輩以一日太陽。七日復傳之說拘之。故至今不識。仲景所稱太陽病。太陽又有身痛。身重。腰痛。骨節疼痛。鼻鳴。乾嘔。逆煩躁。胸滿。背強。欬渴。汗出。惡風。無汗。而喘等證。仲景以其或然或否。不可拘定。故散見諸節。而不入提綱。又太陽為巨陽。陽病必發熱。提綱亦不言及。蓋以始受病或未發熱故也。其精神如此。故診者於頭痛項強。必須理會此等。兼識更細審其



惡風惡寒之病情。有汗無汗之病機已發熱未發熱之病勢。以探其表病之虛實。是從旁細看法也。即於此定有汗為桂枝證。無汗為麻黃證。無汗煩躁。大青龍證。乾嘔發熱而煥。小青龍證。項背強几几。葛根湯用之恰當。効如桴鼓。前輩以桂枝主風傷衛。麻黃主寒傷營。大青龍主中風見寒。傷寒見風分三綱之說。拘之所以埋沒仲景心法。又又敗壞仲景正法。

太陽病解第二條

脉浮只講得脈體之正面。診者當於浮中。審其強弱遲數緊緩滑濇弦芤。故太陽一證。有但浮浮弱浮緩浮遲浮數等脉。散見於諸條。或陽浮。或陰弱。或陰陽俱緊。或陰陽俱浮。或尺中遲。或尺中脉微。或寸緩關浮尺弱。必體認以消息其裡之虛實。是從中索隱法也。若謂脈緊是傷寒。脉緩是中風。脉緊有汗。是中風見寒。脉緩無汗。是傷寒見風。夫既有傷寒中風之別。更有傷寒中風之混。使人無下手處矣。凡見脉浮遲浮弱者。用桂枝。浮緊浮數者。用麻黃。不必於風寒而鑿分。但從脈之虛實而施治。是仲景治法。亦是定法。

太陽病解第三條

仲景書只宗陰陽大法。不拘陰陽之經絡也。夫陰陽數之可千。推之可萬。以心為陽中之太陽。故更稱巨陽。以尊之。又中身之上。名曰廣明。太陽之前。名曰陽明。廣明亦君主之尊稱。廣明居陽明之上。故六經分位。首太陽。次陽明。又腰以上為陽。膀胱位列下焦。之極底。其經名為足太陽。以手足陰陽論。寔陰中之少陽。是以六府為陽論。與小腸之太陽同。為受盛之器。不得混膈膜之上。為父之太陽也。

太陽病解第四條

今傷寒書。皆以膀胱為太陽。故有傳足不傳手之誤。不知太陽為巨陽。為君為父為經。為陽中之最尊。惟心為陽中之陽。故六經分位。首太陽。次陽明。膀胱位列下焦。州都之官。必待氣化而後出。不過與小腸同。

為受盛之器。此為經絡之通行。非陰陽之大會。仲景以心為太陽。故得統一身之氣血。內有五藏六府之經隨。若膀胱者何得外司營衛而為諸陽主氣哉。其與腎為表裡。是足經相絡之一義也。且表裡亦何常之有。如太陽與少陽併病。刺肺俞肝俞。豈非以肝居胆外。為少陽之表。肺居心外。為太陽之表耶。

太陽病解第五條

少陰病一身手足盡熱。以熱在膀胱必便血。夫熱在膀胱乃仍稱少陰病。是膀胱屬腰以下之陰。得為少陰之府。不得為六經之太陽。故不稱太陽病。又太陽不解。熱結膀胱。其人如狂。以太陽隨經於熱在裡。是熱在下焦。下血乃愈。蓋太陽為最高。故太陽病以頭項強痛提綱。此又熱結下焦。乃太陽陽邪下陷之變症也。要知膀胱為太陽之根底。非主表之太陽為太陽之經隧。非太陽之都會。為太陽主血之裡。非諸陽主氣之太陽也。

太陽病解第六條

傷寒最多心病。以心當太陽之位也。心為君主。寒為賊邪。君火不足。寒氣得以傷之。所以名為大病。今之傷寒家反以太陽為寒水之經。因有以寒召寒之說。不審寒邪犯君主之治。水來剋火之義矣。夫人傷於寒熱。雖盛不死者。以熱之所在為邪之所留。熱之所在。乃心火之所主也。服桂枝而反煩。解半日許而復煩。大青龍之煩躁。小青龍之水氣。十乘湯之心下痞硬。白虎丘芩之煩渴心煩皆心病也。若妄治後。又手冒心恍惚。心下逆滿。往往鬱心。是心病為太陽主治也。然心為一身之主。六經皆能病及。故陽明有憤憤傷惕懊惓等證。少陽有煩惱支結等證。太陰之暴煩。少陰之心中溫溫欲吐厥陰之氣上冲心。心中疼。熱。皆心病也。何前輩有傷足不傷手之說。夫心主營。肺主衛。風寒來傷營衛。即是手經矣。且大腸接胃。俱稱陽明。小腸通膀胱。俱稱太陽。傷則俱傷。何分手足。如大便硬。是大腸病。豈專指胃言。小便不利。亦是

小腸病。豈獨指膀胱。且汗為心液。如汗多亡陽。豈止坎中之陽。不干腎中之陽。不明仲景六經。故有傳經之妄。

太陽病解第七條

人知太陽之經行於背。而不知背為太陽之主。知太陽主表。而不知太陽之所根。知膀胱為太陽之裡。而不知心肺為太陽之裡。因不明內經之陰陽。所以不知太陽之地。面內經以背為陽。腹為陰。五藏以心肺為陽。而屬於背。故仲景以心中胸中屬三陽。脾胃為陰。而屬於腹。故仲景以腹中之證屬三陰。營衛行於表。而發源於心肺。故太陽病。則營衛病。營衛病。則心肺病矣。心病。則惡寒。肺病。則發熱。心病。則煩肺病。則喘。芍藥止煩。麻黃發散熱。杏仁除喘。桂枝療寒。所以和營正。所以寧心。是以調衛正。所以保肺。麻桂二方。便是調和內外表裡兩解之劑矣。如大青龍用石膏以治煩躁。小青龍用丘味乾姜除欬。嘔。皆以表劑中。即兼治裡。後人妄謂仲景方治表不治裡。弗思耳。

太陽病解第八條

太陽主表。為心君之藩籬。猶京師之有邊關也。風寒初感。先入太陽之界。惟以汗為急務。得汗而解。猶邊關之有備也。必發汗而解。是君主之令行也。若發汗而汗不出。與發汗而仍不解。是君主之令不行也。夫汗為心液。本水之氣。在傷寒為天時。寒水之氣。在人身為皮膚。寒濕之氣。在發汗為君主陽和之氣。陽和內發。寒邪外散矣。故治太陽傷寒。以發汗為第一義。若君火不足。則胃液之輸於心下者。不能入心為汗。又不能下輸膀胱。所以心下有水氣也。故利水是太陽之第二義。若君火太盛。有煩躁消渴等證。恐不戢而自焚。故清火是太陽傷寒之反治法。若君火衰微。不足以自守。風寒內侵於藏府。必扶陽以御之。故溫補。又是太陽傷寒之從治法。其他救弊諸法。種種不同。大法不外乎是。

太陽病解第九條

發汗利水。是治太陽兩大法門。發汗分形層之次第。利水定三焦之高下。皆所以化太陽之氣也。發汗有五法。麻黃湯。汗在皮膚。是發散外感之寒邪。桂枝湯。汗在經絡。是疎通血脉之精氣。葛根湯。汗在肌肉。是升騰津液之清氣。大青龍。汗在胸中。是解散內擾之陽氣。小青龍。汗在心下。是驅逐內蓄之水氣。其治有三法。乾嘔而欬。水入即吐。是水氣在上焦。在上者。汗而發之。小青龍五苓散是也。心下痞硬滿而渴。是水氣在中焦。中滿者。瀉之於內。十全湯。大陷胸是也。熱入膀胱。小便不利。是水氣在下焦。在下者。引而竭之。桂枝湯去桂加茯苓白朮湯是也。

太陽病解第十條

太陽之根。即是少陰。緊則為寒。本少陰脉太陽病。而脉緊者必無汗。雖太陽衛外而為固。亦賴少陰藏精而為守。故不得有汗也。人但知其表寢。而不知其裡亦寢。故可用麻黃湯而無患。若脉陰陽俱緊。而反汗出者。是陽不固而陰不守。此亡陽而陰獨存矣。曰此屬少陰者。是指太陽轉屬少陰。而非少陰本病。

太陽病解第十一條

太陽陽虛。不能主外。內傷真陰之氣。便露出少陰底板。少陰陰虛。不能主內。外傷太陽之氣。便假借太陽之面目。所以太陽病而脉反沉。用四逆以急救其裡。少陰病而反發熱。用麻辛以微解其表。此表裡輕重兩解法也。傷寒一日。太陽受之。即見煩躁。是陽氣外發之機。六七日。乃陰陽自和之際。反見煩躁。是陽邪內陷之兆。所謂陽去入陰者。指陽邪下陷言。非專指陰經也。或入太陽之府。而熱結膀胱。或入陽明之府。而胃中乾燥。或入少陽之府。而脇下硬滿。或入太陰而暴煩下利。或入少陰而口舌乾煩。或入厥陰而心中疼熱。皆入陰之謂。後人以傳經惑之。因不知其入陰轉屬之義矣。

陽明病解第一條

按陽明提綱以裡證為主。雖有表證仲景意不在表為有諸中而形諸外也。或兼經病。仲景意不在經而根於胃也。太陰陽明同處中州。而太陰為開。陽明為閭。故陽明必以閭病為主。不大便固閭也。小便亦閭也。不能食。食難用飽。初欲食。反不能食。皆閭也。自汗盜汗。表開而裡閭也。反無汗。內外皆閭也。種種閭病。或然或否。故提綱獨以胃寢為主。胃寢是不是。竟指大便躁硬。只對下利言。下利是胃家不寢矣。故汗出解後。胃中不和而下利者。不稱陽明病。如胃中虛而不下利者。便屬陽明。即初後汗溏水穀不易。雖死而不下利者。總為陽明病也。蓋陽明太陰同為倉廩之官。而所司各別。胃司納。故陽明主寢。脾司輸。故太陰主利。是二經所由分也。

陽明病解第二條

按陽明為傳化之府。當更寢。更虛食入。則胃寢而陽虛。食下則腸寢而胃虛。若但寢不虛。斯為陽明之病根矣。胃寢非即陽明病。而陽明之為病。悉從胃家寢得來。故以胃寢為總綱。必然致病之由。有寢於未病之先者。有寢於得病之後者。有風寒外束。熱不得越而寢者。有妄吐汗下。重亡津液而寢者。有從本經熱盛而寢者。有從他經轉屬而成寢者。此只舉病根在寢。勿得即以為胃寢可下之證。

陽明病解第三條

身熱汗自出。不惡寒。反惡熱。是陽明表證之提綱。故有胃中虛冷。亦得稱陽明病者。因其表證如此也。然於胃冷假熱之外。此為內熱達外之表。非中風傷寒之表。此時表寒已散。故不惡寒。裡寢閉結。故反惡熱。只因有胃家寢之病根。即見此身熱自汗之外證。不惡寒反惡熱之病情。然此但言病機發見。非即可下之證。必叢語潮熱煩躁腹痛諸證兼見。纔可下耳。

陽明病解第四條

太陽總綱以正。太陽明總綱以底板。具陽明之表正面未嘗不與太陽同而病情異。如陽明病脉遲汗出多。微惡寒者。是陽明之桂枝證。陽明病脉浮無汗而喘者。是陽明之麻黃證。本論云。病得之一日。不發熱而惡寒者。即此是也。後人見太陽已得此脉證。便道陽明不應有此脉證。故有病在太陽將入陽明之說。不知仲景書多有本條不見。而他條見者。若始雖惡寒。與反無汗等句是也。以陽明表證。本自汗出。不要寒。故加雖反字耳。有本經未宣。而他條發見者。若太陽之頭項強痛。少陽之脉弦細者是也。若頭痛而項不強。脈大而不弦細。便是陽明之表矣。太陽行身之後。陽明行身之前。所受風寒。俱在營衛之裏。太陽營衛有虛寒。陽明營衛亦有虛寒。虛則桂枝湯。寢則麻黃湯。是仲景治表邪之定局也。仲景之方。因證而設。非因經而設。是仲景治法。後人以方妄分經絡。非惟陽明不敢用。即太陽亦棄之矣。

陽明病解第五條

陽明之表有二。有外邪初傷之表。有內熱達外之表。陽明外邪之表。具證微惡寒。汗出多或無汗而喘。只在一二日間。此因風寒外來。故仲景亦用麻桂二湯汗之。內熱之表。在一二日後。其證身熱汗自出。不惡寒。反惡熱。此因內熱外發。故仲景製梔豉湯。因勢吐之。後人認不出陽明表證。不敢用麻桂二三日後。又不用梔豉。必待熱深熱極。始以白虎承氣投之。不知仲景治陽明之初法。廢仲景之吐法。

陽明病解第六條

六經傷寒。惟陽明輕。以陽明為水穀之海。穀氣足以勝邪。又十二經脉之長。血氣足以禦邪。兩陽合明。陽氣足以勝寒。其受邪一日。惡寒與太陽同。二日便不惡寒。反惡熱。故內經曰。二日陽明受之。以陽明之證。在二日見。非為陽明之病在太陽爻也。仲景曰。陽明三日脉大。要知陽明傷寒。只在一日二日。即寒去熱

生三日脉大便是陽明病熱非復前日之寒矣。

陽明病解第七條

陽明之惡寒二日自止。固與他經不同。其惡寒微。又不若他經之甚。陽明在肌肉中蒸蒸發熱。但熱無汗。與太陽翕翕發熱。寒束於皮毛之上者不同。陽明自汗亦異於太陽中風。自汗而出之不利。有熱持之意。故其狀曰。蒸蒸太陽自汗。多有波瀾搖動之狀。故名之曰蒸。蒸太陽脉浮緊。熱必不解。陽明脉浮而緊。必潮熱。太陽脉但浮者必無汗。陽明脉但浮。必盜汗。出二經表證表脉如此。

陽明病解第八條

今傷寒書以頭痛分三陽。陽明之頭痛在額理固然也。然陽明主裡。頭痛非其本證。內經曰。傷寒一日。陽受之。以其脉連風府。故頭項痛。七日太陽病衰。頭痛稍愈。二日陽明受之。其脉挾鼻絡於目。故身熱。目痛。鼻乾不得卧。是內經以頭痛屬太陽。不屬陽明矣。仲景有陽明頭痛二條。一曰陽明病反無汗而小便利。一三日嘔而欬。手足厥者必然頭痛。若不嘔不欬。手足不厥者頭不痛。此頭痛在二三日。而不在得病之一日。且因於嘔欬而不因於初感。一曰傷寒不大便六七日頭痛身熱者。與承氣湯。此頭痛反在太陽病衰時。而因於不大便。即內經所謂膜脹而頭痛也。其中風傷寒諸條。俱不及頭痛。則陽明頭痛。又與太陽迥別矣。

陽明病解第九條

本論云。陽明病脉浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。此處當直接。施子。豉湯主之。句若發汗三段。因不用此方。而妄治所疏。仍當施子。豉湯主之。仲景但於結句一見。是省文法也。後人竟認。施子。豉湯為汗下後救逆之劑。否則未汗下前。仲景又何法以治之乎。要知口燥咽乾。腹滿而喘。是

陽明裡證發熱汗出不惡寒反惡熱是陽明裏證因陽明之熱自內達表則裡證為重故此條以裡證主表證之前任樞子以清裡熱而表熱自解用香豉以泄腹滿而身重自除後人不尋陽明之表而徒以熱論之目痛鼻乾不得卧當之不得仲景陽明治表之法妄用痘科中葛根升麻湯以主之又不知日痛鼻乾為陽盛陰虛法當滋陰清火而反發陽明之汗上而鼻衄下而便難是引賊破家矣夫熱病論只發明陽明經病之一端仲景立陽明一經寔是該內外證治之全法要知是風寒之表用麻桂而活如內熱之表即荆芥薄荷皆足以亡津液而成胃寔在用者何如耳

陽明病解第十條

治陽明內熱之表有三法熱在上焦用梔豉湯吐之上焦得通津液得下胃家不寔矣熱在中焦用白虎湯清之胃火得清胃家不寔矣熱在下焦用猪苓湯利之火從下泄胃家不寔矣要知陽明之治表熱即是預治其裡三方皆潤劑所以存津液而不令寔也若因循葛根升麻之謬不察仲景治陽明之表矣

陽明病解第十一條

太陽以心胸為裡故用辛甘發散助心胸之陽而開元府之表不得用苦寒以傷上焦之陽也所以宜汗不宜吐陽明以心胸為表當用酸苦湧泄引胃脘之陽而開胸中之表不當用溫散以傷中宮之津液也故法當吐不當汗陽明當吐而反行汗下溫針等法以致心中憤憤懊惓懊惓煩躁讒語舌胎等證然乃不離陽明之表太陽當汗反吐便見自汗出不惡寒飢不能食朝食暮吐不欲近衣欲食冷食等證此為太陽轉屬陽明之表皆是梔豉湯證蓋陽明以胃寔為裡不但發熱惡寒汗出身重目痛鼻乾謂之表一切虛煩虛熱如舌胎喘滿口苦咽乾不得卧消渴小便不利凡在胃之外者悉屬陽明之表但除胃口之熱便解胃家之寔此梔豉湯為陽明解表之聖劑矣

陽明病解第十二條

按傷寒脉浮自汗出微惡寒是陽明表證心煩小便數脚掌急是陽明裡之表證斯時用梔子豉湯吐之後則胃陽得升惡寒自罷心煩得止汗自不出矣上焦得通津液得下小便自利其脚即伸反用桂枝攻表所以亡陽其咽中乾煩躁吐逆是梔子生姜豉湯證只因亡陽而厥急當回陽其改用甘草乾姜湯復之後更作芍藥甘草以和陰少與調胃承氣以和裡皆因先時失用梔豉故如此挽回耳。

陽明病解第十三條

本論云病如桂枝證則便不鑿定為太陽中風證凡惡風惡寒發熱而自汗出者無論太陽陽明中風傷寒皆是桂枝證矣太陽病頭痛項強而此云頭不痛項不強便非太陽證內經曰邪中於膚則入陽明此云胸中痞硬氣上冲咽喉不得息是陽明受病無疑也雖外證象桂枝而病在胸中不在營衛便不是桂枝證故立瓜蒂散所謂在上者因而越之也本陽明府仲景不冠以陽明者以不關胃寔未見不惡寒之病情耳

陽明病解第十四條

上越中清下奪是治陽明三大法發汗利小便是陽明兩大禁然風寒初入陽明之表即用麻黃桂枝發汗者以急於除熱而存津液與急下之法同若脉浮煩渴小便不利用猪苓湯利小便者亦以分理而存津液又曰汗多者不可與猪苓湯要知發汗利小便是治陽明權巧法門

陽明病解第十五條

陽明之病在寔熱宜無溫補法矣而食穀欲嘔者是胃口虛寒故不主內熱也然胃氣雖虛胃中猶寔仍不失為陽明病與吳茱萸湯散胃口之寒上焦得通津液得下胃氣因和則溫補又是陽明之從治法若

胃口虛熱者當用白虎加參是陽明涼補法也二義又是治陽明權巧法門

陽明病解第六條

本論云傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食不嘔此為三陰不受邪矣蓋陽明為三陰之表故三陰皆看陽明之轉旋三陰之不受邪藉胃以藩蔽其外也。胃和則能食不嘔故邪解而不至三陰胃陽虛然後邪始入也。故太陰受邪腹滿而吐食不下少陰受邪欲吐不吐厥陰受邪飢不能食食即吐蛇若胃陽亡則水漿不入而死要知三陰受邪不在太陽少陽而全關係陽明陽明以太陰為裡是指北藏言太陰亦以陽明為裡是指轉屬言也。腎者胃之關木者土之賊故二陰亦以陽明為裡三陰為三陽之裡而三陰反得轉屬陽明為裡故三陰皆得從陽明而下則陽明又是三陰寔邪之路也既為三陰之表以禦邪又為三陰之裡以逐邪陽明之關係三陰重矣。

少陽病解第一條

少陽處半表半裡司三焦相火之遊行仲景特揭口苦咽乾目眩為提綱是取病機立法也夫口咽目二者藏府精氣之總竅與天地之氣相通者也不可為表不可為裡乃表入裡裡出表之路所謂半表半裡也三者能開能闔開之可見闔之不見為樞之象苦乾眩者相火上走空竅而為病風寒雜病咸有之所以為少陽一經之總綱也如目赤兩耳無聞胸滿而煩只舉得中風一證之半表裡內經之胸脇痛而耳聾口舉得熱病一證之半表裡

少陽病解第二條

少陽之表有二脉弦細頭痛發熱或嘔而發熱者少陽傷寒也耳聰目赤胸滿而煩少陽中風也此少陽風寒之表而非少陽之表陽明風寒之表亦有麻桂證少陽風寒之表不得用麻桂之汗亦不得用瓜蒂

施政之凶發汗則譏語吐下則驚悸。是少陽之和解不時在半表而始宜也。少陽始感風寒。惡寒發熱。與太陽同不得為半表。所以為半表者。寒熱不齊各相迴避。一往一來。勢若兩分。為半表耳。

少陽病解第三條

往來寒熱有三義。少陽自受寒邪。陽氣尚少。不能發熱。至五六日。鬱熱內發。始得與寒氣相爭。而往來寒熱一也。或太陽傷寒過五六日。陽氣已衰。餘邪未盡。轉屬少陽。而往來寒熱二也。若風為陽邪。少陽為風藏。一中於風。便往來寒熱。不必五六日而始見。三也。

少陽病解第四條

太陽之身寒。在未發熱時。如已發熱。雖惡寒。而身不再寒。陽明之身寒。惡寒。只在初得之一日。至二日。則惡寒白罷。便發熱而反惡熱。惟少陽之寒熱。有往而復來之義。寒來便身寒。惡寒而不惡熱。熱來便身熱。惡熱而不惡寒。與太陽之如瘡發熱。惡寒而不惡熱。陽明之如瘡潮熱。惡熱而不惡寒者。不相侔也。蓋以少陽為嫩陽。如日之初出。寒留於半表者。不遽散。熱出於半裡者。未即舒。故見此象耳。然寒為欲去之寒。熱為初熾之熱。寒熱非寔。故小柴胡湯。只治熱而不治寒。預補其虛而不攻其寔也。小柴胡為半表設。而其證皆屬於裡。蓋表證既去其半。則病機偏於向裡矣。惟寒熱往來一譏。尚為表邪未去。故獨以柴胡一味主之。其他悉用裡藥。凡裡證屬陽者多寔熱。屬陰者多虛寒。而少陽為半裡。偏於陽。偏於熱。雖有虛有寔。不盡屬於虛也。仲景深以裡虛為慮。故於半表未解時。便用人參以固裡。

少陽病解第五條

寒熱往來病證見於外。苦喜不欲。病情得於內。看苦喜欲三字。非真嘔。真滿不能飲食也。看往來二字。即見有不寒熱時。寒熱往來。胸脇苦滿。是無形之表。心煩喜嘔。默默不欲飲食。是無形之裡。其或胸中煩而

不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或咳者此七證皆偏於裡。惟微熱為在裡表皆屬於無形。惟脇痛痞硬為有形。皆風寒通證。惟脇下痞硬屬少陽。總是氣分為病。非有寘熱可據。故從半表半裡之治法。

少陽病解第六條

少陽為遊部。其氣遊行三焦。循兩脇輸腠理。是先天真元之正氣。正氣虛不足以固腠理。邪因其開得入。其部少陽主膽。為中正之官。不容邪氣內犯。必與之相搏。而不勝。所以邪結脇下也。邪正相爭。即往來寒熱。更寘更虛。所以休作有時。邪寘是正虛。所以默默不欲飲食。仲景於表證不用人參。此因邪正分爭。金不勝邪。故用之。狀元氣強主以逐寇也。若外有微熱而不往來寒熱。是風寒之表未解。不可謂之半表。當小發汗。故去參加桂心。煩與歎雖逆氣有餘。而正氣未虛。故去人參。如太陽汗後身癟而脉沈遲。與下後協熱利而心下硬。是太陽之半表裡證也。表雖不解。裡氣已虛。故參桂並用。乃知仲景用參。實是預保元氣。

少陽病解第七條

更有脉證不合柴胡者。仍是柴胡證。本論云。傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不飲食。大便硬。脉細者。此為陽微結。半在裡。半在表也。脉雖沈緊。不得少陰為病者。陰不得有汗。今頭出汗。故可與小柴胡湯。此條是少陽陽明併病。故脉證俱是少陰。五六日又少陰發病之期。若謂陰不得有汗。則少陰亡陽。亦有反汗出者。然亡陽與陰結。其別在大便。亡陽則咽痛吐利。陰結則不能食而大便反硬也。亡陽與陽結。其別在汗。亡陽者。衛氣不固。汗出必遍身。陽結者。邪熱閉結。齎汗止在頭也。少陽陽微。故不能食而大便硬。此為陽微結。若陽明陽盛。能食而大便硬。是為純陽結。則陽結陽微結之別。又在食也。故少陽之陽微結證。欲與小柴胡湯。必究其病在半表。然微惡寒亦可屬少陰。但頭汗出。始可屬少陽。反覆講明頭

汗之義可與小柴胡而無疑也。所以然者少陽為樞。少陰亦為樞。故見證多相似。必於陰陽表裡辨之。真而審之確。始可一劑而瘳。此少陰少陽之疑似證。又柴胡湯證之變局也。

少陽病解第八條

脇居一身之半。故脇為少陽之樞。岐伯曰。中於脇。則下少陽。此指少陽自病。然太陽之邪。或持屬少陽少陽之邪。欲歸併陽明。皆從脅轉。如傷寒四五日。身熱惡風。頭項強。脅下滿者。是太陽少陽併病。將轉屬少陽之機也。以小柴胡加桂枝。所以斷太陽之來路。如陽明病發潮熱。大便溏。小便自可。胸脅滿而不去者。是少陽陽明併病。此轉屬陽明之始也。以小柴胡與之。所以開陽明之出路。若據次第傳經之說。必陽明而始傳少陽。則當大便硬。而不當澹。當曰胸脅始滿。不當曰滿而不去矣。又陽明病脅下硬滿。大便硬。而嘔舌上白胎者。此雖已屬陽明。而少陽之證未罷也。蓋少陽之氣遊行三焦。因脇下之阻隔。今上焦之治節不行。水精不能四布。故舌上有白胎而嘔。與小柴胡轉少陽之樞。則上焦氣化始通。津液得下。胃不寢而大便自輸矣。身濶然而自汗解者。是上焦津液所化。故能開發腠理。薰膚充身澤毛。若霧露之漸。與胃中邪熱薰蒸而自汗不解者不同。

少陽病解第九條

東垣有少陽不可汗吐下利小便不利。然柴胡證中口不渴。身有微熱者。仍加桂枝以取汗。下後胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱者。用柴胡桂枝乾姜湯。汗之下後。胸滿煩驚。小便不利。讏語身重者。柴胡龍骨牡蠣湯。中用大黃淡芩。以利二便。柴胡證具。而反下之。心下滿而硬痛者。大陷胸下之。醫以丸藥下之。而不得利。已而微利。胸滿而嘔。日晡潮熱者。小柴胡加芒硝下之。是仲景於少陽經中。以瀉汗下利小便法也。若吐法。本為陽明初病。胸中寢。不得息。不得食。不得吐而設。少陰病飲食入口即

吐復不能吐亦見胸中寔當吐之若水飲蓄於胸中雖是有形而不可為寔故不可吐以少陽善嘔而發熱便是中氣之虛但熱而不寔故用人參以調中氣上焦得通津液得下胃氣因和故少陽之嘔與嘔語不並見所以嘔者是少陽本證嘔語是少陽壞證然不渴而飲水嘔與但欲嘔胸中痛微溏者又非柴胡證是嘔中又當深辨也。

少陽病解第十條

按嘔渴雖六經俱有而少陽陽明之病機在嘔渴中分渴則轉屬陽明嘔則仍在少陽如傷寒寒嘔多雖有陽明證不可攻因三焦之氣不通病未離少陽也服柴胡湯已渴者屬陽明也此兩焦之併合病已過少陽一經夫少陽始病便見口苦咽乾目眩先已津液已竭矣故少陽之病最易轉屬陽明所以發汗即胃寔而嘔語故小柴胡中已具或渴之證方中用參甘苓棗皆生津之品以預防其渴服之反渴者是相火藏盛津液不足以和胃即轉屬陽明之兆。

少陽病解第十一條

少陽妄下有二變寔則心下滿而硬痛為結胸用大陷胸下之虛則但滿而不痛為痞用半夏瀉心湯和之此二證皆從嘔變因不用柴胡令上焦不通津液不下耳本論云傷寒中風有柴胡證但見一證即是不必悉具言往來寒熱是柴胡主證此外兼見胸膈痞滿心煩喜嘔及或為諸證中凡有一者即是半表半裡故曰嘔而發熱者小柴胡湯主之因柴胡為樞機之劑風寒不全在表未全入裡者皆可用故證不必悉具而方有加減法也然柴胡有疑似證如脅下滿痛本渴而飲水嘔者柴胡不中與也又但欲嘔胸中痛微溏者此非柴胡證如此詳明所云但見一證便是者又當為細辨矣。

太陰病解第一條

按熱病論云太陰脉布胃中。絡於嗌。故腹滿咽乾。此熱傷太陰之標。自陽部注經之證。非太陰本病也。仲景立本病為提綱。因太陰主內。故不及中風四肢煩疼之表。又為陰中至陰。故不及熱病嗌乾之證。太陰為開。又陰道虛。太陰主脾。所生病。脾主濕。又主輸。故提綱主腹滿時痛而吐利。皆是裡虛不固。濕勝外溢之證也。脾虛則胃亦虛。食不下者。胃不主納也。要知胃家不寔。便是太陰病。

太陰病解第二條

脾胃同處腹中。故腹滿為太陰陽明俱有之證。在陽明是寔熱為患。在太陰是寒濕為害。陽明腹滿。不敢輕下者。恐胃家不寔。即轉屬太陰耳。世拘陽明傳少陽之謬。反昧傳太陰之義。

太陰病解第三條

熱病腹滿。是熱鬱太陰之經。有嗌乾可證。病在表也。寒濕腹滿。是寒生至陰之義。有自利可證。病在本也。脾經有熱。則陰精不上輸於肺。故嗌乾。脾藏有寒。則脾不為胃行其津液。故下利。夫陽明之當下。因本病而太陰之下證。反在標病。可以見陰陽異位之故。又以見陰從陽轉之義也。

太陰病解第四條

參中陰溜府之義。和熱邪不遽入至陰。雖熱在太陰之經。而寔在陽明之胃。可知下證只在陽明。太陰本無下法。腹滿亦兩經之經證。不大便而滿痛。或繞脅痛者。為寔熱屬陽明下利。而腹滿時痛為虛寒屬太陰寒濕。是太陰本病濕熱。又傷寒所致之變證也。其機關在小便。小便不利。則濕熱外見。而身黃。小便自利。非暴煩下利而自愈。即大便硬而不便。所以然者。脾胃相連。此脾家寔。則腐穢自去。而成太陰之開。若胃家寔。則地道不通。而成陽明之闔矣。故叔和知有二陽明。不知有太陰陽明證。

太陰病解第五條