

未3
642

審視瑤函
卷二



傅氏眼科審視瑤函方目

卷之二目錄

淫熱反尅之病

芍藥清肝散

通氣利中丸

黃連天花粉丸

黃連爐甘石散

龍腦黃連膏

啗鼻碧雲散

麝仁春雪膏

風熱不制之病

羌活勝風湯

杏仁龍膽草泡散

七情五賊勞役饑飽之病

柴明復生湯

黃連羊肝丸

當歸養榮湯

卷之二目錄

善成堂



中國醫藥大學圖書館版權所有

助陽活血湯 決明益陰丸 加減地黃丸

血為邪盛凝而不行之病

川芎行經散 消凝大丸子

氣為怒傷散而不聚之病

千金磁硃丸 滋陰地黃丸 石斛夜光丸

滋陰腎氣丸

血氣不分混而遂結之病

防風散結湯

熱積必潰之病

竹葉瀉經湯 蜜劑解毒丸

陽衰不能抗陰之病

決明夜靈散

陰弱不配陽之病

中和養胃湯

東垣瀉熱黃連湯

益氣聰明湯

心火乘金水衰反制之病

還陰救苦湯

菊花決明散

神驗錦鳩丸



南京中醫藥大學圖書館藏

萬應蟬花散

內急外弛之病

黃芪防風飲子

無比蔓荊子湯

奇經客邪之症

撥雲退翳丸

梔子勝

奇散

磨障靈光膏

消翳復明膏

爲物所傷之病



除風益損湯

傷寒愈後之病

人參補胃湯

強陽搏實陰之病

抑陽酒連散

亡血過多之病

芎歸補血湯

痲疹餘毒之病

羚羊角散

消毒化痲湯

卷之二十一

深膚爲患之病

扶苓瀉濕湯

升麻龍膽草飲子



傅氏眼科審視瑤函卷之二

秣陵傅仁宇允科纂輯

廣陵林長生聲震較補

甥張秀徵珩訂正

大梁周靖公亮節較梓

目病有三因

陳無擇曰喜怒不節憂思兼併以致臟腑氣不平鬱而生

涎隨氣上厥乘腦之虛浸淫目系陰注於目輕則昏澀

重則墮翳眵淚努肉白膜遮睛睛內如數冒風寒不避

暑濕邪中於項乘虛循系以入於腦侵於目而生目病

婿張文凱廷獻宏閱

男傅維藩國棟編集

公猷

掄

體仁

顓

全次



北京中医药大学图书馆藏

者皆外

若嗜慾無節。飲食不時。頻食五辛。過啖炙煇。馳

騁田獵。胃涉烟塵。勞動外情。皆喪明之具。

此內外因也。

徐彥純曰。人之眼目。備臟腑五行相資。而神明故能視。

內障乃瞳神黑小。神光昏昧也。外障則有翳膜可見矣。

凡見內障。有因於痰火氣鬱。血熱偏陽。偏陰虛脫。榮衛

種種不同。外障有起於內眥。睛上。睛下。睛中。視其翳色

從何經來。惟宜分治。蓋目之為病。肝熱則昏暗。心熱則

煩痛。風濕則癢。血少則澁。腎虛則睛損。甚則陷突。微則

翳暗矣。

診視



經曰左寸脉洪數心火上左關脉弦而洪乃肝火盛也左尺

脉微弱乃腎水不升也右寸關脉俱弦洪乃肝木挾火

勝之金而戕已為相火邪火上炎右尺脉洪數為相火邪火上炎

所勝之土也為寒沉數有方者為熱微細而弱者為虛

浮緊有力者為實夫五臟常欲相順相生如心見洪大而滑者為實

洪大而滑者為實夫五臟常欲相順相生如心見洪大而滑者為實

見洪而滑者為實夫五臟常欲相順相生如心見洪大而滑者為實

太和之氣其疾何見以生焉是為疾者五臟合相生之理稟

如心見沉細肝見短濇腎見遲緩肺見洪大脾見弦長

此五臟相尅一定之理豈止於病目而言哉經謂五臟不和萬物生尅一定之理豈止於病目而言哉經謂五臟不和萬

則六腑不通六腑不通則九竅疲癆九竅疲癆則氣血壅滯亦令人憎寒發熱惡風自江胸膈痞滿有類傷寒似瘧但日紅赤而頭不痛項不强身發寒不致戰慄發熱不致悶亂人為異而為外障或頭眩目昏頭痛而日不紅為內障由人於六淫七情飲食色慾過度運動失宜豈能一節而無所乖亂臟腑關竅不得宜通而痰內漬也予特叙痰飲之脉皆弦微沉滑或云左右關脉

大者或伏而大者皆痰也。眼皮及眼或如灰烟黑者亦痰也。然治法痰因火動降火為先。火因氣逆順氣為要。亢則害承廼制者。寒極則生熱熱極則生寒。木極而火金火極而似水。土極而似木。金極而似火。水極而似土也。左寸口心與小腸之脉所出君火也。左手關部與膽之脉所出風木也。左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也。右手寸口肺與大腸之脉所出燥金也。右手關部脾與胃之脉所出濕土也。右手尺部命門與三焦之脉所出相火也。

六脉者浮沉遲數滑濇也。浮者為陽在表。為陽為虛也。沉者為陰在裏。為濕為實也。沉遲者為陰寒在臟也。浮數者為陽熱在腑也。滑者血多氣盛也。濇者氣滯血枯也。

八要者。表裏虛實寒熱邪正也。表者病不在裏也。裏者病不在表也。虛者五虛也。脈細皮寒氣少泄利飲食不入也。漿粥入胃瀉止則生。實者五實也。脈盛皮熱腹脹前後不通。脅悶也。大小便通利而得汗者生。寒者臟腑自寒也。熱者臟腑積熱也。邪者外邪相干也。正者臟腑自病也。

內經謂曰病。赤脈從上下者太陽病。從下上者陽明病。從外走內者少陽病。從內走外者少陰病。太陽病宜溫之。散之。陽明病宜下之。寒之。少陽病宜和之。少陰病宜清之。

保命集云眼之爲病在腑則爲表當除風散熱在臟則爲裏當養血安神暴發者爲表易治久病者爲裏難療此論表裏之不同明矣用以治病如鼓應桴也

靈樞顛狂篇云目眥外決於面者爲銳眥在內近鼻者爲內眥上爲外眥下爲內眥

凡看目疾者男子多患左目女子多患右目此陰陽氣血不同故也或有左右無常者乃邪熱攻迫故也如男先傷左目而右目屢發定不可保女先傷右目而左目屢發亦不能救必須觀人老少壯弱爲主少而壯易治老而弱者難治易治者用藥溫和難治者用



症用藥。不可執一目。症雖有多端。然看者先將難易。定用藥。不致有悞。如瞳神凸凹者。不治。青綠白色者。不治。純黑者。不治。睛少光彩者。不治。此老人血衰之症。若翳障如半。月之狀。俱難治之。若睛圓不損。不論星多。少。翳厚薄。悉皆治之。翳怕光滑。星怕在瞳神。總宜翳膜輕薄。星點細小。若遇翳障未盡。切不可用刀割。目得血而能視。刀割則傷血。亦不可用火炙。翳膜生自肝火。又以火攻之。是以火濟火。豈是良法。惟服藥於先。必兼點藥。則病漸退。根除而不復發也。

按目病有外感。有內傷。外感者風寒暑濕燥火。此標症也。

患者致目暴發疼痛白睛紅腫眵淚赤爛其勢雖急易
治內傷者喜怒憂思悲恐驚此七情也患者致黑珠下
陷或起蟹睛翳膜障朦或白珠不紅腫神大小視物昏
花內障不現其勢雖緩難治又有不內不外而飲食不
節饑飽勞役所致當理脾胃為主目病雖多不外風熱
虛實之候治亦不離散清補瀉之法然補不可過用參
朮以助其火惟用清和滋潤之類瀉不可過用硝黃龍
膽以凝其血惟用發散消滯之類藥用當則日自愈今
人治目往往非大補則驟用大寒多致受傷治目毋投
寒劑固是要法又當省其致病之源以治之如貪酒者

徐徐戒其酒好色者緩緩戒其色暴怒者翼言戒其暴怒不聽則難療也然心生血脾統血肝藏血血得熱則行得寒則凝凝則生翳生膜目斯患矣不可不慎凡病目後宜滋腎水何也目以肝爲主肝開竅於目目得血而能視若滋腎水則水能生木木能生火火能生土土能生金金能生水生生不已其益無窮若腎水虧耗則水不能生木木不能生火火不能生土土不能生金金不能生水肝血虧而火妄熾其害可勝言哉

目不專重診脈說

夫曰有是病卽有是脈者此亦大槩言之其微渺未必皆

可恃乎脉也如目病必視其目爲內障爲外障內障有內障之症外障有外障之症必辯其爲何症所中所傷之淺深果在何輪何廓辯之明而後治之當今閨閣處子暨夫貴介之族但舒手於帷幔之外診其脉卽欲治其病且贊其用藥當而効之速不知卽方脉之專重乎脉者尤望聞問居其先而切脉居於後蓋切而知之僅謂之巧耳况症之重者關乎性命而惟恃巧以中之何輕視乎性命耶必精詳審辯而後治之可也重性命者當必以是言爲然也矧曰爲五官之最要者哉假令一瞽目隱身於帷幔之中舒其手於帷幔之外其六脈未嘗不與有目者相同也切

