

武昌醫館叢書


二



經史證類大全本草卷第十四

木部下品

戎州巴豆



巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破徵
瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑閉
閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女
子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌
之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡

川谷八月採陰乾用之去心皮

羌花爲之使惡藁草畏大黃黃連藜蘆陶隱居云出巴郡似大

豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蒂各有殼裹出眉州嘉州者良今按陳藏器本草云巴豆主癰癖疰氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也臣禹錫等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆筍醬豉冷水得火良殺斑猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫痿痺

大腹能落胎
日華子云通宣一切病卅壅滯帶除風補勞健脾胃
消痰破血排膿消腫毒殺腹藏虫治惡瘡息肉及疥癩丁腫
丸散炒不如去心膜煮
五度換水各煮一沸

圖經曰

巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉

如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋
月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六
月結實作房生青至八月熟而黃白類白豆寇漸漸自落即收之
一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有
縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等
他處亦稀有

雷公云

凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴
顯小緊實色黃豆即顯有三稜色黑若剛子顯小似

棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并
酒等可煮巴豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲
度

聖惠方

治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎
右塗左手心仍以暖水一盞安向手心須臾即便正

洗去藥并煩
抽掣中指

又方

治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一
瓣切一頭作蓋刺去中心可安巴豆在內以

蓋子合之用綿裹隨
患處左右塞耳中

外臺祕要

文仲方主唯腹大動搖水声皮
膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去

心皮熬令黃擣丸如小豆大
水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方

主大人小兒風瘙癢瘰癧心
迷悶方巴豆二兩槌破以



所有

水七升煮取三升以帛染拭之 **又方** 治寒癖宿食久飲不消大便秘巴豆仁一

微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸 **又方** 治喉痺已死有餘氣者巴

千金翼 治小兒身腫并手足腫兼癰瘡巴豆五十枚去皮

驗方 鄭懈待御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研取熱酒

蒸餅丸服 **又方** 治耳卒聾巴豆一粒蠟裹 **又方** 治箭鏃入骨不可

蠅蜋同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動

箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌

膏傅之說者云兼治瘡鄆得方後至洪州旅 **勝金** 治喉閉纏喉

舍主人妻患背瘡呻吟鄆遽用此方試之愈 **十全方** 治疥瘡巴豆十


紙緊角可通得入鼻用刀子切斷兩頭 **初虞方** 治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消

子點藥不得落眼裏及外腎上如煎剝著外腎以黃丹塗甚妙 **賈相公** 牛進過


牛有卒疲動頭打助者以巴豆兩箇去 **賈相公** 牛進過

皮擣末生油二兩淡漿水半升灌之差

蜀椒



施州崖椒



蜀椒味辛温大熱有毒主邪氣欬逆温中逐骨熱及膏

死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒温瘧大風汗不

出心腹留飲宿食腸辟下痢洩精女子字乳餘疾散風

邪痂結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒又服之頭不白

輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作

膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名唐唐音

藪音穀生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏人爲之使畏

出蜀都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平

間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此

爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令

汗出謂爲汗椒今有勢力椒目冷別入藥用不得相雜唐本注云

椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善

臣禹錫等謹按爾雅疏云檉者大椒之別名也郭云今椒樹叢生

實大者名爲檉詩唐風云椒聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉

堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煮其葉以爲香今成臯諸山間

有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可若飲食

中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長

所有

不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香
藥性論云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小毒能治冷風頑頭風下
淚腰痛不遂虛損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷痛除
齒痛**又云**椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆黃連
松脂以蠟容為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾
磬之聲卒暴聾一日一易若神驗**日華子**云漢椒破癥結開胃治
天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便
椒目主膀胱急**又云**椒葉熱無毒治賁泄伏梁氣內外腎虧并霍
亂轉筋和文及葱研以豉湯伴下並得

圖經曰

蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家
多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而

滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓
皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類
但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補
下宜用蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麩
合漚裏椒勿令漏氣分作兩裏於燂灰火中燒熟及熱出之刺頭
作孔當瘡上罨著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及
遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味
辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑筴末酒服錢匕甚效忌
鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱
居云俗呼為樛似椒薑音黨小不香耳今亦無復分別或云即金
椒是也薑子出閩中江東其木似樛莖間有刺子辛辣如椒主游
蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以

甘蜜九黨與黨同報吳增封
之禮然則黨之相贈尚矣

雷公云

一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從已至午放冷蜜蓋除向下火四畔無

氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也

食療

云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中

風以麪裹作餅鈍灰中炮之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦治傷損成弓風又去久患口瘡去閉口者以水洗之

以麪拌煮作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腰痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅癰生毛髮

出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方

治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用力破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出

外臺祕要

治瘡腫生椒末麪釜下土末之以大醋和傳之

千金方

有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生

椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差

肘後方

治金瘡中風蜀椒量瘡口大小

用麪作餅鈍煑火中炮令熟開一孔當瘡上掩之引風出可作數枚以差替換之妙

又方

蛇毒以閉口椒并葉擣傳之止

孫真人

云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方


治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方

治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不折者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合空心新汲水下




猪牙皂角



去積年冷煖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙
勝金方 治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子
 大茶下 **深師方** 治手足皴裂椒四合水煮之去滓浸之半食
 十九 未酥調之少少傳腦上日可三度 **譚氏** 治小兒水瀉
 和衆 未酥調之少少傳腦上日可三度 **譚氏** 紅丸及天年五
 十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙 **又方** 治漆瘡
 乾爲末篋器貯之每服二錢匕酒或米飲下之
卽援神契 椒薑禦瘟補益聰明

皂莢



皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利

九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落

明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如

猪牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使亞來麥明冬思民空
青人參苦杏仁南隱堂云今處



南京中医药大学图书馆藏

麤有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草葉上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但取青莢生者看自知之

唐本注

云此物有三種猪牙莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者薄大者虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大者莢

錫等按藥性論云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒能止痛

陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬按葉去衣垢沐髮除頭生江南澤畔如皂莢高一二尺

日華子

云皂莢通關節除風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口禁入藥去皮子以酥炙用

圖經曰

皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良

陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁得坐不得臥皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一九日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩鬲呷汁三口隨以肉汁下藥十九丸以快利為度覺得力更服以利清水即停差後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續或者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即搗篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十九丸漸增至二十九九重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以為蔬茹更

益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中心黃嚼餌之治
膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作濃煎以傳瘡癰有奇功

雷公云

凡使須要赤膩肥并不蛀者然用新汲水浸一宿子
用銅刀削上麓皮用酥反覆炙酥盡為度然出提之

去子搗篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不蛀者用
盛下水於火畔煮待泡熟剥去硬皮一重了取向裏白嫩肉

去黃消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用
聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂
角燒作灰為末非時新汲水

一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之
外用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈
外臺祕要治卒中風口

兩去皮為末以三年大醋和右
又方齒齲方擣皂角去皮
又方

方溺死一宿者尚活擣皂角綿
裹內下部須臾出水即活
千金方鼈鼻炙皂角末如小
豆以竹管吹入鼻中

又方鬼魘不悟皂莢
末刀圭起死人
又方難產吞皂莢
子二枚立差

又方小兒身上惡瘡先以皂
莢水洗拭乾以少油麻
器煮令沸服一升日三服頻作

又方經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心背滿悶不
焦即差皂莢去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢匕巴

豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三
食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服消酒

梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹一
又方治卒外腎偏疼皂
莢和皮為末水調



傳之良 **孫真人** 治咳嗽皂莢燒研碎 **又方** 治大小便不通關格

飲下三錢立通 **又方** 傷寒無問陰陽神驗以皂莢一挺肥者燒令赤為末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

方 治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香為末蜜丸如梧子大空心以痰藜子酸棗子湯下 **又**

方 治卒死以末吹臍中 **又方** 人好魘以末吹臍中 **斗門方** 治卒頭痛以皂莢末吹入臍中令嚏則愈

簡要濟眾 治中風口噤不開涎潮吐方用皂莢一挺去皮鑿猪脂炙令黃色為末每服一錢匕非時溫酒服如氣實

脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差 **博濟方** 治皂莢水并惡水入瘡口內熱痛不

止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先破研 **十全方** 治牙疼用皂子令細續入沙糖勻和如膏貼於瘡上

鹽等分燒為末 **靈苑方** 治急喉閉遂巡不救方以皂莢去皮子生未揩疼處良

醋調藥末厚傳項下須 **孫尚藥** 治卒中風昏昏若醉形體昏悶更便破少血出即愈

似利微有涎出斯須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂莢四挺須是肥實不蚰削

去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅為細末再研為散如

有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀冷出或一升二升當時惺惺次緩而調治不 **感應神仙傳**

可使大段吐之恐過傷人命累經効不能盡述

廣州訶梨勒



崔言者職隸左親騎軍一旦得疾双眼昏咫尺不辨人物有目
 落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癰皆為惡疾勢不可救因為洋州路
 子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂莢刺一
 斤為灰蒸久燉研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬
 再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之
 又鉄碓以燉金銀雖百十年不壞以槌皂莢則一夕破碎

訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本云樹似木椀晉惠花白子形似梔子青黃色皮肉相著水摩或散服之唐本先附

呂禹錫等撰按蕭炳云訶梨勒苦酸下消水止腸辟久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良

論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破育腸結氣止水道黑髭髮

日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂氣急月人漏胎及胎動欲生張悶氣喘并患痢人後分

急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木椀

花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採

六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸

水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其

寺謂之乾明舊本猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣

痢以訶梨勒十枚麪裹煨灰火中煨之令麪黃熟去核細研為末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩搗篩蜜丸

大如梧子每服二十九丸至三十九丸唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢匕甘草末若微有膿血加二匕若