

自在壺天



磨金墨汁同服外或有生荷葉汁生蘿蔔汁亦妙

○瓊玉膏治虛癆乾咳嗽

人參

十二兩

白茯苓

去皮十兩

白沙蜜

五兩煎去沫

生地黄

上好

者洗淨十二兩

杵爛取自然汁忌鐵器

沉香

五錢

琥珀

五錢

臞仙曰

今予所製此方加沉香琥珀二物其功效大異於世

之方右以人參茯苓琥珀沉香為細末與沙蜜攪勻

用密絹濾去渣入藥末攪勻入好磁餅或銀餅內用

棉紙十數層外加箬包扎瓶口入砂鍋內或銅鍋內

以長流水浸至瓶頸用桑柴火文武煮三晝夜取出



用蠟紙重包瓶口浸投井中半日以出火氣提起仍
入前鍋煮半日以出水氣然後收藏每日清晨及
前後取二三匙用溫酒一盞調服不飲酒入白湯
可此法須在不聞鷄犬聲之處煨煉不許孝子婦人
見

○又方治吐血五勞七傷諸虛百損

人參 黃芪 天冬 麥冬 生地 熟地 黃栢

當歸 牛膝 等分切咀 熬成膏再加白蜜 半觔 入內復熬

去水氣每日清晨空心白湯送下三五匙效不盡述

○三才大補丸

生地

熟地

各一

天冬

麥冬

淨肉各

人參

四兩

其

枸杞

四兩

牛膝

去四兩

何首烏

八兩

右咀

咬忌

鐵器同

入砂鍋內

用水二十碗

煎至七碗

將汁別貯

渣再煎

九次湯七十碗

慢熬汁耗一碗

再加一碗

添盡則汁

濃矣大約計

汁六碗却用

白蜜去蠟一

觔半同藥入

砂鍋煎用重

湯至滴水不

散則膏成矣

磁罐貯之埋

土中七日取

出如前煮一

晝夜再埋一

日乃分貯小

罐內以次取

用不拘時服

以醇酒或白

湯點服按此



方二冬為君補陰要藥少佐人參助陽首烏烏鬚髮
陰虛髮悴者宜之

○癆疾咳嗽方

杏仁不拘多少泡去皮尖曬乾將童便浸拌晒又浸晒如此十數
次焙研細末蜜丸白米湯送下二錢

○梨漿飲

日食好梨一個或取汁同人乳頭看起青色將結金
湯花取起入姜汁三匙空心服之其效甚大

○吐血方

舊琉璃

裝罐內火煨為灰二錢

當歸末

一錢五分

陳崇灰

一錢五分

麝香

墨

二分

白酒調服即止

○治骨蒸癆病外寒內熱附骨而蒸也其根在五

臟六腑中必因病後得之骨肉日消飲食無

味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌

腫起

石膏

十兩

研如乳粉水和服方至七日再以身涼為

度

○又方



地黄汁一觔服執退為度入粥亦可空心服

○吐血方

人參一味鷄蛋清調新水送下一錢

○又方

韭汁服婦人對茅草根汁同服立止

○又方

韭汁一鍾童便一鍾和勻空心頻服三日見效

○又方

用白芨一味為細末先用銅盆貯水令病人吐血於

內看其浮中沉浮者用雄猪肝白水煮熟切蘸藥食之後取汁飲之每一肝可早晚三次食可用藥五兩中者用猪心沉者用猪肺以住為止一日效

○又方

治吐血不止
血不歸經

好酒頻熱將雙足浸於內不止再解散髮

○又方

吐出之血炒黑研末麥門冬湯服三分以導血歸經

○又方

絲綿

五錢

燒灰調服即止

又方

老姜

四錢

杵汁對童便煎一二沸空心三服必效

○血如湧泉口鼻皆出須臾不救方

側柏葉

蒸乾

人參

焙乾各等分

為末每服二錢入飛麴

錢二

新汲水調如稀糊服

○又方

荊芥

燒過

蓋在地上去火毒研如粉陳米飲調下三

錢不過二服

勞心吐血方

蓮子一二粒十為末酒調二錢食後立愈

○勞傷吐血方

皂礬瓦焙紅生麵一觔水糊搽礬在內勻為梧大丸

每服五十丸二服即愈嗽者白米湯下不嗽者火酒

下極驗

鼻紅方

蘿蔔汁一鍾沖湯服即止

○鼻血不止方

如左出血扎右中指右扎左如齊出齊扎

○衄血方

即接取血點眼角并燒灰水服一錢

○又方

水牛尿姜汁和服降火散瘀血服此者十無一死

○又方

髮灰吹鼻止衄散瘀血止上下諸血並水服

又方

白芷燒灰末好酒調服再不止生姜自然汁入鼻中

又方

大蒜去衣搗泥左敷左足心又白芨末塗鼻梁

又方

生蔥內涎吹入鼻內立效且覺血從腦頂散下

○又方

左鼻出以紙塞右耳右亦如之

○又方

用所出血調白芷末塗山根立止

○又方

栗壳燒存性研末粥飲服二錢

○灸瘡出血百方不效方

百草霜搽半錢即止

○血痔出血不止方

真蘇油一鍾服下其血自止

○腸風下血一服即止方

晚蚕沙煉蜜為丸重二錢五分滾水或茶下即止

○又方

皂莢子吞七粒甚者十四枚

又方

治數年不愈者
立效

槐子 二兩 芝蔴 六合
先將槐子炒黃再入芝蔴同
香研末長流水送下五錢三五服除根

○又方

香櫟皮焙乾好酒下一錢數服愈

又方

用涼胃藥
不愈者效

山查末艾湯下

○治臟毒糞前後紅及崩漏等症方

五倍子為末鹽梅搗膏為丸空心白湯下三十丸

糞後紅方

上好木耳性燒存每日空心好酒服四五分久服愈或

单用木耳五錢湯泡淨加醬油食之

○又方

槐米

不拘多少將好酒拌浸一夕蒸熟曬乾

每日不拘空心食遠米飲

送下二錢頻服之一生可免便血之症

又方

槐子炒末入少鹽淡煮猪大腸蘸食

便血方

槐子煮鷄蛋空心食二枚



○又方

大熟柿

去皮
擠水

和占米粉作餅蒸食水作茶服效或

乾

柿燒灰服末二錢米飲下

○尿血方

油頭髮燒存性為末新汲水調下

○又方 暴熱用

山梔去皮炒水煎 又雪水烹茶

又方

麥冬

四兩
去心

煎服又不通用生芝蔴研冷水送下

○又方

新地骨皮搗汁乾者用水濃煎多服一盞加酒少許

又方

最大換擲 一個 用半枚麥門執水細和之沸湯盪過

乘執服一盞當時尿血稀

○又方

胡燕巢中草灰婦人尿血酒服 又韭汁和童尿服

又車前汁空心服 又琥珀燈心湯調服 又烏梅

燒末醋丸服

