

	S28
	1816
	1P32

經
之
醫
類
案

第二十三



續名醫類案卷三十二

錢塘魏之琇編集

濮院呂大綱慎齋
海昌王士雄孟英
同校

發背

精要論背疽其源有五一天行二瘦弱三
怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙燂服丹藥

元末嘉興桐鄉縣後朱村徐通判素慕洞賓朝夕供禮一日
疽發於背勢垂危猶扶起禮之如昔偶見淨水盂下白紙
視之有詩云紛紛墓土黃金屑片片花飛白玉芝君主一
斤臣四兩調和服下即平夷意其仙方然不知何物爲黃
金白玉乃召仙以大黃白芷爲問仙曰然服之果驗後以

之醫人無不效。徐無子方竟傳婿沈氏。至今沈以此治生。
數百里來貨藥者無虛日。族大而分數十家。惟嫡枝居大
椿樹下者。藥乃驗。沈子嘗從吾友俞院判學。嘗聞其藥。今
加川山甲當歸鬚金銀花矣。然大黃既多。以下爲主。不問
陰陽之毒而投之。恐亦有害者。然源源往醫。又獨於椿樹
下者。驗豈非天固與之乎。

七修
類編

京師萬勝門生員王超。忽覺背上如有瘡隱。倩人看之。已如
盞大。其頭無數。或教往梁門裏外科金龜兒張家買藥。張
視頰眉曰。此瘡甚惡。非藥所能治。只有灼艾一法。庶可冀
望。萬分然恐費力。乃撮艾與之曰。且歸試灸瘡上。只怕不

疼直待炙疼方可療耳灼火十餘殊不知痛妻守之而哭
至第十三壯始大痛四旁惡肉捲爛隨手墮地卽以稍愈
再詣張謝張付藥數貼日安則知癰疽發於背脇其捷法
莫如炙也

類編

王敏診一人發背不起醫言起則治矣敏曰是擊指脈卽起
亦不治眾劫以艾疽起如粟眾曰無傷矣竟三日死

姑蘇志

治發背腦疽一切惡瘡初覺時採獨科蒼耳一根連葉帶子
細剉不犯鐵器用砂鍋熬水二大碗熬及一半瘡在上徐
徐飯後服之吐出候吐定再服以盡爲度瘡在下空心服
瘡自破出膿更不潰爛瘡上別以膏藥傳之此方京兆張



新加坡中医药大学图书馆藏

伯玉家勝示傳人。後昆仲皆登第。人謂善報。

元遺山續
夷堅志

大凡石類。多主癰疽。世傳麥飯石膏。治發背瘡甚效。乃中岳山人呂子華秘方。裴員外啖之以名第。河南尹魯之以重刑。呂寧絕榮望。守死不傳其方。取此石碎如碁子。炭火燒赤。投米醋中浸之。如此十次。研末篩細。入乳鉢內。用數人更碾五七日。要細膩如麵。四兩鹿角一具。要生取連腦骨者。其自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令煙盡。卽止。爲末。研細二兩。白斂生研末二兩。用三年米醋入銀石器內煎。令魚目沸。旋旋入藥在內。竹杖子不住攪。熬一二時久。稀稠得所。傾在盆內待冷。以紙蓋收。勿令塵入。用時以

鷺翎拂膏於腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未
有膿卽內消已作頭卽撮小已潰卽排膿如湍水如痼久
肌肉爛落見出筋骨者卽塗細布上貼之乾卽易逐日瘡
口收斂但中隔不穴者卽無不瘥已潰者用藥時先以猪
蹄湯洗去膿血用帛挹乾乃用藥其瘡切忌手觸動嫩肉
仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌
此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥極細方
有效若不細塗之卽極痛也此方千金月令已有之但不
及此詳細耳

本草綱目

馮楚瞻治蔣司農向來脈氣寸強尺弱故服八味丸已有年

矣。此等脈多陰虛火上炎之候。凡久服八味丸者多貽後患。然過勞藥力不能勝其妄

動之火鼻衄大作。調理雖愈而口渴殊甚。飲湯水如甘露

然。卽數十杯不足滿其欲也。此卽消渴久成癰疽。勸服大劑壯水佐

以引火歸原之餌。則水升火降。消渴自除。變症可弭。乃忽

之。雖服數劑渴畧減。藥卽停。至初夏背上忽隱隱痛癢。漸

甚而肉硬。半月餘痛極重。及診之。當脊少偏半寸外不腫

肉分堅實如椀大矣。日久渴不治。陰水日虧。陰火日熾。書

所以有腦疽背疽之兆也。亟爲托出陽分。使毒氣勿致逗

遛內陷爲要。乃外用大黃二兩。芙蓉葉赤芍各一兩。白歛

白芨各五錢爲末。雞子清調敷毒四圍。內則重滋陰水加

熟地山藥土貝角刺天蟲甲片生甘草連翹金銀花之類。及腫既成。乃早吞八味丸五六錢。以培先天之水火。食遠服參耆歸芍朮草銀花甲片天蟲角刺白芷之類。以助後天之氣血。外以太乙膏加男髮草麻子乳香沒藥煎膏貼之以呼毒氣外出。不旬日紅腫消痛重減。瘡已熈高。已有膿勢。乃一外科改絃易轍。幾至內潰。再亟治。仍用前法煎藥加肉桂錢許。仍高腫紅活。竟如些小之毒。潰膿而愈。

高鼓峰治一鄉人患發背。上距風府。下連腎俞。通塊腫起。肌肉青冷。堅硬如鐵。飲食俱廢。不省人事。醫猶用解毒藥。服之六部細數。氣血大虧。毒將內陷矣。急用養榮湯加附子

炮薑三大帖而胃氣開。十劑而堅硬者散去十之八九。只左邊如茶鍾大。焮紅作腫。戒之曰。切莫箍藥及刀針。氣血溫。和毒當自出。箍則反遲。非時而刺。收口難矣。彼以不在痛。竟受刺出血。曰。當倍前藥急服。以收口爲度。仍戒以節嗜慾。慎飲食。兼服還少丹八味丸而愈。

朱丹溪曰。予見吳兄厚。味氣鬱而形實。性重。年近六十。患背疽。醫與他藥皆不行。惟香附末飲之。甚快。始終只此一味。腫潰。恃此以安。此等體實。千百而一見者也。名獨勝散。惟氣滯血凝實症宜之。

樓氏婦早寡。善飲啖。形肥偉。性沈毒。年六十六。七月間生背

疽近正春，醫遂橫直裂開，取血，雜以五香十宣散，與酒飲之。月餘未嘗議其寡居之鬱，酒肉之毒，執著之滯。時令之熱迫，至於平陷，淹延兩三月而不救。

江陵府紫極觀掘得石碑，載此凡人發背欲結未結，赤紅腫痛，先以濕紙覆其上，立視候其紙先乾處，則是結癰頭也。

取大蒜切成片，如當三錢厚，安頭上，用大艾炷灸之三壯，即換一蒜片。痛者灸至不痛時住，不痛者灸至痛時方住。早覺早灸爲上。

如有頭似麻豆大者，不須用濕紙覆法。

若有十數頭聚而在

一處生者，即用大蒜頭搗膏作薄餅，鋪頭上，聚艾於餅上

燒之。

一二日十灸，十活三四日，六七活五六日，三四活。

王蘧發背方序云元祐三年夏四月宮京師疽發於背召國

醫治之逾日勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加瘡上

自旦及暮凡一百五十壯知痛方已明日鑷去黑痂膿盡

潰肉裏皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉易時

旋翦去黑爛肉許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽

者七人余獨生此雖司命自然固有定數不知其方遂至

不幸者以人意論之可爲慨然于是撰次前後所得方模

板以施庶幾古人濟衆之意

此卽當頭灸法
但不用蒜耳

史源母氏背胛間微痒視之有赤半寸許方有白粒如粟黍

乃急著艾炙其赤隨消一七壯而止信宿復覺微痛視之

有赤下流長二寸。濶如莖葉。舉家皆以前灸爲悔。或云等慈寺尼智全者。前病瘡甚大。得灸而愈。奔問之。全曰。劇時昏不知。但小師輩言。范八奉議守定灸八百餘壯。方甦。約艾一篩耳。亟歸白之。見從。始以艾作炷。如銀否大。灸其上十數。殊不知痛。乃截四旁赤引。其炷減四之三。皆覺痛。七壯後覺痒。每一壯燼。則赤隨縮入。灸至二十餘壯。赤暈收退。病者不憚。遂以艾作團。大炙其上。漸加至雞黃大。約四十團。方覺痛。視火焦處已寸餘。蓋灸之遲。而初發處肉已壞。壞肉成隔。直至好肉方痛。四旁知痛。肉未壞也。病者六夜不寐。至是食粥安寢。至晚視之。瘡如覆一甌。突高三四

寸上有百數小竅。色正黑。突然高者。毒氣出外而聚也。百數小竅。毒未聚而浮攻肌膚也。色正黑者。皮與肉俱壞也。非灸火出其毒于壞肉之裏。則五臟逼矣。

薛立齋治王通府。患背發十餘日。勢危。脈大。先與槐花酒二服。殺退其勢。更以敗毒散二劑。再以托裏藥數劑。漸漬。又用桑柴燃灸患處。每日灸良久。仍以膏藥貼之。灸至數次。膿潰腐脫。以托裏藥加白朮陳皮月餘而愈。

劉大尹發背六七日。滿背腫痛。勢甚危。與隔蒜灸百壯。飲槐花酒二碗。卽睡覺。與托裏消毒藥十去五六。令以桑枝灸患處而潰。數日愈。凡灸及飲槐花酒。則托裏之效甚速。

一園丁患發背甚危。令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾。絞取酒汁溫服。渣罨患處。四五服而平。彼用此藥治瘡。足以養家棄園業。諸書云。金銀花治瘡瘍未成者。卽散。已成者。卽潰。有回生之功。

大監劉關患發背。腫痛色紫。診其脈息沈數。陳良甫云。脈數發熱而痛者。發于陽也。且瘡瘍赤甚則紫。卽火極似水也。詢之。嘗服丹藥半載。乃積溫成熱所致耳。遂以內疏黃連湯再服。消平。更用排膿消毒藥及猪蹄湯太乙膏而愈。經曰。色與脈當相參。應治之者在明。亢害承制之理。陰陽變化之機焉耳。



一男子年逾五十患發背。色紫腫痛。外皮將潰。寢食不安。神思甚疲。用桑柴灸患處。出黑血。卽甦睡覺。而諸症如失。服仙方活命飲二帖。又灸一次。膿血皆出。更進二劑。腫痛大退。又服托裏消毒散數帖而斂。夫瘡毒熾甚。未宜峻劑攻之。但年老血氣衰弱。况又發在肌表。若專于攻毒。則胃氣先損。必反誤事。

吳江申僉憲患背疽。堅硬脈沈實。乃毒在內。用宣毒散大黃五錢煨白芷五錢水煎。食前服一劑。大小便下污物。再服而消。此方乃宣通攻毒之劑。脈沈實便秘者。其功甚大。

琇按卽首條黃金白玉方。薛用之而不詳其出處。

大尹陳國信素陰虛患背疽用參芪大補而不斂內熱發熱
舌燥唇裂小便少頻數口乾飲湯嘔吐瀉利耳閉目盲仰
首眩暈脈浮大而數薛曰瘡口不斂脾土敗也舌燥唇裂
腎水枯也小便頻數肺氣衰也內熱發熱虛火上炎也口
乾飲湯真寒之象也嘔吐瀉利真火衰敗也耳閉目盲肝
木枯散也仰首眩暈腎氣絕也辭不治後果歿。

琇按不拘內外病凡陰虛者服參耆諸氣分藥非惟無
益而反害之據此症純屬三陰虧竭若初時解用二地
二冬杞子歸芍之輩猶可挽也。

吳庠史邦直之內仲夏患背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少

食口乾飲湯脈洪大按之如無此內真寒而外假熱當捨
時從症先用六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進復用十全
大補湯仍加薑桂之類五十餘帖而死肉潰又五十餘劑
而新肉生斯人血氣充盛而瘡易起易斂使醫者逆知預
爲托裏必無此患

雄按十全大補必毒
火盡除而後可用

南儀部賀朝卿陞山西少參別時見其唇鼻青黑且時搔背
問其故曰有小瘡耳與視之果疽也此脾胃敗壞爲不治
之症薛素與善悲其途次不便殯殮遂托其僚友張東沙
輩強留之勉與大補但出紫血虛極也或謂毒熾不能爲
膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆脈脫果卒於南都