

亥23  
6(2)×4

徐氏十三種醫書

中華圖書館印行



序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辨其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病證異則又各有主方各有主藥于變萬化之中實有一定不移之法卽或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐八外臺千金不過彙集古方未能原本內經精通病變然病名尙能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓體統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則雜亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至於近世則惟記通治方之數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動輒誤人余深憫焉茲書之所由作也本內經以探其源次難經及金匱傷寒論以求其治其有未備者則取六朝唐人之方以廣其法自宋以後諸家及諸單方異訣擇其義有可推試多獲效者附焉庶幾古聖治病之法尚可復覩使學者有所持循不至彷徨無措至於推求原本仍當取內經金匱等全書潛心體認而後世之書亦當窮其流派掇其精華摘其繆誤而後此書之精意自能融會貫通而心有實獲則變化在我矣

乾隆二十九年四月洞溪徐靈胎書於吳山之半松書屋



南京中医药大学图书馆版权所有

凡例

一每病先敍病原首內經次金匱傷寒次病源千金外臺宋以後亦間有採者前人已有之論則後者不錄若一病之中爲病不一則卽詳著於總名之下不復另立病名方之次第亦然

一一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則他病下祇載方名并治法註云見某病門以便

翻閱

一專治一病爲主方如一方而所治之病甚多者則爲通治之方先立通治方一卷以俟隨證揀用變而通之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分載於各證之下學者當精思熟識以爲準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故略取六經主病之方隨證分錄其外諸方兼治雜病者俱分載各證條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變證耳學者當合金匱傷寒兩書

相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味卽另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味卽自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之祕傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至于大藥重劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之症證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脈遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱爲標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心況疾病乃身命所關豈可輕以謬人此集溯本窮流

問括明備人人易曉病者醫者對證等方互相考證則是非立辨不致以性命輕擗未始非衛生之一助云



北京中医药大学图书馆版权所有

卷一

通治方

卷二

風

痹歷節

瘧

厥

虛勞

消證附強中

瘧

卷三

傷寒

百合

感冒

寒熱

霍亂附筋

瘈

癃閉利淋

卷四

濕

膈

痰瘡

痢

癲狂癇

痰飲

咳嗽附肺脹

痢

卷五



喘

臌脹水腫

肺癆

諸血

噎膈嘔吐

附關格

泄瀉

附肺

卷六

積聚癰痞

附狐惑

諸痛

頭心胃腰腹

腳氣

附轉筋

卷七

疫癘鬼疰

附黃汗

情志臥夢

五竅病

耳目口齒鼻

卷八

雜病

婦人

小兒



目錄

小建中湯

黃耆建中湯

大建中湯

炙甘草湯

八味地黃丸

資生腎氣丸

六味地黃丸

當歸生薑羊肉湯

竹葉石膏湯

脾約丸

四君子湯

五味異功散

七味白朮散

六君子湯

獨參湯

參附湯

保元湯

生脈飲

歸脾湯

補中益氣湯

虎潛丸

龜鹿二仙膠

三才封髓丹

七寶美髯丹

還少丹

羊腎丸

羊肉粥方

三才丸

天王補心丹

黑地黃丸

元精丹

祕方補心丸

威喜丸

靈砂

二神丸

導赤散

亡血脫血方

當歸補血湯

益血潤腸丸

葛歸膠艾湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

柴胡四物湯

免絲子丸

蓀蓉免絲子丸

餌水方

服牛乳方

生地黃煎

阿伽陀藥

玉屏風散

盜汗方

止汗紅粉

當歸六黃湯

麥門冬湯

二腎散

逍遙散

平胃散

五苓散

二陳湯

枳朮丸

瀉黃散

保和丸

加減思食丸

越鞠湯丸

四磨飲

妙香丸

藿香正氣散

天水散

二氣丹

瀉白散

三黃湯

涼膈散

四物二連湯

左金丸

龍膽瀉肝湯

甘露飲

清心蓮子飲

瀉熱梔子煎

大順散

十精丸

成煉鍊乳粉

玉霜園

礞石散

黑錫丹

龍膽雞蘇丸

至寶丹

蘇合香丸

瓊玉膏

大活絡丹

解毒萬能丹

吳江徐靈胎洞溪著

通治方

雖云通治亦當細切病  
情不得籠統施用也

小建中湯

金匱

虛勞裏急悸動腹中痛夢失精四肢瘻瘍手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝

三兩去皮

甘草

三兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飴

一升

右六味以水七升煮取二升去滓

納膠飴更上微火消解溫服一升日三服

此方治陰寒

易衰之虛勞

正與陰虛火旺之病相反庸

醫誤用害人甚多

此咽乾口燥乃津液少非有火也

黃耆建中湯

金匱

虛勞裏急諸不足者主之 於小建中湯內加黃耆一兩半餘依前法

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥冷小腹掣急或腹滿痙急不能食起卽微汗陰縮或腹中寒痛不

堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能久立

黃耆

當歸

桂心

芍藥

人參

甘草

各一錢

半夏

炮

黑附子

炮各二錢半

右藥每

服五錢加鹽

三片

棗二枚煎服

此非金匱大建中湯金匱方入腹痛門

桂枝去皮卽桂心非近

時所用之肉桂心也

此方兼治下焦虛

寒之症不但建立中宮

炙甘草湯

傷寒論一

名復脉湯

治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

甘草

四兩

桂枝

生薑

各三兩

麥門冬

半斤

麻仁

半斤

阿膠

人參

各二兩

大棗

三十枚

生地黃

一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓納膠消盡溫服一升日三服

此治血脈空竭方  
酒所以和血脈凡脈見

結搏者雖行動如常亦不出百日必死若復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

八味地黃丸

崔氏

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主之又婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者

此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈此亦主之

乾地黃

八兩九蒸爲度搗膏

乾山藥

山萸肉

各四兩

丹皮

澤瀉

各三兩

桂枝

附子各二兩

右八味爲末煉蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服

此方亦治脚氣乃驅邪水以益正水之法也此方專利小便水去而陰不傷扶陽而火不升製方

之妙固非一端但近人以此一方治天下之病則又大失此方之義也

資生腎氣丸

治肺腎虛腰重腳輕小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蟲證於前八

味丸加車前子牛膝各一兩餘依前法

六味地黃丸

錢氏

治腎陰不足發熱作渴小便淋閉氣壅咳嗽頭目眩暉眼花耳聾咽乾舌痛齒牙不固腰

腿痠軟自汗盜汗便血諸血失音水泛爲痰血虛熱等證於前方去肉桂附子餘依前法

此方錢氏專治小兒

當歸生薑羊肉湯

金匱

治產後腹中疼痛並治腹中寒疝虛勞不足

當歸

二兩

生薑

五兩

羊肉

一斤

右以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑成一

斤瘡多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑等者亦加水五升煮取三升二合服之之以味此方精不足者補是也

竹葉石膏湯傷寒 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

論傷寒

竹葉二把 石膏一斤碎半斤洗人參三兩甘草二兩炙麥門冬去心粳米半升右七味以水一斗煮

取六升去滓納粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服集驗載此方加生薑治嘔最良此治三陽解後人俱概用峻補以留其邪凡大病之後必有留熱總宜消則元氣不能驟復愈補愈虛矣亦治傷暑發渴脈虛暑病有虛熱者宜之若吐逆督亂之症則大誤矣

脾約丸金匱卽 治腸胃熱燥大便祕結

麻仁五兩另研大黃一斤蒸焙厚朴薑炒枳實炒芍藥炒各五兩杏仁半右爲末蜜丸梧子大臨睡用白湯

送下二十丸大便利卽止此潤腸之主方

四君子湯 治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者若內傷虛熱或飲食難化須加炮薑

人參 白朮 茯苓 甘草各二錢右加薑聚水煎服此補脾之主方

五味異功散錢調理脾胃 於四君子湯加陳皮一錢爲末每服二錢白湯調服

七味白朮散 治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦 於四君子湯加薑香半兩

葛根一兩木香二錢半爲末每服二錢白湯調下

大君子湯 治氣虛有痰脾虛脹 卽前方加陳皮半夏餘依煎法更加藿香砂仁爲香砂大君子湯

獨參湯 治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈

人參分兩隨症 右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減此一時急救之法服後即當隨症用藥

參附湯 治陰陽血氣暴脫證

人參一兩附子製五錢 右加薑漿水煎服此亦急症之方本方去人參加黃耆名耆附湯

保元湯

黃耆三錢 人參二錢 甘草一錢 肉桂春夏二三分秋冬季六七分

右四味水煎服氣血虛寒者用之總虛寒之痘症亦用 此乃宋以後之方故

肉桂止用二三分以爲氣分引藥乃厚桂非桂枝也

生脈飲錄 治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參五錢 麥門冬

五味子各三錢

右三味水煎服

此方傷暑之後存其津液庸醫卽以之治暑誤甚觀方下治證並無一字治暑邪者

此卽於復脉湯內取參麥二味以止汗故復加五味子近人不論何病每用此方收住邪氣殺人無算

歸脾湯濟 治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而不寐或心脾作痛嗜臥少食及婦女月經不調

人參

龍眼肉

黃耆

各二錢半  
甘草五分  
白朮二錢半  
茯苓二錢半  
木香五分  
當歸

酸棗仁

炒研

遠志各一錢

右加薑三片水煎服

補脾有二法一補心以生脾血一補腎以壯脾氣此方乃心脾同治之法補後天以生血卽所以調經

補中益氣湯

東垣

治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脈洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無

氣以動動則氣高而喘

黃耆

人參

雲朮

炒谷一錢半

甘草

炙一錢

陳皮

五分

當歸

一錢

升麻

柴胡

各五錢

右八味加

生薑三斤

大棗二枚水煎溫服

東垣之方一概以升提中氣爲主如果中氣下陷者最爲合度若氣高而喘則非升柴所宜學者不可誤用也

虎潛丸

丹溪

治腎陰不足筋骨痿不能步履

龜板

黃柏各四兩

知母

熟地各三兩

牛膝

三兩

鎖陽

虎骨

當歸各一錢

芍藥

一兩

甘草

五錢

陳皮

七錢五分

冬月加熟薑

五錢

右爲末

煮羯羊肉搗爲丸桐子大淡鹽湯下

瘦證

皆屬於熱經有明

文此方最爲合度後人

以溫補治癆則相反矣

癆證又有屬痰濕風寒外邪者此方又非所宜

資生丸

治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固兼丈夫調中養胃飢能使飽飽能使飢神妙難述

人參

三兩

茯苓

二兩

雲朮

三兩

山藥

二兩

薏仁

一兩半

蓮肉

二兩

芡實

一兩半

陳皮

神曲

各二兩

砂仁

一兩半

白豆蔻

八錢

桔梗

一兩

藿香

一兩

川黃連

四錢

白扁豆

山楂

各一兩半

右十

右十

八味爲細末煉蜜丸彈子大每服一丸米飲下

此方治懷孕氣阻用兼消兼補之法意亦可取今人多論何因爲總治脾胃之藥則失製方之義矣藥味太

雜全無法度姑存之以備一格

### 鹿二仙膠 大補精髓益氣養神

鹿角血者十斤  
自敗者龜板五斤

以上二味另熬膏

杞子三十兩人參甘州者十五兩

右用鉛鑄如法熬膠

初服酒化一錢五分漸加至三錢空心下

精不足者補之以味而龜鹿又能通督任填補之法此爲最穩

### 三才封髓丹鑑 除心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天冬 熟地 人參各五錢黃柏三兩砂仁一兩  
一錢甘草

右爲末麵糊丸梧子大每服五十

丸用旋盞半兩切作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下

此補陰氣之方虛人老人便結者爲宜

### 七寶美髯丹 邵應 補腎氣烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白雌雄各一斤牛膝八兩以何首烏先用米泔水浸一夜以竹刀剗去粗皮切作大片用黑豆

豆覆之以豆熟爲度去豆曬乾次日鋪餌中一層却鋪何首烏一層每鋪豆一層重重相間上鋪

如前用生豆蒸如法蒸七次去豆用破故紙半斤酒浸洗淨用黑芝麻當歸半斤去頭白茯苓半斤

乳杵浸透赤茯苓半斤黑牛乳兔絲子半斤酒浸一宿洗枸杞子半斤去

鹽乾蒸浸曬乾蒸二次

枸杞子帶枯者右共爲末蜜丸龍眼大

每日空心嚼二三丸溫酒或米湯白鹽湯皆可下

製法不可犯鐵器此補腎

血之方

無比山藥丸金 治丈夫久虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疼腰臍不隨飲食不生肌肉或少食而腹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行

熟地酒浸 赤石脂 巴戟去心 茯苓 牛膝酒浸 山茱萸肉 澤瀉各二兩 乾山藥二兩

五味子六兩 肉蓯蓉酒浸四兩 兔絲子 杜仲炒各三兩

右藥煉蜜丸桐子大每服二十丸至三十丸食前溫酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響爲驗此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪此收養腎氣之方量

爲穩  
要

還少丹楊氏 大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等證

山藥 牛膝 遠志 山萸肉 茯苓 五味子 楮實子 巴戟酒浸去心

肉蓯蓉酒浸一宿 石菖蒲

杜仲薑汁酒同拌炒各二兩 枸杞子

熟地各二兩 右共爲細末煉蜜同聚

肉爲丸梧子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服此交通心腎之方

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便不利

熟地 杜仲 兔絲子另研石斛 黃耆 繢斷 肉桂 牛膝 磁石煅淬

沉香 五加皮 山藥炒各一兩 右爲末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸梧子大每