

臨證指南 卷五



詳考華嶠雲





寒

寒邪客肺

某二客邪外侵頭脹當用辛散。

蘇梗

杏仁

桔梗

桑皮

橘紅

連翹

某

寒熱頭痛悶

淡豆豉

嫩蘇梗

杏仁

桔梗

厚朴

枳殼

風寒傷衛

某五復受寒邪背寒頭痛鼻塞

桂枝湯加杏仁

寒邪兼濕

某九時邪外襲衛痺發熱頭痛先散表邪。



寒客太
陽勝於
經氣逆

勞倦陽
虛感寒

淡豆豉

蘇梗

杏仁

厚朴

木防已

茯苓皮

楊

二四

太陽脉行由背抵腰外來風寒先傷陽經雲

及上經氣逆而病發致嘔痰涎頭痛小溲數行病

肱氣通斯逆者轉順矣當迎太陽之裡用五苓散倘外

感病發再議

某

二八

勞傷陽氣形寒身熱頭疼腕悶身痛

杏仁

三錢

川桂枝

八分

生薑

一錢

厚朴

一錢

廣皮

一錢

茯苓皮

三錢

傷寒症仲景立法於前諸賢註釋於後先生雖天資



穎敏。若擬其治法。恐亦不能出仲景範圍。其
於庸醫者。在乎能辨症耳。不以冬溫春溫風溫
濕溫伏暑內傷勞倦瘟疫等症。誤認爲傷寒。其治溫
熱暑濕諸症。專辨邪之在衛在營。或傷氣分。或傷血
分。更專究三焦。故能述前人溫邪忌汗。濕家忌汗。當
用手經之方。不必用足經之藥。等明訓。垂示後人。此
乃先生獨擅見長之處也。若夫傷寒之書。自成無已。
註解以後。凡註疏者。不啻數百家。其尤著者。如嘉言
三書。景岳書。傷寒三註。四註等篇。近有柯韻伯來蘇
集傷寒論翼。方翼。王晉三古方選註中。所解一百十



三方。諸家析疑辨義處。雖稍有異同。然皆或登仲景之堂。或造仲景之室者。業醫者。當日置案頭。潛究。庶乎臨症。無誤矣。華岫雲

傷寒一症。內經云。熱病者。皆傷寒之類也。又曰。傷寒而成溫者。先夏至日者。爲病溫。後夏至日者。爲病暑。又曰。冬傷於寒。春必病溫。其症有六經相傳。併病合病。兩感直中。難經又言。傷寒有五。有中風。有傷寒。有溼溫。有熱病。有溫病。其所苦各不同。再加以六淫之邪。有隨時互相兼感而發之病。且其一切現症。則又皆有頭痛發熱。或有汗無汗。或惡風惡寒。不食。



倦卧煩渴等。則又大略相同。故其症愈多。其理
母怪乎醫者臨症時。不能灼然分辨。卽其所讀
前人亦竝無至當不易之論。將靈素難經之言。及

切外感之症。逐一分晰辨明。使人有所遵循。故千百
年來。欲求一鑒垣之士。察六淫之邪。毫不紊亂者。竟
未見其人。幸賴有仲景之書。以六經分症。治以汗吐
下和寒溫諸法。故古人云。仲景之法。不但治傷寒。苟
能悉明其理。卽治一切六氣之病。與諸雜症。皆可融
會貫通。無所不宜。此誠屬高論。固深知仲景者也。然
余謂六淫之邪。頭緒甚繁。其理甚奧。卽彙集河間東



垣丹溪及前賢輩諸法而治之。猶慮未能兼括盡善。
若沾沾焉必欲但拘仲景之法而施治。此乃具
庸膠柱鼓瑟。不知變通者矣。今觀葉氏之書。
法固屬無多。然其辨明冬溫春溫風溫溫熱濕
治實超越前人。以此羽翼仲景。差可嘉惠後學。觀者
幸毋忽諸。華德元



風溫

肺風溫傷

僧二五近日風溫上受寸口脉獨大肺受熱灼聲出不揚

與辛涼清上當薄味調養旬日

牛蒡子

薄荷

象貝母

杏仁

冬桑葉

大沙參

南花粉

黑山梔皮

傷

脉左實大頭目如蒙清竅不爽此風溫仍在上焦擬

升降法

乾荷葉

薄荷

象貝

連翹

鈎藤

生石膏末



北京中醫藥大學圖書館版權所有

某風溫從上而入。風屬陽。溫化熱。上焦近肺。肺氣不舒轉。周行氣阻。致身痛。腕悶不飢。宜微苦以清。以宣通。醫謂六經。輒投羌防。泄陽氣。劫胃汁。溫何遽忘之。

杏仁

香豉

鬱金

山梔

瓜蒌皮

蜜炒橘紅

葉

風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔。頭脹。咳嗽。發疹。心中懊懣。腕中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結痺。宿有痰飲。不欲飲水。議梔豉合涼膈方法。

山梔皮

豆豉

杏仁

黃芩



瓜蒌皮

枳實汁

郭 風濕入肺。氣不肯降。形寒內熱。胸痞。皆臍鬱。涼佐以微苦。手太陰主治。

黑山梔

香豉

杏仁

桑葉

瓜蒌皮

鬱金

風溫化燥熱

秦六 體質血虛。風溫上受。滋清不應。氣分燥也。議清其上。

石膏

生甘草

薄荷

桑葉

杏仁

連翹

又 照前方去連翹薄荷加陳蒌皮鬱金梔皮

某

風火上鬱耳後結核目眶痛。

少陽風火



風溫傷陰

薄荷

牛蒡子

前胡

象貝

連翹

黑梔皮

赤芍

生甘

某

風溫熱伏。更劫其陰。日輕夜重。煩擾不寧。

生地

阿膠

麥冬

白芍

炙草

蔗漿

馬五風溫熱灼之後。津液未復。陽明脈絡不旺。骨酸背楚。

治以和補。

生黃芪

鮮生地

北沙參

玉竹

麥冬

歸身

蜜丸

某

陰虛風溫。氣從左升。

桂枝湯加花粉杏仁。



風爲天之陽氣。溫乃化熱之邪。兩陽薰灼。生爲種種變幻情狀。不外手三陰爲病。數頭脹汗出。身熱咳嗽。必然並見。當與辛涼輕劑。清解爲先。大忌辛溫消散。劫燥清津。太陰無肅化之權。救逆則有蔗汁蘆根。玉竹門冬之類也。苦寒沉降。損傷胃口。陽明頓失循序之司。救逆則有復脈建中之類。大凡此症。驟變則爲瘧厥。緩變則爲虛勞。其主治之方。總以甘藥爲要。或兼寒或兼溫。在人通變可也。邵新甫



溫熱

肺溫邪入

某十二脈數暮熱頭痛腰疼口燥此屬溫邪

連翹

淡豆豉

淡黃芩

黑山梔

杏仁

桔梗

某

溫邪化熱肺痺喘急消渴胸滿便溺不爽肺與大腸

見症

淡黃芩

知母

鮮生地

阿膠

天冬

花粉

謝

積勞傷陽衛疎溫邪上受內入乎肺肺主周身之氣



南京中医药大学图书馆版权所有

氣窒不化外寒似戰慄其溫邪內鬱必從熱化今氣鬱
胸滿病邪在上大便瀉出稀水肺與大腸表裏相
由熱迫下泄耳用辛涼輕劑為穩

杏仁

桔梗

香豉

橘紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

藁

襖襖吸入溫邪釀為肺脹危症

蘆根

桃仁

苡仁

冬瓜子

施

久患虛損原寢食安舒自服陰柔臍補不但減食不

寐腕中常悶渴欲飲涼此口鼻吸入溫邪先干於肺候

補則邪愈熾氣機阻塞弱質不敢開泄援引輕揚肅上

