

三朝名醫方論



重訂駱龍吉內經拾遺方論卷之三

太醫

淮陰肖齋劉浴德

崇邑明羽朱練

林陵後學宗漢林儒校正

明

聖濟殿御醫

門人起前蔣弘業

全閣



洞泄第一 主風傷肝

生氣通天論曰春傷於風邪氣留連乃為洞泄。夫風屬木主風。風氣通於肝。肝受風傷邪氣留連於內。則木來尅土。故大泄若洞之出也。靈樞邪氣藏府病形曰腎脈小其為洞泄。此是水泄。與飧泄微有不同也。陰陽應象大論曰春傷於風夏生飧泄。靈樞論疾診尺亦云。夫朝曰飧夕食不化而米穀元出也。

家傳方

清中啟脾湯啟開也通也中即脾也脾虛洞泄肅清中宮開通脾氣湯者盪也去大病用之

大治脾胃虛弱食飲不思 愚加五味子止瀉如神

薏苡仁三錢 乾山藥錢半 白朮土炒 白茯苓去皮 貝母去心 陳皮

白扁豆姜汁浸片 白芍炮 枳實麸炒 甘草蜜炙

石水二鍾 姜三片 煎八分 食後服 泄加五味子九粒

局方 參苓白朮散 以方用人參以補脾白茯苓以參瀝白朮以勝瀝故特名焉散者散也去急病用之

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉

人參 去蘆 白朮 去皮 白朮 土炒 甘草 蜜炙 乾山藥 各二兩 薏苡仁

縮砂仁

蓮肉 去心 桔梗 炒各一兩 扁豆 姜汁浸炒一兩五錢

右為細末每服二錢紅棗湯調下瀉加五味子

李東垣 調中益氣湯 飲食勞倦兼以腸鳴瀉泄方用木香以調中人參以益氣

脾胃虛弱飲食減少腸鳴瀉泄

黃芪 蜜炙 人參 去蘆 甘草 蜜炙 蒼朮 米泔浸 升麻 蜜水 柴胡 蜜水 橘皮 各二分 木香 一分

右水二鍾煎八分食遠服

局方 和劑 胃苓湯 方用平胃散以安胃五苓散以止瀉故云二方合用偶方之製也

利水止瀉

蒼朮 油浸 陳皮 厚朴姜製 甘草 蜜炙 澤瀉 二錢 豬苓 赤茯苓

白朮 各一錢 肉桂 一錢 口渴者不用

右為粗末每服一兩水二鍾姜三片棗二枚炒鹽一捻煎八分食前溫服

此苓湯 方用小芩胡以清熱五苓散以止瀉故云



泄瀉身熱者用之

柴胡五錢

人參去蘆 黃芩

甘草各二錢

半夏地一錢

澤瀉二錢

猪苓

赤茯苓去皮

白朮各一錢

桂枝一錢

右為粗末每服一兩水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前溫服

用銀茶調服

如神

李東垣

升陽除溼湯

經曰溼勝則濡瀉自下而上者引而竭之宜升舉其陽則溼無不除矣內用防風羌活者何此風能勝溼之義也

蒼朮

一錢 神麴

半夏

益智子

羌活

防風

升麻

柴胡

澤瀉各五錢

陳皮

甘草

蜜炙 麥蘖各三錢

石水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分空心服

藥麴如胃寒腹鳴者加

通玄二八丹

能行能止故曰通玄二八丹藥二兩八黃連八兩也

此方如治積聚侵晨生薑湯服之即行如治瀉利飯後茶清服之即止

白芍

當歸

生地

烏梅

各五錢 黃連八兩

右各為細末用雄猪肚一個將藥末盛於肚內以線縫之用韭菜二斤鋪底面於甑內

蒸之候湯乾再添候蒸一日以藥熟為度將猪肚共藥用石杵搗爛為丸桐子大每服

七十九

內經拾遺方論卷之三



仙海上
方 梧桐濯足湯

泄瀉不止服諸藥罔效者用之煎湯浴足大有神效

梧桐葉不拘多少

右用水數十碗煎十數沸取出只浴兩足後跟其瀉即止若浴之近上大便反閉

痲瘧第二

主暑傷心

生氣通天論曰夏傷於暑秋為痲瘧陰陽應象大論曰夏傷於暑秋必痲瘧瘧論曰夏傷於暑秋必病瘧靈樞論疾診尺曰夏傷於暑秋生痲瘧夫暑者夏令也夏傷之不已即瘧秋復感風寒而為痲瘧必矣瘧亦作瘡瘡瘡也諺有之曰瘦似麻瘡是知瘧者瘧也瘧之為言瘧也如凌虐人之狀也金匱真言論曰夏暑汗不出者秋成風瘧馬玄臺曰精之在內者不可出而邪之在外者不能入彼秋病風瘧雖由冬不藏精而然亦由夏暑汗不出所致也

家傳方

解毒蒿苓湯解毒黃連解毒湯也蒿香蒿飲也苓五苓散也三方合用複方之製也此方乃先大父竹東公所製以解暑熱而內實者用之果是神效後見難經中正

義內亦合香蒿飲五苓散而用之馬玄臺稱賞不已可見理之在人心胞合有如此不佞用治瘧疾萬舉萬當因錄於此

黃連

黃芩

黃柏

山梔

去皮各一錢

澤瀉錢二猪苓

赤茯苓去皮

白朮土炒各八分

肉桂一分扁豆

厚朴製各九分香蒿三錢

右水二鍾生姜三片烏梅一個煎八分冷服

便宜方

柴平湯

方用小柴胡湯以散風寒平
胃散以消飲食故曰柴平

銀柴胡

二錢黃芩

金王人參

牛首

各一錢

甘草

陳皮二份

每斤銀六錢

半人

錢 少 著

右用水二鍾姜三片紅棗二枚煎八分未發先服發於午前煮陽壓氣服九分

八分白茯苓去皮七分發於午後煮陰歷血虛加當歸酒浸九分川芎一分

及午後此氣血兩虛上四味俱加食積加神麴炒八分麥芽炒七分山查一銖枳實

炒一錢

醫方考

二解湯

壺隱子曰夏傷於暑秋必痾瘕故用消滯麻黃以發之三解云者謂三藥能

之通
也解

澤瀉

柴胡

麻黃

各三錢

右水二鍾煎八分未發先溫服

方簡易

四獸飲

方用六君子湯健脾開胃此四獸所由名也飲者歡也

人參

去蘆白

水土不服

一 符

炙草

防皮

一

半夏

草藥

烏梅肉

生薑

紅棗錢

人

右以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹以水溼之慢火焙令香熟於草每月三日各一錢

濟世良方

八分未發之先連進數服

截瘧飲截斷也用良方

人參

常山各五錢

右二味同炒去常山不用止用人參以酒二鍾煎至八分露一宿空心溫服盧翊聖其

雙甲散

雙甲破結穿山甲直透所結之處瘧母用此以治之因名雙甲

雙甲

九肋者穿山甲蛤粉炒

三味分為細末每服三錢白湯調下

仁存方

倉廩湯

即人參敗毒外加陳倉米一撮因名倉廩湯

此方治瘧痢並行又治禁口如神

人參

白茯苓

川芎

甘草

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳殼等分炒各

石水一鍾半陳倉米一撮生姜三片薄荷少許同煎服如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩

玉龍丸

玉色白如玉也龍過處腥冷暑氣消散此丸大清暑瘧故假名之也丸者緩也不能速去之舒緩而治之也

半夏不拘多少生用

右為細末生姜自然汁丸桐子大每服三十丸於未發之先白湯下至重者無過三服



李東垣

枳實導滯丸枳實有推牆倒壁之功導滯引導謂先之也滯腸中之物也枳實能導滯故名

枳實如舊神麴各五錢 大黃一兩 白茯苓去皮 黃芩 黃連各三錢 澤瀉二錢 白朮三錢

右各為細末湯浸蒸餅丸桐子大每服五七十九食後白湯下

欬嗽第三 主溼傷肺

陰陽應相大論曰秋傷於溼冬生欬嗽靈樞論疾診尺亦云生氣通天論曰秋傷於溼上逆而欬夫溼本長夏之令侵過於秋肺受溼傷至冬坎水用事寒溼上逆而咳嗽生焉荷柏齋曰病機機要謂欬無痰而有聲肺氣傷而不清嗽無聲而有痰脾溼動而生痰欬嗽有聲有痰因肺氣動於脾溼欬而有嗽也竊謂此論欬嗽二症蓋倒說也肺為氣主而聲出焉肺傷寒飲鬱而為痰聲欲上出為痰所鬱故相攻而作聲痰出聲乃通利斯為之欬外感風寒肺管為寒氣所束聲出不利故亦相攻作聲然無物也斯謂之嗽欬字從亥亥者有形之物也故棗核草荻皆从亥復有隔閼之義嗽字从求从吹此古人制字之妙乃二證之所以分也

和劑金沸草散金沸草旋復花之別名也方用金沸草治冬生咳故特以名焉

咳嗽生痰宜行金沸草是也

旋復花錢 荊芥錢 麻黃去根 前胡各錢 赤芍

半夏湯炮 甘草炙各



右水二鍾姜三片紅棗二枚煎八分仍用細絹濾過服否則覆花草射肺反令人咳局
方有麻黃赤芍無細辛赤茯苓活人有細辛赤茯苓無麻黃赤芍但局方辛平活人辛溫
溫病第四 主寒傷腎

生氣通天論曰冬傷於寒春必溫病陰陽應象大論亦云靈樞論疾診尺曰冬傷於寒春
生痺熱夫寒者冬令也冬傷之不即發至春溫暖復感於寒變為溫病必矣熱論曰先夏
至日為病溫是也壯熱咽乾無咽乾者時行病耳

和劑
方

人參敗毒散經曰邪之所湊其氣必虛必使邪毒不能深入培其正氣敗其邪毒故云敗毒

冬時感寒偶不即發寒毒藏於肌膚至春變為溫病其証壯熱不惡風寒而渴

人參 白茯苓 川芎 甘草 羌活

獨活 前胡 柴胡 枳殼 桔梗各等分

右水一鍾半姜三片薄荷少許同煎溫服如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩溫病大抵
不宜發汗蓋以過時而發不在表也惟發散與正傷寒異其餘諸症悉與正傷寒同

傷寒第五 主夏月傷寒

刺志論曰氣盛身寒得之傷寒夫氣盛者脈氣盛也身寒者人身感於天地之風寒也夏
月得之是為傷寒不然何以長沙公曰脈盛身寒得之傷寒王太僕成聊攝威立人身之

劉河
澗

寒熱而言。以之論傷暑則當。以之論傷寒則非也。吾恐脉盛者。身必不寒。身寒者。脉必不盛。傷寒傷暑。對舉而互言之者。分別夏月寒暑無疑矣。熱論曰。後夏至日者。為病暑。壯熱咽乾。無咽乾者。時行病耳。

雙解散。夏病曰熱。方用防風通聖散煎熱調下。益元以雙解之也。

至夏變為暑病。暑病者。熱極重於溫也。此方主之。

防風

川芎

當歸

赤芍

薄荷

連翹

麻黃去節 大黃

芒硝各五 石膏

黃芩

桔梗各一錢

甘草 二錢 滑石 三錢

荊芥 山梔 白朮各二分

右為粗末。水二鍾。姜三片。葱白五寸。豆豉五十粒。先煎羣藥。次下大黃。末下芒硝。煎八分。去渣。調六一散。三錢。自利去硝黃。自汗去麻豉。葱姜。夏月熱病發散。與正傷寒異。其餘諸法。悉與正傷寒同。茲不復錄。

傷暑第六

主夏月傷暑

刺志論曰。氣虛身熱。得之傷暑。夫氣虛者。脉氣虛也。身熱者。人身感於天地之暑熱也。夏月得之。是為傷暑。不然。何以長沙公曰。脉虛身熱。得之傷暑。

家傳
解毒薤苓湯

治傷暑壯實者。用之如神。



北京中醫藥大學圖書館藏

選百二十味香薷飲藥用十味以香薷為君故以名焉

治傷暑虛弱者用之如神

香薷二錢 厚朴一錢製 白朮土炒 白茯苓去皮 陳皮各八分

黃芪炙七錢 人參去蘆六分 白扁豆九粒 甘草炙七錢 木瓜各五分

右水二鍾煎八分冷服

李東垣清暑益氣湯暑熱也肺主氣熱甚則氣泄如暑盛則金藏也故清暑必益氣內傷勞倦夏秋當服

黃芪減半 蒼朮汗少 升麻各一錢 人參去蘆 澤瀉

麥冬去心 當歸身 甘草炙各三分 葛根 黃柏酒洗各二分 五味子九粒 神麴炒 青皮去穰一分半

右水二鍾煎八分食遠溫服

御院桂林甘露飲桂之甘辛苓之甘淡入脾而行津液言渴熱之病飲之有如甘露也

清暑止渴

赤茯苓去澤瀉各一錢 白朮錢四 猪苓 肉桂各七分 滑石五錢 甘草炙一錢 寒水石二錢

右為細末每服三錢不拘時用熱湯或冷水調下入蜜少許亦可

生脈散暑傷於氣所以脈虛故方用人參以補肺氣麥門冬以清肺氣五味子以斂肺氣

人參去蘆一補一清一飲養氣之道畢矣名曰生脈者以脈得氣則充失氣則弱故以名之 麥門冬去心 五味子打碎



六一散

六一散者，乃用滑石六兩，甘草一兩，因數而名之也。不曰一六，而曰六一，乾下坤上，益陰陽交而泰之道也。一名天，水散天一，生地六成之，陰陽之義也。又名益元散，辰砂名辰砂，天積熱以益一元之氣也。亦名神白散，神白者，因其色白而神之也。若如碧色名碧玉散，加薄荷名雞蘇散，主治大率相同，但以迴避愚人之疑，侮其治一，胎熱症此神驗之仙藥也。惟孕婦不宜滑胎故也。若臨月服之，又能催生易產，故名滑石。

滑石 六兩 甘草 炙一兩

右為細末，每服三錢，蜜少許，溫水調下。無蜜亦得。日三服。欲冷飲者，新汲水調下。解利傷寒，煎葱白豆豉湯調下四錢。

傷風第七 主風先傷上體

太陰陽明論曰：傷於風者，上先受之。夫風陽邪也，人身之上，陽分也。以陽從陽，故傷於風者，上體先受之。以次而及於下。頭疼鼻塞，咳嗽聲重，是其候也。

和劑局方

參蘇飲 參人參、蘇蘇蘇也。邪之所奏，其氣必虛，故方用人參以止嗽，而蘇葉之用以解肌耳。

治感冒風邪，發熱頭疼，咳嗽聲重，涕唾稠粘。

人參 紫蘇 白茯苓 半夏 湯泡 七次 前胡 乾葛 各錢半

枳殼 麩炒 甘草 炙 陳皮 各一錢 桔梗 木香 各七

右水二鍾，姜三片，紅棗二枚，煎八分，溫服。



易簡方以氣感者。不用木香。

傷溼第八 主溼先傷下體

太陰陽明論曰。傷於溼者。下先受之。夫溼陰邪也。人身之下。陰分也。以陰從陰。故傷於溼者。下體先受之。以次而及於上矣。一身盡痛。是其候也。

經驗良方

一枝春 桂枝溫能解表。故曰一枝春。醫指有曰外溼宜表散。政此之謂。

一身盡痛。效若影響。

桂枝 薄荷 白芷 威靈仙 各四錢

右水一鍾。酒一鍾。煎八分。溫服。

寒熱第九 主露主風

生氣通天論曰。因於露風。乃生寒熱。脈要精微論曰。風成為寒熱。夫露陰邪也。風陽邪也。因於露。因於風。皆能令人寒熱往來。豈特風成為寒熱而已哉。太僕謂露體觸冒風邪。則非矣。况上文有無見霧露可証。

和局方

不換金正氣散 正氣之功。雖金不換也。一名正氣清肌飲。正氣。正不正之氣也。清肌。清肌表之熱也。在嘔吐門中。又名藿香安胃散。以藿香大能安胃也。

治四時不正之氣。及山嵐瘴氣。寒熱往來。并出遠方。不服水土。或吐或瀉。

蒼朮 油浸 陳皮 各五錢 厚朴 姜製 甘草 炙 藿香 各二錢 半夏 湯泡七次三錢



羅大

右水二鍾姜三片紅棗二枚煎八分溫服

太無神術散

谷氣通於脾故山谷之氣感則傷人脾羅大無用茅山蒼朮以理脾故稱神術

人受山嵐瘴氣憎寒壯熱一身盡痛此方主之

蒼朮

陳皮

厚朴

甘草

藿香

石菖蒲

右水二鍾姜三片紅棗二枚煎八分溫服

和劑局方

香蘇飲

方用香附以散寒蘇葉以除熱故名

治非時感冒寒熱往來

香附子

蘇葉二錢

陳皮一錢甘草五分

右水二鍾姜三片葱一根煎八分熱服頭痛加川芎白芷名芎芷香蘇散

和劑局方

芎蘇散

頭痛用川芎身熱用紫蘇以解表耳一名十味芎蘇散

治非時感冒發熱惡寒頭疼身痛

川芎二錢

蘇葉

枳殼炒桔梗

柴胡

半夏

湯泡七次

廣陳皮

白茯苓

去皮各一錢

乾葛

錢五

甘草

五分

醫家必用

諸葛解甲風

諸葛行師有解甲受風寒者用以治之故名一名發汗散夏月發汗用之如神

專治夏月感冒如神

麻黃

去根節綠豆連皮八兩



南京中醫藥大學圖書館藏

和劑
局方
十神湯

右為細末用無根水半茶鍾調服量強弱加減壯者錢半次者一錢十歲以下用五六分不用被蓋其汗立出

治時行瘟疫兩感風寒

川芎 甘草 升麻 麻黃 香附子 紫蘇 赤芍 白芷 陳皮

右水二鍾姜三片葱白一根煎八分溫服

生料五積散

生料者藥用生而不製也或曰陰寒待藥之急不暇炮炙也五積非五臟之積乃寒溼痰氣血五者之積也如麻黃桂枝甘草赤芍即麻黃桂枝各半湯以散積寒蒼朮陳皮厚朴甘草即平胃散以消積食陳皮半夏茯苓甘草即二陳湯以化積痰甘草桂枝半夏即七氣湯以消積氣川芎當歸即芎歸湯以行積血也

治內傷生冷外感風寒

蒼朮 桔梗 陳皮

麻黃 枳殼 厚朴

乾姜

白茯苓 白芷 川芎

當歸 甘草 半夏

赤芍

右作一服水二鍾姜三片葱白一根煎八分不拘時熱服冒寒加煨生姜挾氣加吳茱萸

黃婦人調經催產加艾醋同煎

寒熱第十 主風藏

風論曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則洒然寒閉



醫學
發明

小續命湯續命者言藥之功起死回生如斷而復續也言小則有大矣

則熱而悶。其寒也則衰飲食。其熱也則消肌肉。故使人怵慄而不能食。名曰寒熱。夫風氣藏於皮膚之間。內不得通之而入。外不得泄之而出。是風者。真善於行動。而數能變態者也。方其腠理開時。洒然而寒。及其腠理閉時。悶亂而熱。寒入於胃。故衰食飲。熱居於表。故消肌肉。寒熱交作。故使人怵慄。卒然振寒而不能食。名曰寒熱。

防風去蘆雨半防己

麻黃去根節杏仁去皮桂枝

甘草炙

黃芩 赤芍

川芎 人參去蘆雨附子炮去皮臍半兩

右作一服。水二鍾。姜一片。煎八分。溫服。然始中風時。不審六經之形症。加減用藥。雖治與不治。無異也。開則洒然寒。閉則熱而悶。知暴中風邪。宜先以加減小續命湯。隨症治之。加減方詳列於後。

中風無汗惡寒麻黃續命湯

麻黃 防風 杏仁

依本方加一倍。宜鍼太陽經至陰出血。崑崙舉蹠。

中風有汗惡風桂枝續命湯

桂枝 杏仁 赤芍



依本方加一倍。宜鍼風府。此二証。太陽經中風也。

中風身熱無汗不惡寒。命湯

石膏

知母各加二兩甘草依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風。命湯

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍。宜鍼陷谷。刺厲兌。針陷谷者。去陽明之賊也。刺厲兌者。瀉陽明之實也。

此二症。陽明經中風也。

中風無汗身涼。命湯

附子

加一倍乾姜加二兩甘草加三兩

宜鍼隱曰。去太陰之賊也。此一證。太陰經中風也。

中風有汗無熱。命湯

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍。宜鍼太谿。此一証。少陰經中風也。

無此四證。六經混淆。繫於少陽厥陰。或肢節攣痛。或麻木不仁。

羌活連翹續命湯



南京中醫藥大學圖書館藏