

卯 2
4642.

卷四

時方妙用下



時方妙用卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

血症

吐血

咳血

咯血

鼻衄

齒衄

血淋

血崩

男

元內道彪古愚
元畢道照靈石

全校字



北京中醫藥大學圖書館版權所

經曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血血之流溢半隨衝任而行
於經絡半散於脉外而充肌膚皮毛若外有所感內有所傷則血
不循經從上而湧則為吐血咳血咯血鼻衄齒衄舌衄從下而走
則為大便血溺血婦人血崩其源則一或問諸書皆分別五臟六
腑之血而施治茲何以籠統言之余曰五臟有血六腑無血觀剖
諸獸腹心下夾脊包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六

腑無血近時以吐血多者謂吐胃血皆耳食前醫之誤凡吐五臟
血必死若吐衄崩下皆是經絡散行之血也或問既無分別何金
匱以瀉心湯治心氣不足爲吐衄乎曰百病不離於五臟之臟腑
腑病以致血不循經而爲吐衄崩下非吐衄崩下之血從臟腑中
脫出也循經之經字作常字解時醫誤解謂歸脾湯引血於脾脾
能統血卽是升經害人無算余再爲之喝醒一語曰隨者仍其隨
之常行者仍其行之常散者仍其散之常充者仍其充之常血循
經常之道路則無吐衄崩下之病矣千古無一人談及余於高士
宗引而不發處細繹斯論人爲快事

身熱脈大者難治。身涼脈靜者易治。若喘咳急而上氣逆

脈見弦緊細數有熱不得卧者死。

一外感吐血先見頭痛惡寒發熱等症必取微汗則愈宜

香蘇飲加荆芥穗一錢丹皮白芍各一錢五分三一五

一夏令秋令感暑氣燥氣而吐血方治見咳嗽門不贅

一內經云不遠熱則熱至血溢血泄之病生矣凡人不避暑熱及

過食燥炙之物以致血熱妄行宜

四生丸日一

一瘀血而吐必先胸痛血色必紫或黑而成塊脈必滯澀宜

四物湯加醋炒大黃桃仁丹皮香附各一錢五分。如紫血盡

鮮血見即用六君子湯加當歸調之九出高鼓峯心注



北京中医药大学图书馆版权所有

一傷寒及溫病應發汗而不汗之內熱蓄血及鼻衄吐血不盡

餘瘀血大便秘面黃宜

犀角地黄湯九十九

一高鼓峯心法於血症獨精其云除瘀血與傷寒外其餘

情饑飽勞力等因必見惡心驗症分明一味固元湯手之方用人參

炙芪歸身甘草煨薑大棗白芍水煎服血症最繁以一方統治

胡念齋深服之。胡念齋云補藥可用溫藥亦須急加附桂炮

薑隨宜

一楊齋直指謂陽虛陰必走大吐大衄外有寒冷之狀可用理中

湯加南木香或甘草乾薑湯其效更著又有飲食傷胃胃虛不

能傳化其氣上逆亦能吐衄亦宜上二方。余用甘草

其乾薑炮黑加五味子二錢甚效從慎柔五書得來

一內經云血氣者喜溫而惡寒寒則泣而不流溫則消而去之

數語爲治血之要旨所以楊仁齋高鼓峯方法神驗卽張景岳

用熟地一兩澤瀉附子牛膝各一錢五分肉桂一錢炙甘草二

錢水煎服名爲鎮陰煎方雖駁雜而溫藥較多亦能奏效

一褚氏遺書云血雖陰類運之者其陽和平陽和二字指心肺而

言也心肺之陽宣布如日月一出燭火無光凡諸脉邪熱之氣

俱除血無所擾則循行常道矣運之者三字更妙血不自運必

藉氣以運之既已運矣則隨衝任而行於經絡散於脈外充於



皮。毛。有。經。常。之。道。可。行。何。至。妄。行。而。為。失。血。之。症。耶。諸。家。俱。贊。此。二。句。之。妙。絕。未。能。發。明。其。旨。甚。矣。醫。道。之。難。也。高。鼓。峯。雖。未。能。悟。到。此。旨。而。固。元。湯。與。之。暗。合。慎。柔。和。尚。以。保。元。陽。為。主。亦。不。過。取。黃。芪。補。氣。以。生。血。而。亦。與。此。旨。暗。合。合。之。則。效。速。一。公。所以。名。噪。一。時。也。余。於。此。千。慮。一。得。不。敢。自。秘。

保元湯

七 慎柔方無肉桂有煨薑三片黑棗三枚

當歸補血湯

六

一血症有不宜剛燥之劑者或血虛煩渴燥熱睡寤不寧五心煩熱宜

聖愈湯

八十



一舌上出血如孔鑽者煎香薷汁服外用槐花炒砂摻滿齒齦可摻之。齒斷血出用生竹茹四兩醋浸一宿含之。牙縫出血以紙紐蘸乾蟾酥少許於出血處按之立止。滿口齒血出枸杞子爲末煎湯漱之然後吞下根亦可。鼻衄用生茅花葉根一兩煎服。

已上症或統用

甘露飲

八十一

滋腎丸

九十一

一血淋尿血用苧麻根十枚水煎服又用海螵蛸乾地黃赤茯苓各等分爲末每服三錢以柏葉車前子煎湯下又用亂髮燒灰



中國醫藥大學圖書館版權所有

入麝香少許用米醋溫湯調下。如痛不可忍以藕汁蘿蔔汁白
蜜調下。又房勞傷小便尿血宜鹿角膠半兩沒藥另用油頭
髮繩各三錢爲末茅根汗打麵糊丸桐子大每服五十丸鹽湯
下。

一下血先便後血爲遠血用灶中黃土八錢甘草生地白朮熟附
子阿膠黃芩各一錢五分水煎服名黃土湯。下血先血後便
爲近血宜赤小豆三兩浸令出芽晒當歸一兩共爲末以漿水
服一錢五分日三服名赤小豆當歸散。二方俱出金匱
一大便下血不止諸藥不效者宜

濟生烏梅丸

六十丸



一皮膚血氣宜郁李仁去皮研二錢以鵝梨汁調下。又用人參白
焙乾入麝香少許溫酒調服立效。又用六味地黃湯加五苓一
錢。麥門冬。川續斷各二錢。

一諸竅出血。宜頭髮敗棕。陳蓮蓬各等分俱燒灰研。每服三錢。木
香湯下。

一婦人血崩。審其寒熱虛實。照已上諸方擇用。若脫血之頃。不省
人事。大汗不止者。宜參附湯。貧者以當歸補血湯加熟附子二
三錢。一百零五

一大吐大衄大崩之頃。血苦稍止。急用
獨參湯服。服後聽其熟睡。切勿驚醒。則陰血復生矣。

肝力如月

卷三

三



癲狂癰

癲者痴呆之狀。哭笑無時。語言無序。其人常靜。狂者罵詈
踈其人。常動。癰者忽然猝倒。無知口角流涎。手足抽掣。或
聲數刻。卽愈。愈後卽如平人。作止有間。斷所以名癰也。皆痰火
病而癰病多由胎中受驚。一觸而發也。治宜調中補花。馮東南不
必過求奇珍。

脈實者吉 沉細者凶

一前症屬於實痰實火者宜

滾痰丸

六十
三

一肝火之爲害。非泛常之樂所可療。時賢葉天士獨得其秘。急用



當歸薦蒼丸每服三十丸一日兩服不可遲疑敗事九上

一前症屬虛者宜

磁砂丸

二十
六

二加龍骨湯加鉛丹二錢或再加阿膠三錢二十

此二方神妙非可以思議及者

一前症既愈即宜以和平之劑收功宜

磁砂安神丸

二十
八



消渴

口渴不止爲上消。治以人參白虎湯。食入卽饑爲中消。治以調胃承氣湯。飲一溲一爲下消。治以腎氣丸。趙養葵大變其法。謂治消無分上中下。先以治腎爲急。以六味丸料一斤。入肉桂一兩五錢。于一兩水煎六七碗。恣意冷飲之。熟睡而渴如失矣。白虎承氣皆非所宜也。

喻嘉言曰。腎之省之關也。關門不開。則水無輪泄。而爲腫滿。關門不閉。則水無底止。而爲消渴。金匱腎氣丸。蒸動精水上承。君火而止其下入之陽光。彼症取其開。此症取其關。一開一關。具通天手。眼子和詆之。何其陋也。又白茯苓丸治腎消。方用白茯苓覆盆子。



中國醫藥大學圖書館版權所有

黃連括樓根革薺人參熟地黃元參各一兩石斛蛇床子各七錢
半。鷄脰脰三十具微炒共爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧
太每服三十九食前磁石湯送下。喻嘉言治驗加犀角一兩以
六味丸加犀角收功。按此與八味地黃丸一陰一陽相爲表裏
皆爲神方。

脈宜數大 忌虛小



傷食

傷食病必有胸悶吞酸。噯腐。腹脹。腹痛等症。宜以平胃散加麥芽。穀芽。山楂。神麴。蘿葡子消之。或以所傷之物燒灰加入爲引。如初傷時食尙在。隔服此湯以手探吐。如傷之已久。腹滿拒按。宜以三一承氣湯下之。愈後服香砂六君子湯加乾薑調養。若無吞酸噯腐等症。但見頭痛惡寒發熱。是外感症。切不可誤用消導之品。致外邪陷入。變症百出。傷寒不禁食。故桂枝湯啜粥。是開章第一。讀仲景書自明。西北之人一遇頭痛惡寒發熱之症。便云有食。卽服神麴。山楂等藥。往往誤事。余爲活人計。不得不大聲疾呼也。脹滑而實者。時書以右關之上爲氣口。謂氣口緊盛傷於食者。

妄也。

張景岳云。偶病之人。多有非食而疑食者。曰某曰曾食某物。或其肉某麵。其日卽病。醫者不論虛實。但聞此言。且見胃口不開。必先治食。夫未病之人。誰有不食。豈必預爲停食。以待病至者。抑可信其無食乎。及其病也。則或因勞倦。或因風寒。或因七情。病發不測。而且無脹。無滯。與食何干。藥不對病。而妄行剝削。必反增病。此斯道之莫須有也。由此推之。則凡無據無證。而妄行胡猜者。皆其類也。良可慨矣。

黃履素著折肱漫錄云。五穀皆養補脾氣之物。一煨成炭。反能消食者。何。蓋火能軟堅。化物燼從火化。故也。諸炭能消食。亦能傷脾。功用