

普濟本事方

儀真許

叔微述

○諸蟲飛尸鬼症

制諸蟲方

白蕪荑

檳榔 各一兩

右細末蒸餅圓如梧子大每服十五圓至二十圓温

湯下

制蟲解勞悅澤肌膚去勞熱方

檳榔 一兩半

龍膽 一兩

乾漆 燒令盡 半兩

右細末煉蜜圓如梧子大每服十圓至十五圓熱水

下有一作腦三字

下

治寸白蟲方

黑鉛灰抄四錢一服先喫猪肉脯少許一時來却用
 沙糖濃水半盞調灰五更服蟲盡下白粥將息一日
 良方療寸白用錫沙蕪篋栢者極佳予宣和中每
 覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是蟲漫依良方所說
 服翌日下蟲二條一長二尺五寸頭扁潤尾尖銳每
 寸作一節班班如錦紋一條皆寸斷矣千金謂勞則
 生熱熱則生蟲心蟲曰蛔脾蟲寸白腎蟲如寸截絲
 縷肝蟲如爛杏肺蟲如蠶五蟲皆能殺人惟肺蟲為

作曰

作飲

下有曰

急肺蟲居肺葉之內蝕入肺系故成瘵疾咯血聲喘
藥所不到治之為難有人說道臙中載諸蟲頭皆向
下行唯自初一至初五以前頭上行故用藥者多取
月朧以前蓋謂是也

良方療寸白蟲方

錫沙

作銀泥者無即以黃丹代油私如梧子大

蕪荑仁

檳榔

二物等分為末

右煎石榴根濃汁半升下散三錢圓五枚中夜服且

日取下

治飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸
者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪者聞哀

哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯雜常覺昏母發節氣致變輒成大惡皆宜用此方

忍冬葉剉數斛煮取濃汁稠煎之服如雞子大一枚日三太一神精丹蘇合香圓治此疾第一

因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成諸變動不已似冷似熱風氣觸則發雄朱散

雄黃飛水

朱砂飛水

桔梗炒

羌活去蘆

當歸洗去蘆薄切焙乾秤

升麻

川烏 皮尖

芍藥

犀角 金

龍齒 研

鬼箭 削取 炒

川芎 洗

白僵蚕 去絲 紫炒

陳皮 去白

山梔子 去皮

南星 炮

木香

虎脛骨 醋炙

紫蘇子 炒

薺草

枳殼 去穰 炒黃

白朮

黃芩 去皮 各一分

麻黃 半兩 去根節

蜈蚣 二條 去頭 足酒炙

栝榔 二箇

乾蠨 炒一分

右細末每服二錢酒調下日三服

頃在徽城日嘗修合神精丹一料庚申年予家一婦人

夢中見二蒼頭一在前一在後手中持一物前者云到

諸蟲殺尸鬼症

也未後者應云到也。擊一下爆然有聲。遂麗覺後心一
 點痛不可忍昏悶一時許。予忽憶神精丹有此一症。取
 三粒令服之。遂至府過廳少頃歸已無病矣。云服藥竟
 痛止神醒。今如常矣。日後相識稍有邪氣與一二服無
 不應驗。方在千金中。治中風之要藥。但近世少得。曾青
 磁石為難合爾。神精丹在千金方十二卷中

人平居無苦疾。忽如死。人身不動。搖默然不知人。目閉
 不能開口。嚥不能言。或微知人惡聞人聲。但如眩暈移
 時方寤。此由已汗過多。血少氣併於血。陽獨上而不下
 氣壅塞而不行。故身如死。氣過血還陰陽復通。故移時

散

白薇湯

白薇

當歸

洗去芦薄切焙
乾秤各一兩

人參

去芦
半兩

甘草

一分

右麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

倉公散

瓜蒂

藜蘆

雄黃

飛水

礬石

煨

右各等分細末少許吹入鼻中

畧

本草

卷二

諸症飛尸鬼疰

四

○腹脇疼痛

治男子兩脇疼痛枳實散

枳實 一兩 鞅 炒去穢

白芍藥 炒 黃

雀腦芎

人參 去芦各 半兩

右細末姜棗湯調下二錢酒亦得食前日三服

治脇肋下痛不美食葛根湯

葛根 半兩

桔梗 炒

防風 去 股 釵

白芍藥

甘艸 炙

訶子 去 核

川芎 洗

白朮

枳殼 各一兩 去 穢 炒 黃

右麩末每服四錢水一盞半姜棗同煎至七分去滓

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊急腰脚重滯
兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊脊攣急此藥
大治脇痛枳殼黃散

枳殼

去穰麩炒黃

細辛

去葉

桔梗

炒

防風

去釵股

川芎

各四兩

葛根

一兩半

甘艸

二兩炙

右鹿末每服四錢水一盞半姜三片煎至七分去滓

空心食前温服

治脇痛如前兼去手足枯悴スルツ蕞苾仁圓

薏苡仁

一两

石斛

用細者去根淨洗細剉三分

附子

半兩炮去皮臍

牛膝

酒浸水洗焙乾

生乾地黄

各三分

栝子仁

研

人參

去芦

枳殼

去穰麩炒黃

細辛

去葉

川芎

洗

當歸

洗去芦焙乾各半兩

甘艸

炙

右細末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓酒吞下空

心食前日三服圓子可食前煮散可食後相兼服為佳

治因驚傷肝腸骨裏疼痛不已桂枝散

枳殼

一两小者去穰麩炒黃

桂枝

去皮半兩不見火

右細末每服二錢姜棗湯調下

治脇下疼痛不可忍兼治脚弱芎葛湯

本草卷七

五

細辛 去葉

枳殼 去穢麩炒黃

人參 去芦

芍藥

麻黃 去節

防風 去各半兩

甘草 一分

右麤末每服五錢水二盞生姜三片同煎至七分去

滓温服日三服有汗避風

沉存中良方載頃在建康醫者王琪言諸氣唯膀胱氣
腸下痛最難治謂神保圖能治之熙寧中病項筋痛諸
醫皆作風治之數月不差乃流入背脊久之又注右臂
攣痛甚苦憶琪語有此一證乃合服之丁服而差再發

又一服差

神保圓

木香

胡椒 各二錢半

乾蠟 十箇 夫毒

巴豆 十箇 夫皮心研

右為細末湯釋蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服三粒

心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨姜煎湯下血痛

炒姜醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分

同研為散煎桑根白皮糯米飲調下三錢小喘止用

桑皮糯飲下腎氣脇下痛茴香酒下太便不通蜜湯

調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿

治脇下風氣作塊寒疝發作連小腹痛湊心其積屬肝
 在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思食止頭
 冷方

乾葛

兩下

川芎

洗

芍藥

甘草

炙

麻黃

三分
去節

防風

去
去釵

桂枝

不見火
去麁皮

當歸

洗去
焙乾各四錢

側子

一箇
去皮
臍

枳實

炒
去穢

羌活

洗
去
去

右鹿末每服四錢水一盞半姜三片同煎至七分去

滓通口服日三四服有汗避風

○雜病

雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康

成註云今醫方合五毒之藥用黃整置石膽丹砂雄

黃礬石磁石其中燒之三日三夜其烟上著以雞羽

取之以注創惡肉破骨則盡出楊大年嘗筆記其事

族人楊偶年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫如覆

甌肉潰出膿血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌年

不差人語之依鄭法製藥成注之瘡中少頃朽骨連

兩牙潰出遂愈後更安寧信古方攻病之速也黃整

即瓦合也

叛

州

獨同曲禮強有創別
有瘍則治有疾創飲
以疾止復初

血

隨人所食多少搗取汁搜麵作飢飢或作冷淘良久
 當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患劉禹錫傳
 信方正元十年通夏舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂
 作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸以來如蝦蟇
 狀無目足等微似有口蓋為此物所食自此頓愈麵
 中忌用鹽

唐陝州王及即中丞西路安撫使判官乘驛入駱谷及
 宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如瘡
 灰火至驛僵仆主驛吏云此病某曾患來須灸即差

所在二字馳下有

聰

用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷灸其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉後遂失胡瓜登驪而馳

服桑枝法桑枝一小升細切炒香以水三大升煎取二升一日服盡無時圖經云桑枝平不冷不熱可以常服療體中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣咳嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子政和間予嘗病兩臂痛服諸藥不効依此作數

刺臂痛即愈