

醫學準規
卷下

失血

吐血一症多由虛然必察其平日形狀或者外感風火逼出肺血與鼻紅相仿不得以吐血治之用霜菊等品清其肺火通其大便邪從下泄而血自止其餘虧症不一當分門別細戶心揣摩血在何經當用何經之藥如若病東藥西與症何涉總之以清涼法為主如有真陳阿膠代茶甚好又有火症用童便甚好又用白茅根煎茶更妙所最難者痰中夾紅似線一條此病已深入不能即愈矣初起之時忌用補法脈象以沉細爲吉洪大爲凶苔色要其清薄不宜紅絳又有一種交節氣而吐者爲重然而服藥外須保重最爲第一

旋覆花

三錢包煎

山茶花

二錢

川石斛

三錢

茯

苓三錢

杏

仁三錢

婁

皮三錢

原麥冬

三錢

去皮玄參

三錢

焦山枝

三錢

生桑皮

三錢

新會皮

三錢

引白茅根

一兩

此方失血初起皆因風火尅肺當用清輕之法不可補滯以致種根

生地四錢 左壯蠟四錢 山茶花三錢 茯苓三錢

丹皮錢五 懷藥三錢 大麥冬三錢 澤瀉二

新會皮三錢 白生芍二錢 引捲心竹葉廿片

此方補吐血月餘未止卽以補血養陰法主之

北沙參三錢 生白芍三錢 黑驢膠一錢冲 茯苓三錢

生壯蠟三錢 山茶花三 大麥冬三錢 生鰲甲四錢

生百合三錢 懷藥三錢 丹皮錢五 廣皮八分

引淡菜七枚

此方補陰清血熱照服一二帖症可以痊

生玉竹三錢 粉丹皮二錢 生白芍三錢 茯苓錢錢

澤瀉二錢 釵石斛三錢 原川貝二錢 山茶花二錢

淮牛膝 二錢

原麥冬 三錢

新會皮 錢五

引藕節 五個

此方主治吐血一二次清肺涼血爲主

肝氣

肝爲風木之臟在厥陰經症或由火盛以致肝木上升痛不可解必然大便燥烈苔色紅甚脈見弦大宜柔肝熄風爲主平時肝病略痛又有嘔惡狀此乃肝氣犯胃之故小便不能清長定見紅短木宜直不宜曲總以補血和肝爲主血不養肝風木無制症乃發矣有時木來尅土脾弱作瀉肝氣略差所以肝火過旺必以通便爲法此症女科十居其八男子十居其五總之少血爲患又有肝厥症四支拘急口不能言甚至不省人事爲痰食湧阻而成宜用燈心茶潤之又加金件爲妥牙環及兩手用熱手微搭之醒後用藥調理病勢最危如年至四十以外恐防不治宜格外小心爲妙又有肝塊在左脅下長如刀柄喜按者虛痛也俱按者實痛也

霜桑葉 三錢

生白芍 三錢

左牡蠣 四錢

甘菊花 三錢

丹皮二錢 婁仁四錢 茯苓三錢 澤瀉二錢

海螵蛸三錢 大麥冬三錢 引玫瑰花三朵

此方主治肝火大旺其大便不通可用此法

左金丸一錢 延胡索二錢 陽春砂六分冲 茯苓三錢

新會皮錢五 穀芽三錢 檀香末炒 製香附三錢

南木香七分 佩蘭二錢 川鬱金三錢 酒炒 瓦楞子四錢

綠梅萼錢五

此方肝痛不已用調氣和肝法

柴胡七分 歸身二錢 拌炒 甘菊花二錢 陽春砂壳錢五 生白芍二錢

石決明四錢 澤瀉二錢 茯苓三錢 丹皮二錢

烏賊骨三錢 大麥冬三錢 引玫瑰花三朵

此方統治肝氣之要藥

胃氣

肝氣與胃氣有別俗呼謂之肝胃氣非也肝痛居於左有塊似刀柄之長胃氣居與中間有塊似胡桃同樣如用手摸之痛者爲實不痛者爲虛就是喜按懼按之分肝氣犯胃木乘土位嘔惡非常無藥可進先用左金丸一二錢清茶送人俟氣略平方可進藥否則卽入卽吐有何益處擬方備後隨時酌用又有胃寒症可用姜汗溫中得効而不知肝氣犯胃之時如用熱治反爲不妥必須清涼以降胃熱方可看症要的用藥自確何至誤人性命左金丸者使金令左行之理與胃氣無涉肝喜酸胃喜甘兩不相合宜分別治之

淡吳黃三分
姜川連六分

拌炒

廣

鬱金

三錢

陽春砂

六分冲

茯

苓 三錢

丹

皮

錢半

煨牡

蠣

四錢

生白

芍

三錢

檀香末炒穀牙

三錢

五味子

十粒

廣

皮

一錢

海螵蛸 三錢 引玫瑰花 三朵

桂枝 三分 生白芍 二錢 拌炒 小茴香 五分 歸身 錢五 拌炒 煨石羔 三錢

茯苓 三錢 檀香末 炒穀芽 三錢 蔻 壳 錢五

仙半夏 錢半 川石斛 三錢 製香附 二錢 新會皮 錢半

引緣梅萼 錢半

以上兩方均係肝胃氣之通治

雲茯苓 四錢 雙鉤勾 二錢 西 珀 三分 冲 生白芍 二錢

炒棗仁 三錢 合歡皮 三錢 懷 藥 三錢 丹 皮 二錢

青龍齒 三錢 生牡蠣 四錢 澤 瀉 二錢 桔 絡 二錢

引燈心 一丸 金器 一事

此方主治肝厥當補血養肝為主

以上一方乃肝厥要方不可輕視其細也

嘔惡 (附吐噦)

嘔惡一症有虛實之分外感症作嘔有寒有熱見症施治又有內傷症因肝氣犯胃者或由酒濕或由痰湧皆不同也嘔者有聲無物只有一點黃水吐者有物無聲或因受風或由惡心噦者有聲有物各宜明晰此症勢不可當食入即嘔如肝胃氣先用左金丸一二錢開水送下如感症用地漿灌之如寒嘔姜茶亦可又有一種胃虛惡心在痢疾噤口每有此疾甚不易治也寒則溫之熱則涼之倘如氣逆用調氣之品大約肝病居多甚至手足發冷此是氣閉之故脈宜靜不宜浮躁備方參觀之可也

廣鬱金

三錢

白蔻仁

六分 沖

青炙甘

六分

枳

殼

三錢

姜川樸

一錢

製香附

二錢

新會皮

錢五

川水連

六分

范志曲

二錢

仙半夏

錢五

瓜蜚皮

三錢

引藕汁

一匙

荷葉蒂 三個

此方主治熱嘔與寒症有別另用純陽丸避瘟丹亦可治四時不正之氣

淡干王 六分

陳皮 錢五

白蔻仁 八分

姜川朴 一錢

姜半夏 二錢

清灸甘 六分

廣鬱金 三錢

茯苓 三錢

桂枝 五分
生白芍 錢五

拌炒

舶上茴 五分

引老姜 三片

陳米 一撮

此方主治寒嘔如肝氣犯胃作嘔方備肝氣門當另行設法以治嘔症亦有虛實之分不可夾雜

痰飲

痰飲一症均以爲肺病而不知腎水虧乏之故鍋底無火食入卽化爲痰日夜不少此是虛寒之體非溫中逐濕不可痰氣湧閉必致氣逆一年之中以四五六七八九幾個月爲好其餘十月起至三月爲止皆不佳總之逢熱則好逢寒則重正所謂大

虧症也半由用心太過思慮傷脾土衰不能生金所以有痰飲之症食物用聞姜桔餅等物溫中消痰之品頗合法治脉象必然浮滑苔色定見白膩與咳嗽症氣喘症參看

生意生

四錢

淡乾姜

六分

青炙甘

六分

茯

苓

三錢

淡附子

六分

旋覆花

三錢包煎

姜半夏

二錢

懷

藥三錢

代赭石

四錢

陳

皮

錢五

五味子

十粒

引白果

五粒

此方主治濕痰內伏氣體虛寒之症

旋覆花

三錢包煎

陳

皮

錢一

海蛤壳

四錢

代赭石三錢

生米仁

三錢

清炙甘

八分

茯

苓

三錢

懷

藥

三錢

北五味

十粒

姜半夏

二錢

白扁豆

三錢

引醃橄欖

二個

此方主治痰氣平常之體不至十分之寒宜用穩當之藥其餘燕汁等品均好此乃大虧之症如有別直參俱可試用

疫癘

時疫一症在夏秋之間居多此乃四時不正之氣感受而成上吐下瀉一時而至身帶微熱苔色厚膩脈象洪大身熱神昏似有鬼祟門前當燒大黃香辟之用藥以芳香之品爲最此症在自己抱患者無足論又有傍人探望病人每至纏染宜遠隔爲妥此乃熱邪從口鼻而入穢氣難聞也夏月天氣下降地氣上冲蒸悶不堪易得此症所謂爛腸瘟逼羅痧皆由於此治者不可不謹謹焉此症不比常病往往少見多怪每不及防容易失手感染者皆因氣馱不足乘隙而投如正氣足者可以無慮所以平日之間正心修身每日誦三聖經此爲正理爲人總以規矩兩字長存五內爲要

姜川朴

錢五

姜半夏

三錢

白寇仁

六分冲

藿

香 錢五

陳

皮

錢五

清炙甘

六分

茯

苓

三錢

淡附子

六分

木

香

八分

廣郁金

三錢

淡干姜

六分

引老姜

三片

此方主治時疫下瀉上吐四時不正之氣如純陽丸辟瘟丹均可參用如意油亦妥

別直參

一錢

淡干姜

六分

白蔻仁

六分冲

仙居木

一錢

淡附子

六分

青炙甘

六分

茯

苓

三錢

陳

皮

錢五

眞川朴

一錢

姜半夏

三錢

郁

金

三錢

引老姜

三片

此方主治氣散薄弱感受邪氣所以當扶正逐邪凡人受此外感正氣必虛溫中扶原乃是正理也

怔忡

(附健忘)

怔忡一症多屬於虛爲心肝腎三經虧乏所以心腎不交自言自語有時昏有時清似呆非呆心不能清皆因少血之故非補血養陰不可脈象宜見虛小不宜洪大消耗之藥在所不宜爲大虧之症擬方以補氣和血鎮心柔肝爲主此病多由用心過度而成服藥之外還須靜養爲吉健忘一症記心不好一物放在何處不能檢尋倘

有事件話過亦不能記得故爲之健忘也補心丸宜之兩症皆以補血藥爲正道食物須海參龍眼肉等均好蓮子心泡茶不時與之又有伏痰略用消痰之物如清鹽陳皮等物可吃又有一種真呆半由心錯半有火旺痰多之故宜清火消痰爲主如因風土而起者不治

辰砂三分
雲茯神四錢

拌

炒棗仁三錢

芡

實三錢

懷山藥三錢

遠志肉錢五

大麥冬三錢

沙苑子三錢

夜交藤三錢

新會皮錢五

兔絲子三錢

五味子十粒

引燈心一丸

金器一支

此方法主治心神恍惚當補益之爲安

熟地四錢

酸棗仁三錢

五味子十粒

茯神四錢

合歡皮三錢

煨磁石四錢

懷藥三錢

蒺藜子三錢

遠志肉

錢五

兔絲子

三錢

芡

實

三錢

益智仁

三錢

引桂圓肉

三枚

此方治心腎大虧怔忡健忘等症當補血鎮心之法以應之外用蓮子心
泡茶藕湯不時服之

黃疸

黃疸症者爲濕熱內伏所致便黃目黃手指甲黃此爲實據其人發木胃氣不動脈
象必見濡滯擬方以消食逐濕爲主此等症候在夏秋爲多食物以冬瓜湯與之與
腫脹似是而實非也形狀面浮足腫胸前氣閉小便不利大便不暢如有陳葫蘆壳
一二片代茶亦可擬方早服一二劑而眼中黃色漸退其症自可望痊苔色定然白
厚宜黃而鬆不宜厚滯四肢疲倦身重似難轉側用木瓜酒少許亦通治之法大忌
發渴

生意苳

四錢

茵

陳

二錢

製茅朮

二錢

帶皮苓

三錢

大腹皮 三錢 姜川朴 一錢 姜半夏 二錢 通 艸 錢五

新會皮 錢五 焦枝子 三錢 酒炒黃芩 二錢 滑 石 三錢

引六路通 三枚

此方爲濕熱內伏法當清熱逐濕爲主

大豆卷 三錢 陳 皮 錢五 焦山枝 三錢 枳 朮 三錢

生米仁 四錢 綿茵陳 二錢 苦杏仁 三錢 姜半夏 三錢

車前子 三錢 姜川朴 錢五 酒炒黃芩 二錢 通 草 錢五

引葫蘆壳 二片

此方清其濕熱前後兩方酌用加減俟便通而黃自退濕從下走矣

便血 (附腸風臟毒)

便血一症大有分別有濕熱下注有氣虛下陷兩途必以明晰爲妥如便血因濕熱

而成者必然先血後糞當用清熱逐濕之法如便血因氣虛所致必然先糞後血兩症不可誤治一係感症一係虧症虧症者真陰不足當用滋補之法不必用逐濕之品反害陰氣感症如用滋陰之法其濕愈重而治法大爲不合又有一種爲之腸風爲之臟毒皆係濕熱不清之故以感症之藥治之自能有效血者火也虛火實火當分別治理便血之後其人氣骸不足近似虛寒非真寒而實爲虛象也

焦枝子

三錢

生意仁

三錢

新會皮

錢半

茯苓

三錢

地榆炭

二錢

糯米皮

三錢

酒炒黃芩

二錢

銀花

三錢

佩蘭

二錢

槐末

三錢

元參

三錢

引藕節

二個

此方治濕熱不清先血後糞之症與虛症有別擬方列後

大生地

四錢

牡丹皮

二錢

檉白皮

三錢

茯苓

三錢

澤瀉

二錢

地榆

二錢

生白芍

三錢

大麥冬

三錢

槐

末三錢

生鼈甲四錢

歸

鬚三錢

清炙甘草六分

引玫瑰花三朵沖

此方主治虛症便紅當補血養陰爲治如遇濕熱症不能通治宜分別清楚倘感症而用補法其症加重難愈

痔漏

痔漏一症其致病之由不一有濕熱有陰虧俗名爲偷糞老鼠有外痔有內痔外痔者現在肛門外有大有小內痔者生在肛門之側或左或右不定有所謂蒲桃痔者其形相似本屬外症而不知病從內出必以服藥調治爲妥有掛礮而落者是爲硬功與內科無涉也用槐花煎湯燻洗亦是一法又用陳松花撲之亦屬收燥之一法陰虧症爲氣體不足不得用逐濕之藥濕熱爲外邪不得用滋潤之藥反添其濕兩症參考自然程途各判治法如初發之時宜清熱敗毒之藥出毒後漸小可用滋陰之品不可於初發之時而反用滋補之品所謂火上加油無益而有損也外用臟連