



嵩崖尊生書卷之十二

嵩高景日珍
岳生堂纂著

○皮膚分

麻木病

麻非癢非痛肌肉之內。如千萬小虫亂行。或遍身淫淫如虫行。甚至如虫行有聲之狀。按之不止。搔之愈甚。有如麻之亂。木不癢不痛。自己肌肉如他人肌肉。按之不知。搔之不覺。有如木之厚。

麻木皆有久暫。暫時雖因氣血不足。未足爲病。用重劑反損真元。惟經年累月。無一日不麻。必內氣虛甚。風痰之痰本不能作麻。爲風所瞋。如波浪沸騰而起。陰陽失運行之病。

得不麻。傷寒論曰：身如虫行，汗多亡陽也。則知氣虛是本，風痰是標。先以生薑爲嚮導，枳殼開氣，半夏逐痰，防風羌活散風，木通牙皂通經絡，又僵蚕治如虫行之聖藥。在手臂用桑條，在股足加牛膝，待病減，用補中益氣，多加參芪。若經年累月無一日不木，乃死血凝滯于內外，挾風寒，陽氣虛敗，不能運動，用附子肉桂嚮導，烏藥木香行氣，當歸桃仁紅花阿膠活血，木通牙皂川甲通經絡，待病減，用八物補氣血，無不驗者。

麻木備用諸方

渾身麻木，目縮或昏或熱

黃芪

二錢

人參

白芍

各三錢

炙草

三錢 蔓荊 二分 陳皮 五分 六服効 小便澀 加澤瀉 五分

如大熱 加酒栢 三分 麻木則不可加再 加黃芪 一錢 如麻木

重甚 加芍藥 木通 各一錢 服縮 去芍藥

芍藥補氣湯

皮膚間有麻木 是肺氣 黃芪 二錢 白芍 三錢 陳皮 二錢 澤瀉 一錢

炙草 二錢

人參益氣湯

暑天手麻木 是熱傷 黃芪 八分 人參 生甘草 各五分 炙甘草 二分

五味子 十二個 升麻 二分 柴胡 三分 白芍 三分 空心服 少臥摩

麻木處 午前又一服 第二次 黃芪 四錢 紅花 三分 陳皮 五分

第二服

澤瀉 二分 亦日二服 第三次 黃芪 三錢 黃栢 六分 陳皮 一錢

第三服

澤瀉 升麻 各一錢 白芍 二錢 生甘草 二錢 生芩 四錢 炙草 半錢

除溼補氣湯

清陽補氣湯

續斷丸

黃芪酒

五味子 五十個

水煎稍熱服

左腿麻木沉重

黃芪 二錢

甘草 一錢

五味子 三十個

升麻 一錢半

當歸 柴胡

澤瀉 各五分

紅花 六分

陳皮 二分半

青皮 一錢

水煎熱服

體倦麻木食汗善饑舌強聲啞身重

蒼朮 一錢 藜蘆 五分 升

麻一錢

柴胡 八分

五味 四分

黃柏 八分

知母 五分

陳皮 六分

甘草

五分 當歸

五分 黃芪

八分

四肢腫肌肉麻

續斷

當歸

草薢

附子

防風

天

各五錢

乳香

沒藥

各二錢 川芎 三錢

蜜丸酒下

痺病甚者

黃芪

獨活

防風

細辛

牛膝

川芎

各

炮附 炙草

川椒

炒出汗 各一兩

川烏

炮山黃

秦艽

乾葛

各七錢

官桂

當歸

各八錢

大黃

三錢四分

白朮

炮薑

各五錢

浸酒

日夜服三次

〔虛〕

加

肉苁蓉

〔下利〕

加

女萎

〔多忘〕

加

石斛

菖蒲

八仙湯

渾身麻木

當歸

一錢

茯苓

一錢

川芎

熟地

陳皮

半夏

羌活

各七錢

白芍

八分

人參

秦艽

牛膝

各六分

白朮

四錢

桂枝

枝

三分

柴胡

四分

防風

五分

炙草

四分

五積散亦可

補中益氣湯

十肢面目皆麻

補中益氣湯

加

木香

炮附

麥冬

羌活

防風

烏藥

止麻消痰飲

口舌麻木吐涎或身麻有痰

黃連

半夏

瓜蒌仁

黃芩

黃芩

散帶湯

隔湯經湯

茯苓 桔梗 枳殼 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草

血虛加當歸 氣虛加人參

瘀血麻木 四物湯加桃仁 紅花 韭汁

身麻木生疔瘡 防風 荊芥各四分 羌活 獨活 連翹 當歸

歸 生地 蒼朮 檳榔 玄參 牛旁 忍冬各五分 升麻

防已各五分 赤芍 陳皮 草薢各一錢 半夏 茯苓 痰黎

各八分 烏藥 牛膝各七分 木瓜六分 木香三分 黃連四分 葛根

煎熱服取汁 初服加麻黃一錢 二三服加當歸四五服加

酒大黃一錢 五服愈

因氣麻木 紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎 羌活各八分

蒼朮

南星

半夏

當歸

各入分

桂枝

甘草

各四分

痺病論

痺閉而不通也。或遍身或四肢拘攣而痛。有不痛者。病久入深也。初因元精內虛。外為風寒溼。三氣所襲。不能隨時祛散。久則成痺。風氣勝者為行痺。古稱走注。今名流火。脈浮寒氣勝者為痛痺。世稱痛風。及曰虎歷節風。脈澁溼氣勝者為著痺。即麻木脈沉緩。三痺各有所勝。如此治藥。以勝者為主要。知二氣襍合成病。不可舉一廢二。忌收斂。宜辛飲。行氣開痺。飲羌活川芎防風蒼朮秦艽紅花肉桂細辛續斷風勝倍風藥。寒溼偏勝酌倍之。在上加片姜黃桂枝威靈。在下牛膝防已。

行氣開痺飲

草薢木通又有五痺筋屈不伸爲筋痺前方加木瓜柴胡
血凝不流爲脉痺前方加葛蒲伏神當歸肌多不仁爲
肉痺前方加白茯苓陳皮木香砂仁遇寒皮急遇熱皮縱
爲皮痺前方加紫苑杏仁麻黃重滯不舉爲骨痺前方加
獨活澤瀉治痺不外乎此

○流注病論

或結塊或漫腫或生于四肢關節或流于胸腹腰臀皆因憂思
忿怒虧損肝脾腠理不密外邪因而客之或淫痰流注或跌
蹶血滯而成婦人則產後勞役復傷氣血以致營衛不從逆
于肉裏或產後惡露不盡氣注血凝皆氣血虛損之病若氣

血充實經絡通暢決無此患。急用葱搗爛炒熱貼患處。冷則易。此外補陽氣運散寒滯之法。內用益氣養榮湯。入物加黃芪貝母桔梗陳皮香附。或方脈流氣飲。一陳加蘇葉黃芪青皮當歸川芎芍藥烏藥桔梗防風枳實木香大腹子。則未成自消。已成自潰。又須審其見症。畏寒陽虛。十全大補。陽熱內熱。陰虛四物。加參朮作嘔。胃虛六君。加炮姜。食少體倦脾虛。補中益氣。加茯苓半夏。四肢逆冷。小便數。命門衰。八味丸。小便數。作渴。腎水虧。六味丸。若不補氣血。不節飲食。不慎起居。不戒七情。或用寒涼。劫伐多。至不治。

結核病論

遍身皆有肉裏皮外有如榛如豆。癰腫有形者有結于肉裏其色不變者有形于肢節累累如貫珠者有大按則痛久不愈或服消尅之劑不按自痛者其症皆起于鬱怒。虧損肝脾或暴怒觸動肝火婦人胎產經多氣于調養形傷則痛氣傷則腫。慎不可輕用行氣破血之劑。

結于項側耳前後胸肋腫痛肝脾少血火燥脉浮大而瀉滋腎養肝益元六味丸加味逍遙參用。

結于喉間肝脾鬱結歸脾加半夏山梔升麻紫蘇。

結于腹內小腹內結塊作痛非肝脾氣滯即虧損脉雖洪數弦緊亦作真氣虛邪氣實証只于補中益氣六味加味逍遙三

方治之

時消時作氣滯痰結歸脾六君子調和肺脾之氣自愈

潰而核不收或肉不生五臟皆虛但用補中益氣六君子調補脾胃以滋諸臟各症自退

血風病論

遍身疙瘩或如丹毒痒痛不常搔破成瘡名血風瘡此症皆肝脾肺三經風熱或鬱久血燥所致內症則小便不調夜熱內熱或往來寒熱自汗盜汗婦人則月經失常斷不可常用風藥治外復傷陰血須審治之

單熱作瘡肝經風熱血燥當歸飲四物加刺蒺藜黃芪防風荆

芥首烏甘草外加柴胡山梔勾藤

寒熱作痛肝脾鬱火小柴胡加山梔黃連

疙瘩搔癢肺經風熱宜清熱消風與參防風荆芥連翹沙參玄

參紫蘇

體倦食少口乾潮熱肝脾鬱火傷血加味逍遙散

夜熱作渴血分有熱小柴胡合四物

○癰疹病論

癰疹皆熱毒熱則傷血血熱不散傳于皮膚有色點無顆粒狀

如錦紋曰癰點小有顆粒曰疹

傷寒發癰胃熱也

吐瀉發痧由胃虛無根之火遊行于外此症不妨但可補不可瀉可溫不可涼

陰症發痧伏寒在下逼其無根失守之火聚于胸中上熱薰肺而發痧用調中湯溫胃羌活白芷麻黃桂枝藿香蒼朮川芎桔梗芍藥陳皮半夏枳殼砂仁甘草生薑

內傷寒物亦發痧暑月得之先因傷暑次食寒物並居涼處內外皆寒逼暑火于外而爲痧亦用調中湯

風疹經云汗出見溼乃生瘡癬汗出則虛矣露臥見風沐浴見溼使人身振寒熱致生風疹勿謂治風調中湯最穩

一方治癰疹浮腫焙乾牛旁酒炒晒乾蠶蚕各一兩爲末每服

二民病篇 周身部 皮膚分 瘡疹 遊風

二錢薄荷湯下。

○赤白遊風病論

肢體或腿臂腕間患痞癰。或赤暈如霞。遊走不定。瘙癢赤曰赤遊。白曰白遊。白屬氣。赤屬血。得風則遊行。或因肝經血燥生風。或怒火內動肝風。或脾經鬱結血虛生熱。風邪因而外襲。治法不宜祛風。風藥燥血。血隨火化。反成敗症。加味逍遙散最妙。脾經鬱熱。加味歸脾湯。肺熱內熱。六味丸。五味子。浮萍最利此症。宜加入。將鹿膠頓鎔塗之。立愈。

○遍身搔癢症

凡瘡皆屬虛氣。虛午前癢。血虛午後癢。遍身搔癢。大約肺家血

虛火盛而生風不可誤服風藥四物加二冬桑枝蠟蛻僵蚕

牛旁刺蒺藜威靈仙外用蒼耳葉地膚子浮萍湯浴

血虛作痒

四物湯

加

黃芩

調

浮萍末

諸痒如虫行

是血虛

四物湯大料服之

風寒積聚癢疹癰痒

茯苓

川芎

羌活

人參

荆芥

防風

藿香

甘草

蟬退

僵蚕

厚朴

陳皮

茶酒

煎服

○皮膚病

皮膚痛手不敢按

桑白

錢

乾葛

柴胡

枳殼

各一錢

玄參

錢

地膚子

麥冬

各一錢

甘草

木通

各四分

薑蔥

煎服取微汗

皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓

真酥油合煉一處每日空心熱

酒調服三匙

遍身青紫斑點色若葡萄

苦參湯

初起

羚羊角

防風

麥冬

玄參

知母

黃芩

牛蒡

各入

甘草二分

○癰疽

癰疽疔毒常如草刺

苦參

四兩

苘蒲

二兩

水五瓢煎數滾添

水二瓢蓋片時臨洗和入公猪胆汁四五枚洗之三次全愈。