

痘疹心法卷六

陽湖 段希孟 齊賢

收膿証治歌括 凡一十七首

膿窠結就正鮮肥瘡頂微焦欲膿時漸次乾收無急慢

痂皮圓淨轉春暉

痘瘡成膿之後鮮明肥澤飽滿堅實以手拭之瘡頭

微焦硬者此欲膿也大小先後以漸收膿不失太急

不失太緩已膿者痂壳周圓無有突凸陷凹者乾淨



無淫濕破濺者此爲正曆否極泰來之象也

收曆如將日數拘幾曾算得不差殊但憑本痘分疎密更向其人論實虛

世俗謂幾日發熱幾日出形幾日起發幾日作漿幾日收曆此大畧之言耳痘有疎密毒有微甚人有虛實豈可一切拘以日數如瘡本疎者其毒微甚其人中氣實又能食自然易出易曆固不待於旬中者如瘡本密者其毒甚其人中氣實又能食營衛調和內外



無諸傷犯至十二三日可以刻期收齯也若其人中氣虛食少或內外有傷犯或遇氣候乖變因而難齯豈可必拘以日數哉

痘瘡收齯已無邪不疾不徐乃更佳太疾却防餘毒壅太遲潰爛不成痂

凡痘瘡收齯之時毒邪已解只要先後有次疾徐得中如收太急者毒邪未盡煎熬津液以致速枯必爲目病爲癰毒爲諸怪疾甚至橫夭宜微利之以徹其



毒當歸丸主之 一百如收太遲者中氣已虛脾胃太

弱不能榮養肌肉使之完就以致潰爛內服十全大

補湯

三十

外用敗草散

八十

襯之

當收不收瘡潰爛內外審候是何變以法求之要著癩

癩不得成爲倒曆

痘瘡過期不收遍身潰爛者此與斑爛不同乃熟太
過也其候不同或因天寒失於蓋覆使瘡受凍而不

收者宜內服五積散

八十

外用乳香燒煙於被內薰



之或因天熱過求溫煖使瘡被蒸而不收者宜內服

人參白虎湯

二十一
四

或五苓散

二十一
八

外減去衣被令少

清涼以天水散

九
四

撲之或大便閉結內外極熱毒

氣散漫無陽氣以歛之而不收者宜內服宣風散

九
十

二或三黃丸

八
四

順清涼飲

二十一
七

外用膽導法

五
一

以敗草散襯之

八
十

或泄瀉氣虛脾胃弱津液少肌

肉虛而不收者宜內服陳氏木香散

二十一
五

外用敗草

散

八十

或因渴飲冷水過多以致水漬脾胃濕淫肌

肉而不收者內服五苓散二十如因食少氣虛而不

收者人參白朮散

二十
三

去葛根加官桂主之以上諸

証以法治之已潰者結薄痂方爲佳兆若痂皮俱不
結者成倒蹙矣

遍身潰爛少完膚膿血淋漓勢已痛坐卧不能惟用襯
瘢痕欲滅却宜敷

痘已成膿之後過期不蹙以致潰爛膿汁淋漓不可
著席黏惹疼痛者用敗草散八十或蕎麥粉一百二
十三

盛以絹袋於身體上撲之更多佈席上襯臥尤佳而
上欲不成瘢點者用滅瘢散七十和百花膏九十一敷
之

但到收時膿自乾收藏斂束貴周圓莫教潰爛痴皮嫩
至此還將倒麝看

痘子初出磊落成箇後來長大作膿始相連串外雖
相串皮下猶一箇是一箇至於結痂腫消膿乾現出
初來本形所以收藏斂束要完全堅厚復成箇數爲



貴或根脚相通皮肉盡串者結痂之時亦要乾淨無
有淫濕及濺破者次也若未成痂者潰爛已成痂者
只是嫩皮此倒曆也

收曆原來貴整齊臭腥潰爛事生疑過期見此還爲順
未及收時作逆推

痘瘡收曆圓淨堅厚如螺曆者上也頭穿膿出堆聚
成痴如雞矢者次也皮破膿出痴薄如紙者又其次
也皮爛膿不成痴膿汁腥臭者斯爲下矣如已過期



譬如瓜葉熟久則爛此造化之常還作順看若未及期則爲斑爛乃逆候也變倒麝而死

倒麝誰知毒入裏死中求活治得理便閉腹脹急下之
自利得平如手取

痘毒當麝不麝復入於裏者謂之倒麝此死証元氣素怯又不食常自利者陳氏木香散二十一異功散二十二

死中求活聖藥也如原氣泄瀉大便久泄今添腹脹喘呼此毒盛薄蝕元氣復入於裏宜急下之排毒



散一百二
若不急下則腸胃不通營衛不行益加喘

十二

滿躁悶而死矣若毒入裏忽然自利者此人脾胃素
強毒氣難留故自利須看利下之物如利癥皮膿血
者毒氣得出爲順不可止之待利盡膿血自愈如利
水穀者此毒氣反驅水穀脾虛不能制之其証爲逆
不可治也

便堅能食得爲良

原瘡潰爛復成瘡痘出重重漸作漿此候未會成倒齷



如痘瘡破損潰爛者復腫灌作瘡不致乾枯原無痘瘡處復出一層如初出之狀亦漸起發作膿者此裏氣充實毒不得入猶在於表未成倒醫逆中之順証也但瘡子重出一番必其人能食大便堅實以勝其再作之毒如食少大便潤者用十全大補湯三十八參白朮散二十相間服之自利者用陳氏木香散二五異功散二十六白荳蔻丸四十主之蓋病久氣虛惟利溫補不可再解毒也



曆時表解裏當和忽爾通腸洩奈何不是裏虛元氣脫必然倒曆毒邪多

痘子初出以來表裏俱病收曆之時表邪已解裏氣當和大便宜潤小便宜清忽爾洞泄水穀者此中氣

暴虛不能禁固水穀或毒氣乘虛入裏欲作倒曆宜

用陳氏木香散

二十異功散

一二十

肉荳蔻丸

四十主

之利止者佳利不止者陽脫而死

潰瘍最毒面居先陽毒從陽心火炎能食便調無別苦



可投良劑保傷殘

痘瘡潰爛先傷於面者面乃諸陽之會痘乃純陽之
毒以類相從如水就濕火就燥也又心之華在面諸
瘡皆屬於心心火上炎之象如面瘡已破腫消目開
者此不著痂先已乾燥病爲倒曆死在旦夕如已破
復灌滿面成餅焦裂濺起膿血淋漓食穀則嘔飲水
則嗰啞唾黏涎語音啞戛口中氣臭者此臟腑敗壞
故諸証盡見也淹延悶絕而死如瘡潰腫飲食無阻



大小便調更無他苦如上証者此則可治內用十全

大補湯

三十升

陽解毒湯

一百二十四

相間服之外用滅

癥救苦散

八十

百花膏

九十八

合而敷之

陰陽界限在人中任督分來上下通宜向此間漸收麌

陰陽相濟得和同

人中爲任督交會之衢督乃陽脈自人中而上任乃

陰脈自人中而下故自準頭至印堂與頰至鳩尾相

應印堂至髮際與鳩尾至膝相應髮際以上與膝以



下相應痘瘡收齷但觀面上收到之處則知身上政
到之處矣凡痘子自人中上下左右先出先齷者吉
陰陽變合相濟之理也若是額角先齷者孤陽不生
足下先齷者獨陰不長皆凶兆也

陰陽相濟得相成陰寡陽孤勢不行不信但觀頭與足
痘瘡難醫理分明

造化之理生於陽者陰成之生於陰者陽成之凡痘
瘡收齷頭自髮際以上陽氣獨盛謂之孤陽足自膝

以下陰氣所聚謂之獨陰所以諸瘡皆屬之後此二處難屬乃造化自然之理不可作倒屬論

曾因傷犯灌成瘡待到收時不歛漿膿汁淋漓多痛楚

急宜治療免殘傷

痘瘡結膿窠之先或曾傷犯破損者灌爛成瘡至於收屬此獨不屬膿汁不乾更多痛楚若不急治漸成瘡蝕瘡損骨傷筋以致橫夭宜內服十全大補湯十三

八外用滅癧散七十和百花膏九十一敷之

幾箇頑瘡不肯收無時痛楚血常流此成疳蝕難調理
日久堪嗟一命休

痘子已成疳蝕瘡者若在肢節及諸虛怯軟弱血氣
俱少之處色青紫黑腫痛潰爛以漸延開血自出者

難治若所生之處在於陽分不痛不爛色不變血不

出者以綿繭散主之

一百二

一向渾身只煖溫忽加煩熱減精神乾漿焦膚宜如是

只怕生來內外因

