

雜證

外科之治法。竝藥方。業已和盤托出。尙有雜證。亦藥到病療。萬無一失者。盡錄於左。

調經種子方

當歸身。川芎。吳茱萸。各一錢。熟地。香附。各一錢五分。白芍。茯苓。丹皮。各八分。延胡索。廣陳皮。各七分。若經水先期者。必色紫。加條芩八分。過期者。必色淡。加官桂。乾薑。熟艾。各五分。不論先期落後。每服加生薑三片。水一碗半。煎八分。俟經水至。日空心服。起渣再煎。臨臥服。一日一劑。服至經止。兩三日交接。卽孕。經期準而不孕者。照後方服。四劑下期再服。而孕。續斷沙。蔓。杜仲。當

歸益母各二錢。川芎一錢。砂仁炒研五分。香附二錢。橘紅一錢。紅花三分。凡痛經不受胎者。取丹蘗曬乾磨粉。日以二錢溫陳酒送服。兩月內卽孕。無有不靈。

求嗣得嗣法

昔褚澄言男精洩於先而女精後至。則陰裏陽主男孕。如女精洩於先而男精後至。則陽裏陰主女孕。又言月信初盡其濁氣未清而交接。卽女務待經止兩足日。則女體虛而濁氣盡。再男入保養月餘。陽勝於陰。定成男孕。又論子宮左右。如男精洩於婦人之左。生男。右則生女。此男清女濁。男左女右。陽壯陰衰之至論也。凡疾風暴雨。或醉飽。或服春藥而受胎者。多天必俟天。

氣晴明。日暖風和。明星朗月。而受胎者多富貴。儻時令不正。或迷霧氣怒。而受胎者多愚蠢貧賤。或雷電之後。而受胎者。定生怪狀一物。凡求嗣者。須知。

黎洞凡

牛黃。冰片。各二錢。阿魏。雄黃。各一兩。大黃。乳香。沒藥。兒茶。天竺黃。蔓三七。血竭。各二兩。山羊血。五錢。前藥各爲末。取山羊血拌曬乾。再磨爲末。加藤黃二兩。隔湯煎十餘滾。去淨浮膩。入末爲丸。如芡實大。儻藥乾少。加熟蜜可也。凡宜陰乾。以黃蠟包裹珍藏。臨用。破蠟。取丸。陳酒化服。專治腫毒。跌打危重之證。內服外敷。皆效。

祛風逐溼散

番木鱉甲尾各精製淨末二兩。川附一兩。共爲末。專治手足不仁。骨節麻木。每服七分。用好陳酒五鼓送下。醉蓋取汗。服至痛處更痛。麻處更麻。頭眩背汗。昏沉四五刻卽定。定則全瘉。如服後不覺痛麻。必要日服。至知覺方止。

化痞膏

凡患痞癖之處。肌膚定無毫毛。須看準以筆圈記。用香油一片。密陀僧六兩。阿魏五錢。羌活一兩。水紅花子。麝香各三錢。熬膏退火攤貼。近起一膏可消。年久兩張而瘉。內服尅堅酒。用水紅花子研末三錢。浸火酒二斤。時刻呷。至瘉乃止。

三日大瘡方

瘡未至之先用陽和解凝膏。布攤貼背心。用常山。雲苓。官桂。甘草。檳榔。各三錢。小黑豆四十九粒。酒水各二碗。煎至二碗。當晚先服一碗。蓋暖而睡。畱一碗。次日約瘡至兩箇時。前頓熱服。蓋暖臥。待瘡至。瘡至亦輕。亦有當日而癒。瘡後忌房事。戒食生冷。勞碌。風霜。忌食鷄羊牛肉。雞子。鴨卵。白藕。豆。半月永截不發。

愈瘡棗

紅棗三斤。豬板油一斤。陳酒三斤。共入沙鍋內煮乾。加水三斤。煮至一半。不時取食。食完瘡癒。如暑天。分作五六次煮食。

黃疸立效方

凡患黃疸者。眼白黃。小便赤。身體軟倦。取黃豆生嚼。不惡心者。是用蒼耳子。薄荷。木通。縣茵陳。各三錢。要用無毫水之陳酒一斤煎。一椀。衝炒砂仁末三錢服。小便赤如血者。加川連一錢同煎。屢用。瘡人有曰癰。瘰。黃疸皆溼證。應忌酒。殊不知酒本溼也。今做緝溼。捕善識溼穴。領藥戰溼。非酒不可。如經滴水不效者。何也。酒被水解。捕猶賦阻也。

紅白痢及痢息痢方

凡痢不拘紅白。忌服川連。服則倒胃。不生腹痛而痢者。後方一服立瘳。儻增減定不效。革前草炒研二錢。檳榔。厚朴。山楂。陳皮。滑石。甘草。各一錢。紅麴三錢炒。澤蔞。枳實。各一錢。燈芯一撮同

煎。另以木香六分酒磨衝藥而服。有等腹不作痛。惟痢膿血。兼流黃漿。此係平素愛食冷茶水酒。乃滑腸痢。息痢積滯之證。取活鱖魚。去腸雜切段。放瓦上炙炭研粉。每服三錢。黃飴拌熱陳酒送下。數服全瘳。不拘老幼。滑腸久痢者神效。忌食水果水酒。生冷海參海蛇等性寒之菜。

癡癲證方

凡患癡癲。或羊頭風等證。緣心竅中痰迷所致。取橄欖十斤。敲損入沙鍋煮。數滾去核。入石臼搗爛。仍入原湯煎膩出汁。易水再煎。煎至無味去渣。以汁共歸一鍋。煎濃成膏。用白明礬八錢。研粉入膏攪和。每日早晚各取膏三錢。開水送服。或初起輕者。

取橄欖咬損一頭。蘸礬末入口嚼嚥。橄欖之味更美。至瘡乃止。

吐血立療方

凡吐血多者。覓三四兩重大當歸一隻。全用切細。取好陳酒一斤。漫火煎至一滿椀。頓於鍋中。以溫爲妙。候將要吐。尙未吐。口中有血含住。取藥一口。連血嚥下。卽此一劑而癒。後不再發。每有醫家阻云。吐血尙要戒酒。豈可酒煮當歸而服。服則血噴不止。如之何。殊不知當歸二字之解。當者當其時。歸者引血歸經也。全用定血。此方乃余家世傳。活人多多。從無一誤。

痰中有血方

活雄鴨二百隻。每日清晨空腹時。以一隻殺。血椀內。卽取呷嚥。

忌加鹽。百日而食百鴨之血。不可隔斷。食完全瘵。

溺血頭痛如裂方

當歸一兩。酒一升。煎成一椀。一服卽瘵。

偏身癱痛方

當歸。肉桂。延胡索。天麻。等分爲末。酒送五服瘵。

手足骨節癱痛方

熟地四兩。擣爛。浸入滴花燒酒二斤。隔湯頓熱。以竹筴攪勻。候冷。隨量日飲至瘵。取所浸熟地過酒。

箭風痛方

延胡索。桂心。五靈脂。木香。白芷。防風。各一錢。酒煎食遠服。三日。

三服瘵

雷頭風方

諸藥不瘵之證。惟用山羊矢炒炭研粉。酒送二錢立效。

偏正頭風方

白芷三錢。天麻一錢。磨細。防風。荆芥錢半。煎水衝服。

疳膨食積方

雞裏金三十箇。忌經水。瓦上炙無臭氣。成炭存性。磨粉。葷茄子四兩炒磨粉。二物和勻。以米糖鎔化與食。食完全瘵。忌食炒豆熬油結鞭等物。遲治傷目。

又方

田鷄曰水煮熟。蘊末少許。淡食。至瘉乃止。

閃頸促腰方

礪砂研粉。以骨簪蘸津黏粉點兩目。淚出稍鬆。連點三次。立時全瘉。

赤眼淹纏方

杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔。各一錢。取雄雞肺一箇。忌經水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯頓熟。去渣。以湯肺食下。隔兩日再服。三次全瘉。

胃脘痛方

活乳汁草。卽蒲公英。放瓦上炙枯黑。存性研末。每取五分。燒酒

調凡口含。再以燒酒送嚥。痛息接服五日全瘳。戒食生冷。

又方

紅坊內好紅花四分。棗頭十枚。水二碗。煎至棗熟去花。食湯。棗連服二十日。永遠除根。

夢遺方

六味地黃湯。減去澤蔞。增龍骨三錢。生研水飛。蓮鬚一兩。芡實二兩。線膠四兩。用牡蠣熟粉炒膠成珠。去蠣磨粉。同前藥蜜丸。每日早晚各取四錢。鹿含草煎湯送服。

白濁方

牛舌頭草根。卽野甜菜。又名禿菜根。近水池處最多。煎湯當茶。

飲。或以湯煮粥喫。至瘡乃止。

欬嗽神效方

杏仁一兩。泡去皮尖。內有雙仁者棄之。買新乳鉢。新研捶。將杏仁搗爛如泥。分爲三服。每內加冰糖三錢。共入蓋碗。用泉水煎滾。衝入蓋片。刻俟溫。連杏仁末服下。早晚各一次。三服而瘡如以杏仁同煎無效。

天絲入目方

捉肥蝨二十餘。將蝨用鍼戳破。令人仰卧。捏蝨血滴入眼內。少刻天絲灰抱蝨血而出。

塵屑入目方

吐津於石硯上。以人指甲磨濃汁。用骨簪蘸點眼內。不一刻一
抹而出。

跌打骨斷方

綠礬一斤煎湯。粗紙浸透裹傷處。手執燈芯然火。不住紙上炙。
紙溫卽易。火熄換然再炙。二者相際效速。斷骨處用竹片綁紮。
七日全癒。

冷哮方

淡豆豉一兩。白礬一錢。皆爲末。用飯三錢研爛。入末爲丸。如蘿
蔔子大。每取七粒。白湯送下。童子服可除根。有年者經寒卽發。
服可把定不哮。

腸紅方

取花椒子炒磨粉。每服三錢。用黃飴拌。白湯送下。服至痛止。

胃寒嘔吐黃水方

生薑一斤。擣取汁。椀許。入廣膠。乳香。沒藥末。各五錢。同煎膠化。離火。取藥攤作三四大膏。令貼胃脘痛處。以絹綁縛。三箇時。然後取。周歲孩鞋兩隻。鑪土烘極熱。輪敷。敷至膏輒。再易膏貼。再綁三時。敷至癒而止。後服感冒凡。厚朴三斤。切片。薑二斤。薑帶原皮。五升水煮。去薑。留朴焙乾。生甘草二兩。乾薑四兩。依前再煮。煮乾。去草。留薑朴炒燥。共爲細粉。黑棗薑湯煮。取棗擣爲凡。曬乾服。

翻胃初起方

陳皮上炒黃皮起皰爲粉。每空心服三錢。

烏沙瘰方

丁香。雄精。蒼朮。硃砂。各等分爲末。取蟾蜍亦等分切片。酒浸研漿。和前末搗爲丸。如芥子細。曬乾藏貯。每取七粒。溫茶送嚥立甦。

水瀉立瘵方

焦白朮。蒼朮。各二錢。山楂。厚朴。廣陳皮。土炒黃芩。各一錢。葶藶。二錢。焙搗同煎。

大麻瘋方