

發表 涌吐 攻裏 表裏

和解

正和堂

醫方合編

二

景葉
鼠粘子 一名牛蒡子
一名大力子
本備要

牛蒡子 一名鼠粘子
一名惡實

正和堂

本草備要 卷貳

柴胡 苦平微寒味薄氣升爲陽主陽氣

下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之

邪熱 肝胆心包三焦相火時珍曰行少陽黃芩爲佐行厥陰黃連爲左

宣暢氣血散結調經昂按人第知柴胡最能和裏故勞藥血藥往復用之爲足少陽膽經表藥胆清淨之府無出無入其經在半表半裡焉法當和解小柴胡湯之屬是也若病在太陽服之太陽則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

胡最能和裏故勞

藥血藥往復用之爲足少陽胆經表藥胆清淨之府無出無入其經在半表半裡焉法當和解小柴胡湯之屬是也若病在太陽服之太陽則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

醫方集解卷二

發表之劑發者升之散之汗之也表者對裏而言也明爲表之裏少陽爲表三陰爲裏而太陽爲表之表陽表以漸而入于裏始自太陽以及陽明少陽乃入陰經由太陰少陰以及厥陰六經乃盡也治病者當及其在表而汗之散之使不至于傳經入裏別病易已矣若表邪未盡而遽下之則表邪乘虛入裏或悞補之則內邪壅閉不出變成壞症者多矣經曰善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也

葛湯 仲景

治傷寒太陽症邪氣在表發熱頭痛身痛腰

痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫頭痛惡寒尚爲在表無汗而喘

治傷寒邪熱 仲景有大小柴胡等湯

瘡熱結裏虛

勞肌熱 寇宗奭曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰華子皆言補勞

傷醫家執而用之財誤無窮時珍曰勞

有五若勞在肝胆心心包有熱則柴胡

起目眥上腦下項筋肩挾脊抵腰行于身後故所過之

脉浮而緊寒邪外束陽不得越故鬱而爲熱經曰人之傷寒則爲病熱寒初中人必先在表即足太陽寒水之經太陽爲少陽主氣乃一身綱維本經之脉

陽寒水之經太陽爲少陽主氣乃一身綱維本經之脉

乃手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡爲升清退熱必用之藥。惟勞在肺腎者不可用耳。寇氏一槩擯斥殊非通論。昂按楊氏秦苑扶羸湯治肺痿成勞。咳嗽聲嗄體虛自汗。用柴胡爲君。則肺勞亦有用之者矣。

扶羸湯治肺痿成勞。咳嗽聲嗄體虛自汗。用柴胡爲君。則肺勞亦有用之者矣。扶羸湯治肺痿成勞。咳嗽聲嗄體虛自汗。用柴胡爲君。則肺勞亦有用之者矣。

嘔吐心煩

邪在半表半裏則多嘔吐。諸瘧寒熱曰詣瘧

瘧以柴胡爲君。佐以引經之藥李士材曰瘧非少陽經慎用。喻嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪伏于半表半裏適在少陽所主之界。入與陰爭。陽勝則熱出與陽爭。陰勝則寒。即純熱無寒爲瘧瘧溫瘧純寒無熱爲牝瘧。要皆自少陽而造其極偏補偏散弊亦必返還少陽之界。使陰陽協和而後愈也。謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其爲瘧矣。脉緩屢遷而弦之一字實貫徹之也。昂按瘧之不離少陽猶咳之不離于肺也。談數云張知閣久病瘧熱

處無不痛也。惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而始惡之。故惡寒必兼惡風。惡寒有陰陽之分。惡風惟屬陽經。故三陰無惡風之症。風爲陽邪。寒爲陰邪也。原病或曰身熱惡寒熱在表也。熱在表而淺邪畏正。故病熱而反惡寒。或言爲寒在表及熱在皮膚寒在骨髓者誤也。凡人之傷風暑濕皆有汗。惟傷寒獨不汗。出寒能濶血又表實也。氣上逆故喘邪在表故脉浮。傷寒脉緊而傷風脉緩者。寒勁急而風緩散也。喻嘉言曰冬傷寒春傷溫夏秋傷暑傷濕此四時正病也。然夏秋亦有傷寒。冬春亦有傷暑傷濕。乃四時之客病。所謂異氣也。冬春正病有汗爲傷風無汗爲傷寒。即夏秋正病有汗爲傷暑濕無汗仍爲傷寒。亦治太陽陽明合病。喘而胸滿。表邪壅盛。陽氣不得宣發。故逆而作喘。若去表甚近。非裏實。雖有陽明然與太陽合病。尚爲在表。宜汗不宜下。經曰。陽明病脉浮無汗而喘者。發汗則已。宜麻黃湯。又曰。陽明病應發汗。反下之。此爲大逆。或問兩經合病。當用兩經之藥。何以偏用麻黃湯耶。蓋邪自太陽而來。仍當提出太陽不欲。亦治哮症。哮喘中風寒其階也。陽明故不用葛根也。

時如火年餘骨立。醫用草附諸藥熱益甚。孫琳授以小柴胡湯三服脫然。琳曰此名勞瘧。熱從體出。加以剛劑氣血愈。

虧熱有在皮膚在藏府。在骨髓在骨髓者非柴胡不可。若得銀柴胡只須一服。

南方者力減。故三服乃效也。時珍曰。觀

此則得用藥之妙矣。昂按據孫貞氏之說。是柴胡亦能退骨蒸也。

頭眩

目赤胸痞脇痛。凡脇痛多是肝木有餘

行氣右脇痛宜消食行瘀。口苦耳聾。皆

肺之婦人熱入血室。衝爲血海。即血室

胡在藏主血。胎前產後諸熱。小兒痘疹在經主氣。

五疳羸熱散十二經瘡疽血凝氣聚功

同連翹。連翹治血熱。柴胡治氣熱爲少異。陰虛火炎氣

感于寒而作。此湯散寒利肺病。哮喘者雖服麻黃而不作汗。

麻黃

去節

三兩桂枝

二兩

杏仁

七十枚去皮尖

甘草

一兩去莖

先煮麻黃

數沸去沫。內諸藥煎熱服覆取微汗。中病即止。不必盡

劑無汗再服。

凡用麻黃去節醋湯畧泡晒乾備用庶免

大發冬月生用

傷寒初感始於太陽故以

發汗爲先。

汗出則愈活人云。

凡發汗病症仍在者三日

內可二三汗之。

令腰以下周徧爲度。

王海藏曰。

表症當

汗。脉浮急汗之。脉沉緩汗之。裏症當下。脉浮緩下之。脉沉急下之。三陽汗當急而下。當緩。三陰汗當緩而下。當急。按汗有大汗解表微汗解肌之殊。下有急下少與微和滲利之別。

此足太陽藥也。麻黃中空辛溫氣薄。肺家耑藥而走太陽。能開腠散寒。皮腠肺之所主。寒從此入。仍從此出。桂枝辛溫能引營分之邪達之肌表。桂入營血能解肌。杏仁苦甘散寒而降。

升者禁用。銀州者根長尺餘微白治

勞疳良北產者如前胡而軟並良南產

者强硬不堪用外感生用內傷升氣酒

炒用根中及下降用稍有汗咳者蜜水

炒前胡半夏爲使惡皂角

前胡辛以暢肺解風寒甘以悅脾理胸

腹苦泄厥陰肝之熱寒散太陽膀胱之邪

微寒一性陰而降功耑下氣氣下則火

云微溫性陰而降功耑下氣氣下則火

降而痰消氣有餘便能除實熱治療

火火則生痰能除實熱治療

熱哮喘咳嗽嘔逆痞膈霍亂小兒疳氣

氣甘草甘平發散而和中經曰寒淫于內治以甘熟佐

以苦辛是已

喻嘉言曰麻黃發汗其力最猛故以桂枝監之

甘草和之用杏仁潤下以止喘逆正

如馭馬防其放逸耳李士材曰古云冬不用麻黃夏不

用桂枝蓋以冬主閉藏不應疎泄夏令炎熱不宜辛溫

經所謂必先歲氣毋伐天和是也又云夏月不用麻黃

兩說相反何耶或舍時從症或舍症從時臨時變通存

乎其人耳李時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用

桂枝未有究其精微者津液爲汗汗即血也在營則爲

血在衛則爲汗寒傷營營血內滯不能外通于衛衛氣

閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣外泄

不能內護于營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡

風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也証雖屬太陽

然而赤肺鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎蓋皮毛外

閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪

達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者

加石膏活人書夏至後加石膏知母是皆肺火之藥

是麻黃湯雖太陽發汗重劑實散肺經火鬱之藥腠理

不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同

有推陳致新之續明目安胎無外感者

忌用

按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降爲不同肝胆經風痰非前胡升前胡性降爲不同肝膽經風痰不能除

皮白肉黑味甘氣香者良半

夏爲使惡星爲忌火

麻黃

辛溫微苦

僧繼洪云中牟產麻黃地冬不積雪性熱故過

服泄入足太陽

膀胱兼走手少陰陽明心大

而爲肺家諸藥發汗解肌去營中寒邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治

中風傷寒

中猶傷也

頭痛溫瘧咳逆上氣風寒

鬱干肺經經曰諸癥症宜瀉

肺氣雖用

氣膿鬱皆属于肺痰哮氣喘

學症宜瀉

風寒而表氣亦受傷也若無新中之風寒則無惡風惡

甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥濡

木而固脾使以薑棗行脾之津液而和營衛下後微喘

春加厚朴杏仁以利肺氣也汗後肺沉遲者加入參以

益肺氣也活人書加黃芩爲陽旦湯以泄肺熱也是桂

根湯雖太陽解肌輕劑實爲理脾救肺之藥也王履曰

傷寒即病者謂之傷寒不即病者謂之溫暑其原不殊

故一稱爲傷寒其類則殊施治不得相混仲景之書專

以傷寒法治溫暑不過借用耳三陰傷寒寒症十居七八若溫暑但一于熱耳後人誤爲通治遂疑諸熱劑不

敢用是未悟仲景立麻黃桂枝湯之有所主有其時矣苟知非治溫暑之劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發于

冬寒之時寒邪在表閉其腠理非辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以必用也溫病熱病發于暄熱之時鬱

熱自內達外無寒在表故非辛涼苦寒苦酸之劑不能解之此桂枝麻黃等所以不可用而後人所處水解散

大黃湯千金湯防風通聖之類兼治內外者之所以可

用也夫即病之傷寒有惡風惡寒之症者風寒在表表

麻黃而不出汗。赤黑斑毒。胃熱。一曰斑症。

汗本草未載。表虛不得再汗。

非便閉。亦不可下。

只宜清解其熱。毒風癰瘍。皮肉不仁。

目赤腫痛。水腫風腫。過劑則汗多亡陽。

夏月禁用。

汗者心之液。過汗則心血爲

之動搖。乃驕悍之劑。丹溪以

人參麻黃同用。亦攻補法也。東垣曰十

劑曰。輕可去實。葛根麻黃之屬是也。邪

客皮毛。腠理閉拒。營衛不行。故謂之實。

二藥輕清可以去之。時珍曰。麻黃太陽

經藥。兼入肺經。肺主皮毛。葛根陽明經

藥。兼入脾經。脾主肌肉。二藥皆輕揚發

散而所入不同。王好古曰。麻黃治衛實

桂枝治衛虛。雖皆太陽經藥。其實營衛

藥也。心主營衛血。肺主衛爲氣。故麻黃

爲手太陰肺之劑。桂枝爲手少陰心之

汗用桂枝。未有究其精微者。津液爲汗。

寒之症。故仲景曰。太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。溫病如此。則知熱病亦如此。而不渴惡寒者。非溫熱病矣。或有不因新中風寒。亦見惡風惡寒之症者。蓋因表虛。熱達于表。而傷表氣。所謂衛虛。則惡風。營虛。則惡寒耳。非傷風惡風。傷寒惡寒也。溫病熱病。亦有先見表症。而後傳裏者。蓋鬱熱自內達外。不能泄。還復入裏。而成可攻之症。非如傷寒從表而始也。每見世人治溫熱之病。誤攻其裏。亦無大害。誤攻其表變。不可言。此足明其熱之自內達外矣。問有誤攻致害者。乃春夏暑暈所生之疫症。邪絕在表。求人于裏。不可以溫病熱病同論。夫秋冬傷寒。值傷寒也。春夏傷寒。寒疫也。與溫病熱病。皆是兩途。豈可同治。况傷寒有中陰經。與太陽雖傷不及之。疫症邪絕在表。求人于裏。不可以溫病熱病同論。夫鬱熱即傳陰經爲寒症。而當溫者。又與溫病熱病大不同。其可混治乎。一陽子曰。傷寒傳足。不傳手。非窮理之言也。草窓劉子。指足經所屬水土木水。遇寒而洒水土。遇寒而坼裂。木遇寒而凋枯。故寒喜傷之。手經所屬金。與火金。遇寒而愈堅。火體極熱。寒不能襲。故寒不能傷味者。竒之。將人身營衛經絡。上下截斷。不相联络。失血氣周流。瞬息罔間之旨矣。夫寒邪襲人。必先皮毛。均熱。鼻塞息粗。肺主皮毛。是手太陰肺辛金。先受病矣。海藏。

汗即血也。在營則爲血。在衛則爲汗。寒傷營。營血內滿不能外通于衛。衛氣閉固津液不行。故無汗發熱而惡寒。風傷衛。衛氣外泄不能內護于營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒皆由皮毛而入。皮毛肺之合也。益皮毛外開。則邪熱內攻。故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。加石膏活人書。夏至後加石膏知母。皆泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗重劑。實散肺經火鬱之藥。腠理不密。則津液外泄。而肺氣虛虛。則補其母。故用桂枝同甘草。外散風邪。以收表。內伐肝木。以防脾。佐以芍藥泄木而固脾。使以薑棗行脾之津液。而和營衛。下後微喘者。加厚朴杏仁。以利肺氣也。活人書。加黃芩。爲陽旦湯。以瀉肺熱也。是桂枝湯。雖太陽解肌輕劑。實爲理脾散肺之藥也。

有傷寒自皮毛入之語。先師有桂麻羌芍之設。雖太陽表之表之劑。然汗法舍皮毛。何自而解。更衣悖常。結閉溏泄。手陽明大腸庚金病矣。先師有硝黃朴實之用。雖兼正陽三陰裏之裏之劑。然下法舍大腸。何自而通。劉子謂金遇寒而愈堅信乎。陽氣怫鬱。舌胎言妄。手少陰心丁火病矣。先師有瀉心數法。亢極則血。上下煩蒸。手厥陰心胞火。手少陽三焦火病矣。治有三黃柴芩數條。小便癃閉。手太陽小腸丙火病矣。治有五苓導赤之例。劉子謂火熱寒不能傷信乎。經又云。火之傷寒。則爲病。熱既云。燔熱。則無水水上拆木枯之說。而有金燬火亢之徵矣。劉子何人。敢恃管見惑世。誣人哉。機要云。有厥陰經下利。不此脉沉而遲。手足厥逆。唾沫膿血。此難治宜麻黃湯。小續命湯汗之。此有表邪縮子內當瀉表。而中雷鳴。水穀不分。小便滯滿。服清藥溫藥不效。炎中腕膏下數十。燥熱轉甚。津液枯竭。巡余視之。脉浮大而長。身表微熱。用桂枝麻黃湯。加薑棗煎連進三大劑。汗出終日。至旦而愈。次以胃風湯。和其藏府。食進而安。經曰。春傷于風。夏必飧泄。故可汗而愈。按風屬木。脾屬土。木動土故泄也。附大黃湯。大黃兩半。芒硝大腹皮木通

發汗。用蓋去節。煮十餘沸。掠去浮沫。或

用醋湯略泡晒乾備用。亦有用蜜炒者。

麻免
無時出汗爲自汗。屬太發。止汗用根節。

無時出汗爲自汗。屬陽虛。夢中出汗爲盜汗。屬陰虛。用麻黃根、蛤粉、粟米等分爲末。袋盛撲之。佳時珍曰。麻黃發汗。體不能禦根節止汗。效如影響。物理不可測。

未。袋盛撲之。佳時珍曰。麻黃發汗。體不能禦根節止汗。效如影響。物理不可測。

如。此。首汗。有風濕傷風。風悶氣虛。血虛

脾虛。陰虛胃熱。痰飲中暑。亡陽柔痉等

症。皆可加用。蓋其性能行周身肌表。引

諸藥至衛分而固腠理。汗雖爲心液

然五藏亦各有汗。經曰。飲食飽甚。汗出

于胃。驚而奪精。汗出于心。持重遠行。汗

于脾。厚朴白微爲使。惡辛夷石膏。

汪出

荆芥一召
假蘇 辛苦而溫。芳香而散。入肝經。

甘草各一兩。桂心七錢半。桃仁廿一枚。治陽毒傷寒。未解。熱在內。恍惚如狂。破棺子金湯。苦參一兩。酒煮取吐。沿天行熱毒。垂死水解散。

防風通聖散。見表裏門。

本方除桂枝加石膏。名麻黃杏仁甘草石膏湯。仲景治汗下後不可更行桂枝湯。汗出而喘無大熱者。

或問發汗後不可更

行桂枝湯。桂枝既不可行。麻黃可行耶。無大熱石膏可

行耶。喻嘉言曰。治傷寒。先分營衛。桂麻二湯。斷無混用

之理。此症太陽之邪。雖從汗解。然肺中熱邪未盡。所以

熱雖少止。喘仍不止。故用麻黃發肺邪。杏仁下肺氣。甘

草緩肺急。石膏清肺熱。即以治足太陽之藥通治手

太陰經也。倘誤行桂枝。寧不壅塞肺氣。而吐癰膿乎。亦

治溫瘧。先熱後寒。木方加白朮。名麻黃加朮湯。金匱治濕

附子湯。金匱治脉沉虛脹者。爲氣水屬少陰。發其汗即止。

家身體煩痛。宜發汗。本方去桂枝杏仁。加附子。名麻黃附子湯。金匱治脉沉虛脹者。爲氣水屬少陰。發其汗即止。

氣分兼行血分其性升浮能發汗止冷

又云止冷

本方除桂枝杏仁名甘草麻黃湯

金治裏水。一身面目黃腫脉沉

黃腫脉沉

汗虛散風濕清頭目利咽喉治傷寒頭

小便不利

重覆取汗。本方去桂用麻黃

不去節。不去

杏仁皮尖甘草

痛中風口噤身強項直口面喎邪目中

黑花其氣溫散能助脾消食。

氣香入脾通利

血脈治吐衄腸風崩中血痢產風血運

產後去血過多腹內空虛則自生風故

常有崩漏之患不待外風襲之也。荆芥

最能散血中之風華陀愈風散荆芥三

錢微焙爲末豆淋酒調服或童便服諸

家云癰瘍瘡腫清熱散瘀破結解毒

散熱清則血涼而毒解

爲風病血病瘍家聖藥

荆芥功木

是藏血之地李士材曰風在皮裏膜外

生名三拗湯局治感冒風寒咳嗽鼻塞

麻黃留節發中麻黃留節發中

用其發連皮取其濁甘草生用補中有發也

忌汗諸證

仲景曰陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死

痛宜汗之假令尺脈遲者不可發汗以營弱血少哉也

脈浮緊者當身

咽喉乾者不可發汗津液不足也

咳而小便利下利雖有表症不可發汗津液反增客

虛也

淋家不可發汗發汗則四肢厥冷肺腎虛冷也

熱也

劖家亡血家不可發汗發汗必便血亡耗津液反增客

虛也

活人云脉微者黃芩方藥湯犀角地黃湯

寒身痛不可發汗發汗則痙攣

表虛熱聚故生瘡汗之則

荆芥主之。非若防

風能入骨肉也

連穗用

穗在于巔故善升發

治血炒黑用

凡血藥用山梔乾薑地榆
燉擗五靈脂等皆應炒黑

者以黑勝紅也

反魚鱠河豚驢內

連翹

微寒升浮形似心

實似蓮房有瓣

苦人心

故入手少陰厥陰心包氣分而瀉火兼

除手足少陽三焦手陽明經大腸氣分濕

熱散諸經血凝氣聚

營氣壅遏衛氣利
鬱滯遂成瘡腫利

水通經殺蟲止痛消腫排膿之凡腫而

痛者爲實邪腫而不痛爲虛邪腫而爲

赤者爲結熱腫而不赤爲留氣停痰爲

經曰諸瘡痛癰

皆屬心火

表益虛熱愈甚而生風故變症。少陰病脈沉細數病爲在裏不可發汗。少陰病但厥無汗而強發之必動

其血或從口鼻或從目出是名上厥下竭難治。

脉動數微弱者不可發汗。脉沉遲爲在裏反發其汗則津

液越出大便難表虛裏實必譖語

汗家重發汗必恍惚心亂汗者心之液心亡血

液故亂腹中上下左右有動氣者不可發汗

溫傷寒脉緊傷風脉緩

手足微厥傷風手足背皆

傷寒傷風辨傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒無汗傷風有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒

陰陽表裏辨陽症之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴手足溫和陰症之表無熱惡寒面慄息冷

手足厥逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手擲足大使清白爪甲青黑身重難以轉側脉沉細數惟腹痛與

陰症之裏不渴踴臥引衣自蓋唇紫舌捲大便滑泄小便清白爪甲青黑身重難以轉側脉沉細數惟腹痛與

嘔陰陽裏症皆有之三陽經又有陰陽表裏之分太陽

以熱在皮膚頑痛項強在經爲表昧黃湯桂枝湯九味

十二經瘡家聖藥

紫蘇

味辛入氣分。色紫入血分。香溫散。

寒通心利肺開胃益脾。

氣香入脾發汗解肌

和血下氣寬中消痰祛風定喘止痛安胎。

利大小腸解魚蟹毒。多服泄人真氣。

時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎。同霍香

烏藥溫中止痛同香附麻黃發汗解肌。

同芍藥當歸和血散血。同桔梗枳殼利膈寬腸同葡萄杏仁消痰定喘同木瓜厚朴散濕解暑。

治霍亂脚氣。氣香者良。宜橘皮忌。

鯉魚。蘇子與葉同功潤心肺尤能下氣定喘止嗽消痰利膈寬腸溫中開鬱。

有蘇子降氣湯。梗下氣稍緩虛者宜之。

葉發汗散寒梗順氣

羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱在府爲裏。五苓散陽明以熱在肌肉目痛不眠在經爲表葛根解肌湯以口渴

背寒爲熱漸入裏。白虎加參湯若自汗狂譖熱已入胃府爲全入裏調胃承氣湯少陽以胸脇之間爲半表半裏表多。小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆發熱太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也。大抵陽症多得之風寒暑濕邪生于太陽也。陰症多得之飲食起居七情邪生于少陰也。故曰傷寒內傷者十居八九也。

桂枝湯仲景治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾嘔。

關前爲陽衛亦陽陽以候衛關後爲陰營亦陰陰以候營陽脉浮者衛中

風也陰脈弱者營氣弱也傷于風者頭先受之。故頭痛經曰陽浮者熱自發陰弱者汗自出風併于衛營弱衛強故發熱自汗也衛虛則惡風營虛則惡寒自汗則反腠疎故惡風復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛實之分無汗惡寒爲表實宜發汗汗出惡寒爲表虛宜解肌鼻鳴乾嘔者風壅氣逆故息有音而作嘔也喻嘉言曰風寒並舉義重惡風惡風未有不惡寒者所以傷寒亦互云惡風後人謂傷寒惡寒傷風惡風誤矣及陽明

安胎子降氣開鬱消痰定喘。表弱氣炒研用。

虛者忌用葉腸滑氣虛者忌用子炒研用。

病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗。

脈遲汗集屬陽明症

薄荷 辛能散涼能清。

本經溫益體。

溫而用涼也升浮。

以微惡寒尚兼太陽仍當從

外解肌斷其入胃府之路。

能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風熱清。

利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口

噤語濁舌胎。

含漱眼耳咽喉口齒諸病。

辛溫。

桂枝 芍藥 生薑

三兩 甘草

二兩 大棗

十二枚

熟服須

更啜稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋

漓汗出病差停後服服一劑盡病症猶在者更作服

此足太陽藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風不可

大汗汗過則反動營血雖有表邪只可解肌故以桂枝

辛能散。

虛人不宜多服。

能發汗疎表夏

涼能清。

月多服泄人元

氣。

蘇產氣芳者良。

薄荷貓之酒也。

虎之酒也。

蠅蠅鷄之酒也。

大。

驚藥俱宜。

散風熱。

皮膚癰癧瘻瘻疥癩。

凡小

驚熱。

見治。

薄荷湯調。

骨蒸破血止痢。

能治血痢血

痢病在凝滯

涼能清。

虛人不宜多服。

月多服泄人元

氣。

也。食之皆醉破猫傷者薄荷汁塗之。

也。

雞蘇一名水蘇

辛而微溫清肺下氣

甘溫能和此不耑于發散又以行脾之津液而和營

理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血衛者也

麻黃湯耑于發散故不用薑囊而津液得通矣

痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

局方有龍龐安時曰若無汗小便數或手足逆身冷不惡寒反惡

熱者慎不可用又自汗小便數者不可服自汗爲陽虛

小便數爲下焦虛寒初病表裏俱虛病不在表服此重

蘇丸方莖中虛似蘇葉而微長密齒面蠶氣甚辛烈

木賊溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形

性亦能發汗解肌升散火鬱風濕入足

厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜翳乃肝邪鬱遏不能上通于目及疝痛脫肛腸風瘻瘍

赤痢崩中諸血病

可與脉緊爲傷寒與之則表實而汗愈難出矣傷寒

例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡周易後

營曰風既傷衛則衛氣疏不能內護于營而汗自出矣汗

營固裏則不但外邪不出且入而爲裏患矣然後知和

營則外邪出邪出則衛自密更不必用固表之藥而汗

止矣仲景曰病嘗自汗出者此爲營氣和營氣和者

不誚以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脉中衛行

外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯王好古曰或問

桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又

曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯非桂枝湯又

二義相通否乎曰仲景云太陽病發汗

外也

爲

浮萍 辛散輕浮。入肺經達皮膚。能發揚

營弱衛強陰虛陽必湊之。故用桂枝發其汗。此乃調其營氣則衛氣自和。風邪無所容遂自汗而解。非若麻黃

邪汗

丹溪曰浮萍發汗甚于麻黃。止搔癢消渴

搗汁服能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗而出而止。非桂枝能閉汗孔也。李東垣曰。

生于水。又能下水氣利小便。治一切風

仲景治表虛製此湯用桂枝爲君。桂枝辛熱發散體輕助陽。芍藥甘草佐之。若腹中急痛。乃製小建中湯。以芍

癰癧瘍

浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風濃者汁浴。治惡疾瘡癩遍

藥爲君。芍藥酸寒。主收補中。桂枝甘草佐之。一治表虛一治裏虛。又曰。以桂枝易肉桂。治感寒腹痛之神藥。如

身燒煙辟蚊

紫背者良

桂枝獨冠其首。今人全不用何也。昂按仲景一百一十二方中熱腹痛去桂加黃芩。許叔微曰。仲景一百一十二方

蒼耳子

一名菜耳。即詩卷耳。苦甘性溫善發汗。散

麻黃桂枝而全不。用羌活防風。是古人亦有所未備也。按古製羌活湯。黃耆湯。川芎湯。海藏製神木散。白未湯。柴胡湯。附補門。神木白木湯見後。

頭痛目暗齒痛鼻淵肢痙痙痛癰瘍瘡

風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚治

木方加白术川芎羌活防風飴糖名疏邪實表湯。

節菴治

芥

采根葉熬遍身搔癢作浴。名萬應膏。湯佳。

去刺酒同

陶氏製此。以白术爲君。以代桂枝湯。徐嘉言曰。坐令

外感內傷混同論治矣。并按節菴之君白术。亦倣潔

之黃耆湯。海藏之白术湯而來。又按節菴所著傷寒六書。盡易仲景原方。參合後賢治法。以代桂枝麻黃葛

拌蒸忌猪肉

聖惠方云葉搗。計治產後病。

天麻 辛溫入肝經氣分。益氣強陰。通血

脈。強筋力。疏瘀氣。治諸風眩。掉頭旋眼。

黑語言不遂。風濕瘡。

音頑 痘小兒驚癇。

皆屬肝木。肝病不能榮筋。故見前症。 天麻入厥陰而治諸疾。肝氣假平。諸

血衰少。及類中風者。忌用。

風藥能燥血。故見前症。 天麻入厥陰而治諸疾。肝氣假平。諸

血衰少。及類中風者。忌用。

風藥能燥血。故見前症。

者佳。濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙用。

秦艽 苦燥濕藥散風。去腸胃之熱。益肝

音交

根青龍等劑在後人誠爲便用。拔世之嗜節菴者勝于仲景以節菴爲捷徑。以仲景爲畏途。節菴之書行而仲景之書晦。如節菴者可謂潔古。海藏輩之功臣而在長沙實爲操莽也。本集採節菴方論頗多。然不能無遺議者以節菴之功罪。不妨互見于世也。本方去芍藥生薑名桂枝甘草湯。

仲景之書晦。如節菴者可謂潔古。海藏輩之功臣而在長沙實爲操莽也。本集採節菴方論頗多。然不能無遺議者以節菴之功罪。不妨互見于世也。本方去芍藥生薑名桂枝甘草湯。

治發汗過多。又手冒心。心下悸。欲得按者。

汗多則亡陽。而耗血。故心

虛悸而又手冒心也。桂枝本方加附子。名桂枝加附子。

汗多亡陽。無以衛外。故惡風。汗多則便自少。兼膀胱無

陽不能化氣。故便難。汗多則無液。以養筋兼有風入而

風不動。無風反搖。名定風草。明亮堅實。

增一勁故四肢微急。與桂枝湯以和榮衛。加附子以助元陽。 本方去芍藥加附子。名桂枝附子湯。

景治傷寒八九日。風濕相攜。身體痛煩不

能轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濶。在裏而復身體痛煩者。此為試讀。需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com