

十卷二十八——三十



南京中医药大学图书馆版权所有

腹少腹痛源流

腹痛五臟俱有病也。脾胃內舍心腹肺心內舍胸膈兩脇肝內舍胛脇少腹腎內舍少腹腰脊大小腸皆任脈皆在少腹。此藏府所舍之部位也。後世醫者都以腹分三部。大腹屬太陰脾。臍腹屬少陰腎。少腹屬厥陰肝。竊按藏府部位。膈下即為胃上口曰賁門。胃下口曰幽門。傳入小腸處計胃長二尺六寸。則當臍正屬胃之地分。又考十二經筋脈所到心脾筋結臍。胃筋脈亦挾臍至腎之筋脈從腰貫脊。並不及臍。則以大腹小腹屬脾肝。猶未盡然。而以臍腹屬腎。尤不可解。然則臍腹何屬。屬之胃而已。胃與脾表裏屬胃仍屬之脾而已。故難經曰。臍上痛心證也。臍下痛腎證也。臍右痛肺證也。臍左痛肝證也。臍之上下左右難經既分屬心腎肺肝。土居中央。則臍腹非屬之脾與胃乎。臍腹者當臍也。當臍痛而用腎藥大謬。蓋以腹痛而分屬五藏。猶厥心痛五邪相乘而病亦異也。衝任大小腸亦屬腹。每部各有氣血虛實。內傷外感當細察之。更有五藏之疝。不干舉丸。止在腹痛者亦宜察之。總之腹痛之病。先分寒熱虛實。再詳蟲血食痰。治法備矣。腹痛多寒亦有因熱者。寒痛脈必沉遲或伏。痛綿綿無增減。得寒愈。甚得熱稍緩。宜乾薑肉桂白芍。方用厚朴陳皮甘草香附麥酒。宜白芍黃連山梔甘草滑石木通。方辨虛實之法不一。而總以可舌燥小便赤澀肛門如燒此為積熱。宜白芍黃連山梔甘草滑石木通。方辨虛實之法不一。而總以可按屬虛不可按屬實為進。故有按之似痛重按之却不痛大便利者為虛寒證。宜理中湯桂香散。其或按之痛甚手不可近大便堅者為實熱證。承氣調胃。今人但知諸痛屬實宜破結疎利。因用枳實青皮檳榔大黃等。若其得當亦驗。若遇虛寒必更甚矣。故惟檢知壯實與初病當下之虛弱與久病當和之而治虛之法又必分氣血痛覺時常虛豁似機非機呼吸無力屬氣虛也。宜六君子湯。若畏慢作痛如細筋抽引不寧又如芒刺牽引屬血虛也。宜四物湯。加以上寒熱虛實之辨也。若食痛者脈必弦。食得寒則滯得熱則行。宜用

溫散法如乾薑蒼朮白芷川芎香附薑汁之類不可妄用攻下峻利藥更兼行氣快氣藥助之自愈或面

黃腹痛宿食不消吞酸腹痛痰滯傷食法亦同之宜丁有脾積九平胃蓋清痰能作痛必胸腹有聲宜芍藥散濕痰亦作痛由阻

暫止鉞則又痛宜導痰解鬱法宜二陳湯加香附蒼朮川芎枳實薑汁蓋清痰能作痛必胸腹有聲宜芍藥散濕痰亦作痛由阻

塞氣道之故宜四逆散蟲痛者不吐不瀉心腹懊憹往來上下痛有休止或腹中塊起按之不見五更心嘈牙

關強硬惡心吐涎沫或清水腹熱善渴食厚味或飽則止面色青白赤不定蛇蟲咬咬面必黃宜九龍散

之法以面上白斑唇紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路是其候也小兒蟲痛證最多死血痛者脈必

孔澀痛有定處或由負重努傷或由跌撲損傷或婦人由經來瘀閉或由產後惡露未盡皆成死血痛者

當歸散或桃仁承氣湯加以上食疫蟲血之辨也他如脾血虛而痛按之則止宜益氣補血宜八寶丹

冬石解白中氣虛而腹寒痛宜補中益氣宜五參黃耆白朮陽氣虛而絡空冷氣乘之當膈微痛手按

則止不可破泄真氣宜茯苓根薑脾陽鬱傷每痛必週身寒慄吐涎沫而痛止宜升陽散鬱宜半夏厚朴

金鈴子陰濁府陽不通脈沉微腹痛欲大便宜以辛熱通陽宜生白朮吳萸良薑厚朴夏鬱傷肝脾

之絡致敗血瘀留過勞役動怒腹痛即發宜辛通潤血宜桃仁桂枝榮分虛寒當膈腹痛咬氣遇冬必發

過機動怒亦發宜溫通榮分宜肉桂當歸炮薑茯苓炙甘草暑傷氣分長夏腹脹食減微痛宜調脾疎肝宜八參廣皮白

仁陰毒腹痛厥逆唇青卵縮六脈欲絕宜宣通陽氣宜鴉片尿一盞燈清服腎藏虛冷氣攻膈腹及兩脇痛

不可忍宜祛散冷結宜定痛丸腹內熱毒絞結作痛甚至下血宜培土和中宜乾黃土煮數沸濕熱腹痛按之

愈甚宜升提利小便宜升麻柴胡防風葛根木通黃連黃芩滑石車前不愈微利之宜加熟即土鬱則奪之之義久受風露積冷

攻刺痛淹延歲月百藥不效宜祛散沉寒宜和劑過飲酒漿或積作痛宜醒脾解濕宜木香濕傷腹痛小

便秘大便洩宜燥濕利水宜胃痰積腹痛下白物時眩喜熱湯脈滑宜消痰煖內宜星半氣滯塞腹痛大

脹脈沉宜開通疎利宜木香腹脹絞痛而兼嘔吐以陽不得降而胸執欲嘔陰不得升而下寒腹痛為升降失

常宜調燮陰陽宜黃腹脹絞痛有時止妨食發欲死宜宣通氣血宜大攪腸痧腹痛四肢冷宜以藿

昏倒不省人急刺委中或十指出血宜霍香正氣散加木香砂仁或以馬蘭疝氣腹痛即五藏症不干畢

九者宜通調藏氣宜腹失血後腹痛或連少腹宜補養榮血以上皆腹痛之由也士材云腹痛

以白芍甘草主之蓋甘者已也酸者甲也甲已化土此仲景之妙方也若脈緩傷水加桂枝生薑脈洪傷

金加黃芩大棗脈澀傷血加當歸脈弦傷氣多加白芍脈遲傷火加乾薑綿綿痛欲執手按脈遲者寒也

香砂理中丸士材加增之法良為仲景功臣余又按一切腹痛以黑神丸主之無不效雖然腹之為病有

不止於痛者如腹中鳴也靈樞以為中氣不足內經以為脾氣虛又以為病本於胃合而推之全屬土病

胃散而藏寒有水亦能鳴宜五火欲升水欲降亦相擊而多鳴宜二陳湯加連山桅如腹中窄狹也在肥人則由

濕痰流灌藏府宜二陳湯加蒼朮香附瘦人則由濕熱熏蒸藏府宜二陳湯加蒼朮黃連雖為痰為熱不同而原於濕則一故

丹溪以為此證必用蒼朮能燥濕也甚有神昏性躁心神不斂者宜二陳湯加遠志麥冬有兼血虛氣弱者宜

湯加川總能除濕利氣使升降自如自然平復如腹皮麻頑或痛也凡人夏月洗浴後往往露腹當風其

腠理開邪因入皮毛適與衛氣相值因搏擊而為麻頑不仁宜多者愈白腎虛不能行水加以喜食酒麵

酒與水交聚腹中而麵毒復纏滯其氣故水滲於腹皮而作痛也必先疎洩大便宜以錢氏宣風散然

後令脾胃氣復自然向安宜以青木香元一分安腎丸如腹中有水而為涌水證也內經言肺移寒於腎

為涌水涌水者按之腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水也宜草如腹皮彌急或硬也脾

氣素虛又傷風與食交固不散日久而腹皮漸急而堅硬即俗名單腹脹也單云者以四肢不脹單脹急

在腹也宜調中以上諸款皆腹所生病也而要豈止於痛而已哉若少腹痛症病為多然有不盡由於疝

者其為證可辨如痛而喜按虛也宜溫痛而不可按實也宜溫痛而小便不利濕熱也宜五苓散加

急小便反利死血也宜血痛連陰莖按之則止肝血虛也宜補血清熱用當歸生地白芍艾草牛膝麥冬

子痛如絞急不可忍宜小便如淋諸藥不效酒慾過度也宜黃芩木通甘草痛而按之有塊時脹悶其痛

不移處瘀血已久也宜元胡索肉桂香少腹之為病又如此

脈法 脈經曰脈細小緊急腹中刺痛陰弦亦是腹痛尺脈緊臍下痛弦急小腹痛尺脈伏或實小腹
痛心腹痛不得息脈細小遲者生堅疾者死腹痛脈反浮大而長者死 脈訣曰心腹痛脈沉細宜得
大弦長命必殛 醫鑒曰尺脈弦則腹痛

腹痛原由證治 內經曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮縮則急急則外引小絡故卒然
而痛因重中於寒則痛久矣寒氣客於背俞其俞注於心故相引而痛寒氣於處厥陰之脈則血凝脈
急故脇肋與小腹相引痛寒氣客於五臟厥逆上洩陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則
生矣又曰熱氣留於小腸小腸中痛瘴熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣又曰腎虛則胸中痛
大腹小腹痛清厥意不樂寒氣客於經脈之中與氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣客於大
脊之脈則深按之不能及故按之無益也 正傳曰從心下至小腹硬滿而痛者是邪實也須以太陰
胸湯下之若小腹硬滿而痛小便利則是蓄血之證小便不利則尿瀉之證 直指曰寒熱死血疾飲
食積腹痛每停聚不散惟蟲痛則乍作乍止去來無定又或嘔吐清沫此為可驗耳

大腹外證名腹癰小腹外證名衝疽腹癰因於膏梁厚味及七情火鬱脾虛氣滯毒聚熱壅所致其證生
於肚腹之皮裏膜外如腹痛特甚左關洪數乃即腹癰之兆其治以未膿已膿分法漫腫堅硬肉色不變
是膿尚未成之候也宜託裏散仙方治命散 厥腫痛甚者邪氣實也宜仍用仙方治命散 此未膿前治法若腫起
而軟皮色紅是膿汁已成之候也急速其消宜託裏散 倘因氣血俱虛不即自潰或已有白頭宜急用 或未
有白頭宜急用 總當速令出膿切不可誤服剋伐涼藥致腫痛不潰潰不能斂甚而壯者弱弱者死蓋以
腹皮厚而脂膜脆使淹滯日久腫不即潰潰不即斂易至內腐洞腸見府為患不小故當其未膿必以扶
元解毒為主佐以行經活血之藥及其已膿亦必以健脾胃壯氣血為主佐以排膿斂口之方補湯全大
湯歸 此已膿後治法若發於小腹疼痛寒熱其名衝疽由心火炎熾流入腎經故疽發於腎部位也宜治
命或勝金丹 此證五日變色便可刺亦以速去毒膿速斂瘡口為主若失治必五十日死以小腹之為

地與大腹同一要害也

治腹少腹痛方三十八

厚朴溫中湯寒痛 炮薑二錢 厚朴 陳皮各錢半 赤苓 草薢 煨各七分 木香 炙草各五分 薑三片 棗二枚

四順清涼飲熱痛 大黃 當歸 赤芍 炙草各一錢二分 薄荷十葉

理中湯虛寒

六君子湯氣虛 人參 茯苓 半夏 炙草 陳皮 白朮

四物湯血虛 川芎 熟地 白芍 歸身

丁香脾積丸食積 三棱 蓬朮各一錢 青皮錢半 良薑 醋炒 各錢七分 皂莢一片 燒反 百草霜一匙 糊丸 麻子 丁香 木香 巴霜

平胃散痰濕 蒼朮 厚朴 甘草 陳皮

二陳湯痰濕 半夏 茯苓 陳皮 甘草

芎朮散川芎 蒼朮 香附 白芷 等 薑汁 磨木香 點熱湯調下 二錢

四合湯蘇葉 香附 半夏 各錢半 厚朴 枳殼 赤苓 薑 蘇葉 香附 半夏 各錢七分 甘草五分 薑五片

殺蟲丸蟲痛 烏梅 雷丸 蘇美 蟻 使君子 肉桂 桃

消血飲死血 紅花 元胡 歸尾 五靈脂 沒藥 桃

桃仁承氣湯

萬靈散當歸 一兩 生地 六錢 肉桂 蓬朮 各五錢 木香 三錢 每末 二錢 空心 酒 此方 兼治 婦人 少腹 痛 小便 淋瀝 是血也 氣也 熱也 或大小 產後 道經 敗血 所致

五積散寒痛 白芷 茯苓 當歸 半夏 炙草 加人參 白朮 陳皮 肉桂 枳殼

薑桂湯乾薑 肉桂 良薑 枳殼 陳皮 甘草 砂仁 吳茱 元胡 索 小茴 甘 砂仁 乳香

桂香散厚朴 乾薑 肉桂 良薑 炒 白朮 縮砂仁 炙草 煨薑 厚朴 棗肉 各一兩 青皮 訶子 肉桂 五錢 肉桂 二錢 半 水一椀 同煮 令乾 杵作團 碾研 粗末 每三錢 入鹽 少許 沸湯 點服 此

方治脾臟久冷腹痛 理不可知

最難得藥 此特能止痛 理不可知

身形 腹少腹方



北京中醫藥大學圖書館藏

定痛丸便各三升乾燭七錢半培為末以酒及童

藿香正氣散皮又厚朴白芷藿香紫蘇大腹甘草

調胃承氣湯積熱

木香茵陳湯酒積木香枳殼蒼術黃連

和劑抽刀散積冷白薑五兩入巴豆肉二錢二分半同炒黑去巴豆良薑五兩入班編二

和氣湯虛痞香附青皮甘草乳香沒藥

胃苓湯濕痛蒼術厚朴陳皮澤瀉

星半安中湯痰積木香枳殼滑石積殼青皮

二陳平胃散宿食茯苓枳實半夏甘草橘紅厚朴山查神效

黃連湯分降乾薑桂枝各八分甘草半夏二錢薑棗

木香順氣湯氣滯厚朴蒼術枳殼青皮砂仁

七氣湯絞痛人參元胡枳實半夏

腹疝湯五藏散木瓜羌活川芎伏苓紫蘇白朮地附子加蓋

香砂理中丸寒痛

黑神丸總治萌蘆巴石菖蒲各四錢皂

大陷胸湯下劑

溫補湯虛痛人參白朮川芎當歸白芍元胡索

溫氣湯實痛肉桂木香小茴香附

五苓散濕熱白朮肉桂元胡索

和血湯死血桃仁紅花香附



南京中醫藥大學圖書館版權所有

治腹少腹瘧瘍方

仙方活命飲腹癰 穿山甲炒黃 白芷 防風 赤芍 甘草 歸尾 花粉 貝母 角刺 各一錢

託裏散又 人參 黃耆 各二錢 白芍 各錢半 陳皮

黃連消毒散又 熟地 黃連 防風 酒生地 酒歸身 連翹 羌活 黃耆 各一錢 澤瀉 七分 黃芩 四分

甘草梢各五分 獨活 酒防已 桑本 蘇木 陳皮 桔梗 各一錢 酒知母 四分

託裏消毒散又 人參 鹽黃耆 酒當歸 炒白芍 川芎 甘草 連翹 各五分

替鍼丸又

十全大補湯又 人參 茯苓 白朮 炙甘草 川芎 當歸 白芍 熟地 黃耆 肉桂 川芎

託裏當歸湯又 當歸 黃耆 柴胡 甘草 熟地 川芎

勝金丹金瘡 麝香 輕粉 各五分 穿山甲 炙各三錢 雄黃 辰砂 乳香 沒藥 血竭 各錢半 天龍 炙去頭足 穿山甲 炙各三錢 僵蠶 炒五錢 每末三錢 砂糖 調葱頭酒下

奪命丹乳香 蟾酥 麝香 各一錢 砂三錢 將蠟牛泥為丸 量漆酒糊亦可 煮豆大 每用一九生葱二兩 根嚼爛手放心裏藥酒下行六七里汗為效 重者再服一二九此方能治諸般大腫毒

前陰後陰病源流

前陰諸疾肝任督三經病也內經曰足厥陰之脈入毛中過陰器抵少腹是前陰為肝木所過也又曰督脈脊起於少腹以下骨中央女子入係廷孔循陰器男子循莖下至纂與女子等是前陰又為督脈所過也又曰任脈起於中極之下以上毛際循腹裏是前陰又為任脈所過也惟為三脈所過故前陰之病皆係於三經而以三經為主焉夫前陰之病最重者莫如諸疝已另立篇於任脈病後茲不必贅茲故但詳前陰外見之疾一曰陰痿凡人色慾過度精髓耗敗傷於腎元遂致陰痿不起宜五又有精出非法或強忍房事有傷宗筋亦致陰痿不起宜上丹又有陰濕傷陽陽氣不能伸舉亦致陰痿不起宜九又有失志之人抑鬱傷肝肝木不能疎達亦致陰痿不起宜達鬱湯加菖蒲一曰陰冷大約下部陽虛陰寒之氣



南京中醫藥大學圖書館藏

凝結於腎致成此疾宜金匱腎氣丸加鹿茸又有命門火衰元陽虛弱常痿不起亦成此疾宜加減內固丸又有因寒疝厥

冷及小腸膀胱奔豚等證亦成此疾補丸又有因厥疝上逆囊寒卵縮亦成此疾宜吳茱萸湯又有陽氣拂鬱

卒然陰結亦成此疾宜助陽散一曰陰腫多因坐地觸風受濕或蟲蟻咬呵遂令外腎腫大莖物通明或

痛或不痛小兒患此者尤多宜散又有囊腫莖不腫不痛如水瘡之類當別新久新發宜三白散久者宜鱉板散

曰陰縱亦名陰挺由前陰受熱則玉莖挺長不收或腫脹而痿或與股相磨難行甚至兩脇氣逆上平足

倦弱宜柴胡清肝湯或小柴胡湯加黃連作大劑行其濕熱少加黃芩婦女陰挺則陰中突出一物如菌如

雞冠四圍腫痛由肝鬱脾虛下陷所致宜先以補中益氣湯加山梔茯苓川芎調理外塗藥膏或陰中

挺出一條長尺許痛墜且尿澀宜早服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗藥膏或陰中生一物漸大牽引腰腹膨痛由多服熱

藥或犯非理房事或意淫不遂所致宜二錢地黃湯下一曰陰縮凡人一身之筋皆以宗筋為主宗筋

在毛際繫陰器寒邪乘之則宗筋急而陰必縮經故曰足厥陰之筋傷於內則不起傷於寒則陰縮也宜

內消散陰囊之縮亦由於寒與傷寒熱病之熱入厥陰囊卵縮者有異蓋彼由於熱此由於寒也夫知陰囊

之縮亦由寒則可知陰囊之縱亦由熱矣婦人亦有陰縮之病則陰戶急痛引入小腹是也宜加味逍遙

散婦人一切陰戶諸疾詳後瘡瘍條中當參看慈不贅一曰脫陽證凡人大吐大瀉之後元氣不接

四肢逆冷面黑氣喘冷汗自出外腎縮搐不省人事須臾不救與傷寒陰陽易證同急服藥救之宜大回

此急證也不得緩圖

脈法 綱目曰腎脈大甚為陰痿

前陰屬宗筋 內經曰前陰者宗筋之所聚太陽陽明之所合也註云宗筋挾臍下合於陰器大陰脾

脈陽明胃脈皆輔近宗筋故云合也又曰宗筋謂陰毛中橫骨上下之豎筋也

後陰諸疾大小腸病也後陰即肛門亦為穀道而其病之最重而難愈者惟腸風及痔兩大端如脫肛肛

門瘻痛腸澼等亦皆後陰病而腸風藏毒已詳諸血篇腸澼已詳痢疾篇脫肛肛門瘻痛已詳大腸篇皆

可勿贅試專舉痔病言之仲景曰大腸有熱必使血小腸有熱必痔故痔非外邪成病乃由藏內濕熱風燥四氣相合而成故人門云腸頭成塊者濕也腸頭墜腫者濕兼熱也出膿血水者熱勝血也作大痛者火熱也癢者風熱也大便秘者燥熱也小便澀者肝藏濕熱也其分別原由致為詳細仲瀉又謂瘡頭何上硬者熱多瘡頭向下軟者濕多無非本於肝脾腎三經之虛又曰大便作痛者則潤燥除濕肝門墜痛者則瀉火除濕小便澀滯者則清肝導濕已成漏者則補精養血其言治法大概亦頗精當雖熱痔之病不同而痔之名亦不一有五痔壯痔牝痔腸痔脈痔血痔是也俱宜五痔有九痔牛奶奶雞心雞冠蓮花翻花蜂窩穿腸外痔是也俱宜槐角丸此皆古人隨證而定之名三因又即五痔而增氣酒痔瘻痔之名共有八痔痔之病雖多大約可以此八者概之矣且古人定名之義莫不各因其證之大小形似以為斷而要之毒深者其形大毒淺者其形小形雖異而實則同固非別有所感也故治痔之法總以涼血為主槐花槐角生地地榆所必用也又必和血生血故阿膠川芎當歸桃仁所宜用也又必寬腸行氣故枳實枳殼蒺藜米香所宜用也又必清熱故丹皮山梔黃芩連翹所宜用也又必逐濕故黃柏防已茯苓澤瀉所宜用也又必潤燥故麻仁大黃瓜蒌當歸所宜用也又必疎風故防風荆芥秦艽羌活所宜用也又必止痛故乳香沒藥雄黃黃連所宜用也雖應病之藥正多而治之之法不外是矣然而痔不分於大小要當別其內外八痔之名已足概痔之病而八痔之為內為外則有所當知者大約腸痔脈痔氣痔痔血酒痔此五者皆屬內壯痔牝痔瘻痔三者皆屬外何以見其然也腸痔結核肛內發則寒熱往來登廁肛即脫下血出宜獨虎散脈痔腸口痛發顫顫且癢且痛下血淋漓宜神應玉丹或氣痔憂愁毒怒適臨乎前立時腫痛氣散即愈宜加味香散血痔每大便有清血隨下如線而射出宜涼血地黃湯酒痔每過飲酒輒發痛腫或下血宜槐角元所謂內痔五種也壯痔肛邊發露肉珠狀如鼠奶時潰膿血宜加味槐角丸化痔肛邊一枚生瘡陷入宜良方五痔瘻痔浸淫濕爛歲積月累蟲生其間蝕腸穿穴與痔漏約略相同宜大補丸所謂外痔三種也即此八法以為治痔其無弗瘳乎雖然更有難治之法如內痔流血不止

痔病原由證治 內經曰因而醉飽筋脈橫解腸辟為痔三因曰腸辟為痔如大澤中有小山突出為

痔又於九竅中凡有血肉痔出皆曰痔不特於肛門邊者有牙痔眼痔鼻痔等類其狀不一故曰痔者

峙也漢避品名後諱醫鑑曰凡痔因酒色風氣食五事過度而變成二十四證歌曰痔證分三八馬

名仔細看莫教年月久見者膽心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸並鼠奶酒色兩相干莫順翻花惡

蜂窠亦不寬雌雄同氣血子母及腸盤元珠尤可怪釣腸痛若鑽核桃與流氣見者便心酸菓子手中

大雞心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出搭腸裏內蟠垂珠更難治日久有雞冠切莫輕

刀火令君性命殘用功無半月去病更除根東垣曰痔核已破謂之痔漏本草曰瘡痔亦謂蟲痔

日久蟲蝕其間痛癢不堪或肛門間射血如線乃蟲痔也蟲痔宜熏蠟皮艾八門曰痔疾有兼下疳

瘡者有莖中出白津者有兼瘦者皆肝腎不足變出勿單用寒涼正傳曰治法以苦寒瀉火芩連槐

子槐花之類以辛溫和血當歸川芎之類風邪在下秦艽防風升麻之類提之燥熱拂鬱大黃枳殼麻

仁之類潤之又曰初發便服槐角丸執實服湯藥疎利藏府及浴洗熏熨以取內消若變成痔漏須用

寸金錠子三五次全愈甲乙經曰久痔與陰相通者死痔漏成穴大小便相通者亦死綱目曰痔

根本是冷慎冷飲食及房事雞肉最毒而房事尤甚蕎麥麵亦須忌

前陰後陰近處所發瘡瘍有七種一曰便癰生小腹腿膝上下合縫之間直指所謂上不在腹下不在腿

介乎其中是也發於左名魚口發於右名便毒總名曰便癰又名曰騎馬癰此衝任督脈之墜道故為三

經之病又其處為厥陰肝經之路所在厥陰經少氣多血故此實為血疔有一邊發者證輕有兩邊發者

證重皆由房慾不節或淫心不遂敗精搏血留聚經隧所致亦有交合不潔淫火衝動膚腠開通一時受

毒而成者其來也不同其發也則一初起時寒熱交作結核腫塊四邊浮腫相併伏硬青黑或卒然而起

或先患下疳瘡而發一兩日內當先辨其有表裏證與否如有表腫痛發熱急散之宜制防敗毒如有肝

家燥熱急清之宜入正散甚者如有炊裏痛大小便秘脈洪實有力急瀉之宜龍膽如有小便不利肝脈

數急解之宜加味龍膽瀉肝湯或服射干散藥而致大便不利急培之宜十全大補湯如有表裏俱無但氣血虛弱急

補託宜參耆兼用排膿清肝火宜白芷角刺柴胡澤瀉山施甘草節潰後更須補養宜十全大補湯若不但氣血虛並遺精滑精太

便不利腰脚沉重此並下元虛矣急須溫補宜先用六君子湯加補骨脂肉此大概必用之法婦人亦遇

便毒於兩拘腫痛腹內有塊不時上攻小便不利屬肝脾氣滯宜四君子湯加芍藥歸山施識此而

便毒無難治矣二曰下疳生陰莖上屬肝經濕熱或陰虛火燥或交接過度或受不潔婦人汚穢之毒均

能致此而斯證之發又當以陰虛火燥為本腫痛寒熱為標試詳其治腫痛發熱者挾有表也宜四物湯

施腫痛寒熱者肝經濕熱也宜小柴胡湯加黃連澤腫痛便澀者濕熱壅滯也宜龍膽瀉肝湯腫痛腐潰者氣血

虛而有火也宜小柴胡湯加參朮歸身日哺倦怠者陽氣虛而下陷也宜補中經久不愈者腎水不能生肝木也宜六

筋縱癢痛出白津者此即筋疝也宜龍膽瀉肝湯或開服清心蓮子有肉突出久不愈者必成廣瘡也宜將

以防之有二便俱秘者火熱勝也宜入至外治法不過用藥水淨洗宜甘草再用藥或敷或搽之宜將

黃柏散散若至腐潰綿延痛在莖之竅或在莖之標則由小腸膀胱不利熱毒傳入肝經故色變

紫黑多潰蝕也若蝕盡玉莖則死劉涓子謂如遇此等證須用張子和泄水丸導其濕毒先洩其根次治

其標用葱白黑豆汁漂洗拭乾外以藥敷擦宜服泄水丸或內滑膿不出用追膿散仍用子和泄水丸按

消子此法甚善不可不遵三曰囊癰丹溪云囊癰但以濕熱入肝施治而佐以補陰雖潰脫可愈蓋此證

之生屬厥陰肝經不但濕熱下注亦由陰虛所致也故宜法稍毒為主兼用補劑若專攻其瘡致陰道愈

虛必生他患此囊癰所以為治大概然也若其詳悉為治又有可得舉者初起時但覺赤腫脹痛小便澀

滯寒熱作渴當即清肝火分消濕熱宜以黑龍湯如因人房太甚或淫邪不軌囊腫如斗小腹脹急小便

結澀寒熱大作口渴痰壅則危同反掌治之急急宜腎氣丸料滲利濕熱腫痛仍在者宜補陰託裏以速

其膿而鍼之若至便秘乃熱毒壅滯也宜託裏或不減是熱毒未解也宜清肝若膿已成急託膿解毒宜

命或潰後皮脫并罌丸懸掛其至脫出其玉莖半腐亦無害惟宜大補氣血大補脾胃宜託裏散加黃

兜絲子或四物湯外仍塗藥宜外自然平復切不可專用寒涼攻伐及滲利損陰乃促之死矣如皮脫者

以鮮荷葉包之其皮自生四曰陰頭癰生陰頭上屬厥陰肝經濕熱兼注腎經之病法與囊癰相似宜加

肝湯清肝外以蠶甲燒灰雞子白敷之自然全愈切不可用攻伐損腎傷肝之藥五曰懸癰陰囊之後宜加

道之前為任脈別絡督衝二脈之會其地肉理如縷毒生其間往往易潰難合若三陰虧損之人又挾濕

熱壅滯其地便生懸癰懸癰云者癰形倒垂如懸物也初覺腫痛或小便澀滯可藥以散之宜加

湯並加即或不散雖成亦輕雖潰亦淺其不膿不潰者可藥以補之宜加其膿成者急為鍼刺如不能收

斂或因腎虛宜腎或因血虛宜四物湯或因氣虛宜四君子或因脾虛宜補中各隨其虛而補之自然毒

散肌生久成漏者亦當藥以補塞宜十全大補始終宜服國老膏若誤用寒涼消毒之劑必致不能收口

滲盡氣血而死重則肉潰即殞最輕亦成漏管六曰痔癰生穀道左右初起急宜發穴宜發破後急用排

膿宜抽膿膿盡急當收口宜精義桃花始終服藥以大補脾藏為主亦不可遷延時日使成漏管七曰肛內

癰俗名盤肛癰生肛門口乃蘊積熱毒於大腸之間或多食煎煇毒物或濕熱流往日深皆致此證初起

亦可消散宜仙方若既潰破惡腐爛難堪必致殞命也大約此證必以驅毒為急宜肛內清熱次之宜槐

母輕視也陰瘡此瘡有四種一濕陰瘡其原因由腎虛風濕邪氣乘之瘡瘡成瘡生於隱處浸淫汁出狀如

疥癬宜治血風二妬精瘡由壯年久曠房室大慾不遂敗精流入草內陰上生瘡亦腫潰爛作白痛瘡

妨悶其初發則如粟粒拂之即痛或流清汁并有生於玉門內極似疳蝕瘡但不痛為異宜涼血三陰蝕

瘡由熱結下焦經絡澀滯或婦人子宮有敗精傳留或月水未斷即與交合交合後又不洗沐污穢沾滯

遂令陰莖運塞丸腫痛小便如淋此所以成是瘡也宜消癰敗毒散涼血解毒若不早治經久潰爛侵蝕

肌肉膿血不止即為下疳又不愈必為楊梅瘡宜服藥預防宜仙道瘡毒散而下疳治法已詳於前今不

另贅然則下疳固有不由於陰蝕瘡始者而陰蝕瘡既久未有不成下疳者也四腎藏風瘡由腎虛有火

血燥所成初起兩足時熱脚根作痛多於內脛或臍上生瘡如癰大瘡搔破成瘡失治漸延腿股并遍身

身形 前陰後陰瘡瘍

七

中醫藥大學圖書館藏

者有之其證或兼晡熱盜汗口燥咽乾吐痰體瘦腰脚倦怠總以補腎為主宜腎氣丸為主脾胃虛者必

須補脾養胃宜補中益氣湯為主外敷藥香散追至瘡生遍身膿水淋漓火雨腿更甚體倦作癢難

熬或至經年不愈乃腎中虛火炎熾也宜八味丸外傳患此證者每兼耳鳴目癢鼻赤脈浮指縫白色

等恙宜補丸另有下疳瘡與腎藏風瘡相類生於脚脛或打撲而成其瘡口小皮內潰得極寬皮之腐却如

竹膜極癢而痛黃水時流經年不愈又易染他人須忌房慾宜治血驅風散婦人血風瘡亦與腎藏風瘡

相類乃三陰經風熱鬱火血燥所致瘡瘻不常膿水淋漓潮熱盜汗宜當歸拈痛湯世俗竟以陰囊瘻瘡

為腎藏風真屬大謬蓋陰囊瘻瘡者由於精血不足內為色慾所耗外為風冷所乘風濕毒氣乘虛而入

囊下濕瘡或生瘡皮脫下注則兩脚亦生瘡癰或耳鳴眼昏宜沐浴長春散外塗此不可不知分別至婦

女亦有患陰瘡者其為類亦不一大約陰戶生瘡皆七情鬱火損傷肝脾又兼濕熱下注也故婦人陰內

亦有下疳瘡以月後便行房事穢濁伏流陰道遂生疳瘡與男子疳精瘡略同用黃丹枯礬磨膏藥本各

一兩硫黃荊芥蛇床子各五錢蛇殼一條煨共為末別煎荊芥蛇床子湯洗拭香油調塗之婦人又有陰

中蠱瘡少陰脈滑而數陰中或痛或癢如蟲行狀膿水淋漓亦有陰蝕幾盡者皆由心神煩鬱脾胃虛弱

致血氣留滯耳當補心養胃宜補心湯養香養外以藥洗之宜蠶黃散甚或生蟲瘡不可忍發寒

熱若蝕入藏府即死急用蛇床子湯洗拭外以藥擦之宜銅綠散或用梓樹皮焙作末枯礬四分之一麝香少

許敷之立效婦人又有陰蝕瘡腫痛濕瘡常出汁水宜洗瘡湯婦人又有陰腫因胞絡素虛風邪客之乘

於陰部血氣相搏之故若氣血虛弱則補之宜補中若肝經濕熱則清之宜龍膽或陰腫痛極便秘欲死

外用加味逍遙散或腫痛陰戶不閉寒熱尿澀宜加味通淋散或腫已消而陰戶仍不閉宜補中或時常陰

中作痛宜四物湯或但腫作痛宜四物湯加柴胡或不用而小水淋瀝腹中如有一物攻動而脹痛宜

造散加柴胡或腫痛而至潰爛宜或憂思過度腫痛而又濕癢出水宜歸脾湯加柴胡山

腫痛手足不能舒伸宜四物湯入乳香末總之陰戶腫痛薛氏謂即婦人便毒方書謂之疙疙俗名瘡

子故其腫痛有在兩肋小腹者由肝經濕熱壅滯宜龍膽瀉肝湯有在玉門內外腫脹者由肝火血虛宜龍膽瀉肝湯

道及加味陰腫之為病為治不同如此若概投散血攻毒之藥其可乎婦人又有陰癢大云婦女陰癢

者是蟲蝕所為三蟲在腸胃之間因藏虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作微則癢重乃痛按此陰癢之蟲當

屬肝風內煽所化與陰瘡之蟲有異故治法亦必以清肝為主以清其內宜柴胡清肝湯外用藥納陰中

制其蟲宜桃仁泥或雄黃末或雞肝細陰中且陰癢而有蟲止是一端有癢而竟無蟲者或由鬱怒傷於肝脾致陰中

必兼胸膈不快內熱作渴飲食無味肢體倦怠小水赤澀宜歸脾湯加山花或由肝脾氣虛濕熱下注致

陰內痛癢不時出水食少體倦宜歸脾湯加山花或由肝脾鬱怒元氣虧損兼有濕熱致陰中癢痛內

倦急飲食少思宜參苓歸芍者木升柴此皆但癢而無蟲者也亦有下疳痛癢難當腐爛生蛆所下如棉

汁臭穢及心中疴痛悶絕虛煩甚者則不治婦人又有陰冷由肝經有濕熱風冷又外乘之也如冷而

腹痛痛小便赤澀宜龍膽瀉肝湯如冷而內熱寒熱經候不調宜加味如冷而寒熱體倦飲食少思宜加味如

冷而鬱怒發熱少寐懶食宜加味如冷而口苦脇脹寒熱小便黃澀必先祛利濕熱宜龍膽瀉肝湯再調補氣血

味道如冷而寒熱脇脹嘔吐苦水兩股腫痛小便赤澀宜先用小柴胡湯加山花如冷而小便澄清腹中

亦冷飲食少思下元虛冷大便溏泄宜八味丸服或又謂陰冷之證因勞傷子藏風冷客之之故此亦有

然也婦人又有陰癢硬腫如卵狀極痛難忍皆由濕凝血結之故宜用攻散之劑宜隨證之左右取穿山

錢二婦人又有陰吹由胃虛其濁氣下泄注於陰中甚喧若放屁連聲不絕者宜亂髮洗淨雞子大三錢

下婦人又有交接出血陰痛乃房事有傷肝火動脾而不能攝血也宜補中益氣湯若血出過多而見他證只當

調補肝脾或交接時陽道違理及他物所傷犯血流滯不止宜益血底或重女交接陽道違理血出不止宜

反青布婦人又有陰痔凡人九竅有肉突出者皆名為痔今陰中有肉突出故即名陰痔俗謂之茄子疾

往往心躁如連綿黃水出者易治自水出者難治宜枳殼末煎湯熏洗將帛婦人產後又有陰脫由努力

太過如脫肛狀逼迫腫痛清水續續小便淋露急用補託宜黃耆歸外以藥敷子二錢半為未傳患處即鼓

身形前後陰瘡瘍

婦人又有陰挺已詳前陰後陰病篇中不贅又曰腎癰腎居少腹之後屬膀胱分野陰中之陰也道則遠位則僻雖膀胱經本屬多血然氣運不到血亦罕至比之他處尤為吃緊中年以後最忌此處生癰若參之脈證見有虛弱便當大補氣血方可保全若用尋常瘍科家驅熱解毒之藥恐擔延事勢虛處之禍不免故初起未成膿者用隔蒜灸法庶乎可散若欲作膿則必潰矣宜內託羌活湯痛甚若腫硬作痛形氣虛邪氣實也宜託裏消毒散若至潰後尤宜補養宜加味十全湯以固其根本倘失補養其患尤在結痂之後設使變證多端則成惡候其或胃氣脫陷腸鳴腹痛神昏便溲所謂寒變內陷緩則不治者有之中瀉其或脾胃虛寒手足厥冷飲食不入嘔逆吐瀉者有之宜附子其或直陽虧損或誤下或膿血過多失於補託致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈者有之附瀉其或氣血虛胃火盛而發渴者有之宜加減其或中氣虛諸或命門火衰不能生土致脾胃虛寒不思食食不化臍腹痠痛夜多漩溺者有之宜加減其或中氣虛諸藥不應或用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此補中氣諸證自退者有之宜參其或元氣本弱又因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等恙者有之宜託裏其或脾土素虛且寒水反侮土致飲食少思睡卧不寧盜汗不止者有之宜託裏其或一切不足之證不膿不潰潰後發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡卧不寧盜汗不止者有之宜託裏其或六鬱內傷脾胃受制飲食不進倦怠不安者有之宜託裏其或毒邪深固色變紫黑者有之宜回毒金其或腎水竭口燥舌乾者有之宜五味其或執毒上攻致咽喉口舌生瘡者有之宜解毒其或潰破後毒熱未退大痲不止日夜坐卧不安者有之宜止痛以上種種皆屬惡候其方藥亦隨證施治無不各當者但種種惡候一切癰疽腫毒皆能變生至此不獨腎癰為然也雖詳於此固貴當局之通變耳總之腎癰一證必旬日收斂方保無虞若不慎房室不節飲食綿延成漏則為終身之患至腎癰之屬有驕馬墜生垂珠左右兩處此處微竅皮薄而紋緊口亦難合易成漏管初起急宜消散宜散毒有腠腠近骨難愈防成漏管有銳疽生腎尖上瘍科書所謂發於尻者是也其狀赤而且堅不急治三十日死有穿檔發生背脊盡處亦易成漏當急治有扼疽俗名秤鈎瘡生骹骨上初發如小豆後大亦不過如櫻