

瘧

竇材治一人病瘧月餘發熱未退一醫與白虎湯熱愈甚竇
曰公病脾氣大虛而非寒涼恐傷脾胃病人曰不服涼藥
病何時得退竇曰內經云瘧之始發其寒也心火不能止
其熱也水水不能遏當是時良工不從指其手且扶元氣
待其自衰公元氣大虛服涼藥退火吾恐熱未去而元氣
脫矣因為之灸命關絡五七壯脇中有氣下降三十壯全
愈

張子和曰有一書生瘧間日一發將秋試公試之乃瘧之

子和治陳下一人病瘡三年不愈止服溫熱之劑漸至衰羸
求張治張見其羸亦不敢便投寒涼之劑張公原乃取內
自細心經刺瘡論詳之曰諸瘡不已刺十指間公血心當發時令
刺其十指出血血止而寒熱立止咸駭其神

故息城一男子病瘡求治診之兩手脈皆沈伏而有力內有
積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作痛積亦痛
形如覆杯間發止今已三年祈禳避匿無所不至終不能
療張曰此瘡瘻也以三花神祐丸五七十丸以冷水送過
五六行次以冷水止之冷水主收斂故也濕水既盡一二日
煎白朮湯作損毀之瘡猶不愈候五六日吐之以常山散
去冷痰涎水六七次若翻漿次柴胡湯和之間用妙功丸

磨之瘡悉除

吳開內翰致和丁酉居金椒縣歲瘡大作過寒多熱少飲食
不思者用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為末每服五錢
用猪胆汁調成膏子臨發時熱酒調服以胆汁和丸每服
四十丸酒下亦佳凡救人以百計張大亨病此甚歎致和
亦服之而愈大抵寒發于胆用猪引二薑入胆去寒而燥
脾胃一寒一熱所以致也

朱氏集驗方

本草綱目

野史云盧絳中病瘡瘡疲瘡忍憂白衣婦人曰食蔗可愈及

旦買蔗數挺食之翌日疾愈

本草綱目

阿魏亦非純品
用之宜慎

厭勝一端

次散是散

大似薛安

愈世人治瘡惟用常山砒霜毒物多有所損此方平易人

所不知草窗周密云此方治瘡以無根水下治痢以黃連

木香湯下瘡痢多起于積滯故耳王珣百一方全上

顧寶光善畫陸溉病風瘡久不療光寶嘗詣溉遂命筆圖一

獅子像于戶外云旦夕常有驢至夜聞憲窸之聲明日視

獅子口有血淋漓溉病遂愈姑蘇志

張守淳冬月患三瘡散一月延王孝父診王搖首曰更十

日則不治矣必用參附乃可小減其父瞿然爾舌不敢應

王力持前說服參附各一銖乃至二銖瘡粗損六七明年

初夏始愈筆談

龔子才治一婦人瘡久不已發後口乾倦甚用七味白朮散

加耆冬五味作大劑並与恣飲再發少可乃用補中益氣
湯加茯苓半夏十餘劑而愈凡截瘡常以參朮各一兩生
薑四兩煨熟煎服即止或以大劑補中益氣加煨薑尤効
生薑一味亦効

孫文垣族子應章三陰瘡發於子午卯酉日

皆人謂為三陰瘡

越月矣每發于夜熱多寒少左脉微弦右关滑大以二陳
湯加柴胡黃柏以芎藭歸黃連兩帖熱少輕飲食不進四
肢懶倦脾氣大虐以白朮何首烏各三錢蟹甲二條青皮
七分烏梅一个一帖而截

尺弦數有力用白芍當歸各一銖白木二銖柴胡川芎甘

草砂仁桂枝酒芍各三分生薑三分水煎服再以首烏蟹

甲白木各三銖柴胡一銖青皮酒芍各五分烏梅一个生

薑三片臨發五更服兩帖而止後半月下身大發瘡癰伏暑

未盡方中欠以東坡神丹調理而愈

仲周姪孫赴府三日一次發于夜次年仲春猶未止遍身

疼痛背脊疼灸之僅止一日後仍發面青肌瘦此邪在足

太陽經以通身及背脊疼也用麻黃一銖五分人參桂枝白芍甘草

知母各一銖陳皮貝母各七分薑棗並服痛減半瘡未止

以首烏白木各五銖青蒿一銖烏梅一个陳皮二銖薑三

片水煎臨發之日五更服尋常以六君子加黃耆五味烏

梅草果調理而愈

姪孫二水年三十體肥夏月常浸溪中卧松陰下至八月大
發寒熱自巳午至天明乃退飲食不進嘔吐黃苦胆汁胸
膈脹悶舌上乾燥生芒刺沈香色弦硬以冷水頻漱乃能
語言惟啖西瓜生藕先發熱之日吐血一口今則大便下
血且咳嗽此溫瘧症也由醫解散遽用黃耆以閉邪氣致
成大困用柴胡知母各三銖石膏七銖葛根三銖橘紅竹
茹各一銖五分酒芍枳實各二銖甘竹貝母各五分三帖
吐止改用二陳湯加柴胡枳實黃芩黃連花粉鹽甲白朮

汗回而發熱三日變成瘧疾脉之豁大空虛且寒不成寒
熱不成熱氣急神揚知為元陽衰脫之候曰謂來日瘧發
慮大汗不止難于救藥防危不以為意次日五鼓時病人
精神更覺恍惚扣門請救人覓參致瘧已先發矣又恐人
參補住瘧邪雖急救無益也此語未善瘧未發時豈無姑
邪耶要之發時不當藥耳
俟瘧勢稍退方與服之服時已汗出沾濡頃之果大汗不
止昏不知人口流白沫灌藥難入直至日暮白沫轉徙大
孔流出乃喜曰白沫下行可無恐矣但內虛腸滑獨參不
能勝任急以附子理中湯連進四小劑人事方甦能言但
對面談事不清門外有探病客至渠忽先知家人驚以為
祟曰此正神魂之離舍耳今以獨參及附子理中駒馬之

力追之尚在半返未返之界以故能知宅外之事再與前藥二帖而安

裕民坊民家淘井得一瓦枕之上有一符之下有驅瘡二篆字相傳為諸葛武侯所製病瘡者枕之即愈彼此轉相借用遂為隣人所匿因訟于官亦不能得續定陵瑣事

陸養愚治崔監院八月間患瘡日一發治療十日不愈崔曰此病或並藥一二劑或丸藥一服未有不止者今服藥一二十劑而病發轉劇何醫之無良也醫者承風進診問曰前日內外之邪尚重未敢即截今邪已去可以截矣曰進

戴陽二汗泄不止自熱如火其脉洪數無倫沉按則駛瘡

時脉亦曰此熱瘡也與三黃石膏湯乃謂瘡門不載仍進

前九藥一服嘔吐不止至巳午時瘡發更甚熱竟日不退再

召診曰思兩番九藥胃氣重傷且脉較前更弱不可純作

實熱治矣以白虎湯合建中生脉之半投之一夜二劑嘔

噦即止明日瘡不發矣以清氣養榮湯調理而安按面戴

無偏次則似理中症矣乃作實熱而與三黃石膏其說不無可議

朱遠齋醫名藉甚與陸莫逆交歸安令聞其名屢召不赴借

事繫之獄欵斃之杖下邑紳十餘輩為清竟不釋其妻奔

涕求救陸亦無計可施適按臺巡湖患瘡醫治無效召陸

診視其脉兩寸關浮數微弦按之極弱兩尺沈按緊小其

症不發時亦倦怠身常熱有汗飢而否悶不敢食小腹脹
急大便欲行不行者已七八日發時戰慄身極熱煩渴躁
擾且急甚前醫初與發表後以否悶用二陳青皮草果燥
熱之品常山亦私用而不應審其平日極喜厚味病後禁
絕^惟啖乾糕數枚夫滋潤不進腸胃已乾重以風熱燥劑
之劑安得不否滿燥結乎因思此症乃腸實胃虛若以丸
劑通其下結以煎劑補其中虛可立已然必徐為之方可
為遠齋地乃曰病無大害第勢正猖獗必數日方可哀其
半十日則全愈矣促進藥曰此時病將發經云無刺熯

近來時臣多

藉閑說睡

陸君為友人

言安畢出脫與

差千迴別目

錄之

以蜜導出燥矢數枚次日瘡減十之三再進前湯二劑已
減十之六七日乘間曰疔雖減而脉似未減此餘邪未盡
恐後時有變某有師兄朱如玉術高某百倍若得此人商
治百無一失奈渠得罪縣尊現在監禁按臺隨令捕官著
歸安縣請朱朱得免及進視論病如見目用潤字丸三錢
先服隨以前湯方加生脉散是夜下宿垢極多明日瘡止
矣

陸肖愚治沈後庵年五十七月間患瘡日一發或兩發服藥
不効用凡藥截之嘔吐竟日次日瘡不作矣然飲食日減
倦怠嗜卧至八月中復發寒熱一二日復仍以丸藥截之
遂嘔瀉數日不止飲食不進即湯水亦盡吐出身熱戴陽

手足心陽明實
利即愈故治瘡

語多譖妄醫尚擬用二陳五苓反診其脈浮而微細如絲
乃謂曰疾亟矣兄藥寬緩恐無濟今當用附子理中以冀
萬一耳彼醫心不然之又病家見用附子大駭陸遂辭去
彼醫療治兩日而殂

妄截致害之鑒

陸祖愚治朱明宇因暑月飲水無勞過度飲食失節常徹夜
不眠偶赴酌歸感寒頭疼身熱胸膈不快自用葱薑表汗
轉成瘡疾間日一發醫用枳榔柴胡草果青皮乾薑羌活
之類投之輒吐及瘡發呻吟煩躁益甚日久漸危脈之氣
口沈實有力膈之上下手不可按六七日不大便口乾煩

順下丸四鈔投之。渴則以前水飲之。薄暮沉睡。至四鼓腹中響微。作痛下燥矢七八枚。後又連行三次。去稠膩甚多。是日微發熱。懈怠。乃用歸身茯苓知母貝母前胡花粉人參甘草等味調理數日而安。

吳抑之少年稟弱多。醉勞患瘡。間日一作醫峻以參朮大補。家人又以參粥食之。遂否。因發狂煩躁不寐。脉之左三部弦細而數。右寸關浮。弦按之有力。右尺似有似無。其氣血固虛。而風寒積滯則實也。用柴胡乾薑黃芩山查厚朴青皮陳皮半夏一劑。胸膈畧舒。教劑譖安。煩躁悉除。瘡發於陽分矣。其鼻乾唇裂不眠。腹中梗塊作痛。皆陽明大腑未清也。改用枳實熟黃山查甘草加錢歸水一服。即下宿垢。

與後張三陽引
準通一案大同

十餘枚諸症頓減但真元衰弱瘡猶未已以當歸人參白
朮茯苓甘草柴苓麥冬二母數劑而愈

李士材治楊太史瘡發間日脉見弦緊兩發後苦不可支且
不能忘口便求截之曰邪未盡而強截之未必獲効即使
截住必變他症不若治法得所一二劑間令其自止升麻
柴胡各二銖提陽氣上升使遠于陰而寒可止黃芩知母
各一銖五分引陰氣下降使遠于陽而熱自已以生薑三
銖劫邪歸正甘草五分和其陰陽一劑而減半再劑而竟
止

惡寒脉浮而大表症方張此非失汗必悞截也果服截瘧
丸而增劇此未解而遽止之邪不能伏教以八劑四日服
盡決効矣石膏黃芩各三銖抑陽明之熱使其退就太陰
白豆蔻三銖生薑五銖救太陰之寒使其退就陽明脾胃
為夫妻使之和合則無陰陽并亂之患半夏枳櫛各一銖
五分去胸中之痰蘊葉二銖黃越太陽之邪葛根一銖此
入陽明之路有三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服四劑
補中益氣湯服十劑而瘧

沈相國患瘧吐衄不思食六脉沈細李曰瘧傷太陰中寒
蛇動也用理中湯加烏梅三個黃連五分進四劑後胸中
豁然寒熱亦減蛇亦不吐去黃連加黃耆二銖生薑五銖

五劑而瘡止蓋病人素有寒中之疾雖盛暑寒冷不敢治
唇故瘡發而蛇動也

陳眉公三日瘡決歲未瘡素畏藥餌尤不喜人參其脈浮之
則濡沈之則弱營衛俱衰故遷延不已因固請曰素不服
參天畀之豐也今不可缺者病魔之久也先服人參鈔許
口有津生腹無煩滿遂以人參一兩何首烏一兩煎成入

薑汁鍾許一劑勢減七八再劑瘡遂截

與景岳何人飲意同

臣通

一士人病瘡久不愈有道士來以枣一枚按病人口上呪曰
我從東方來路逢一池水水內一尊龍九頭十八尾問他