

清・高文晉 編

外科圖說



清・高文晉 編

外科圖說



外科圖說・解題

清・高文晉編。成書於道光十四年（公元一八三四年）。

高文晉，字梅溪。華亭（今上海市松江）人。

是書爲外科著作。此處所錄爲卷六的『煎藥法』、『服藥治法』、『服藥有法』、『用藥加減法』、『泡製法』、『附子不可輕用』諸論。

今據清·咸豐六年（公元一八五六年）刻本影印。

（王咪咪）

煎藥法

一凡煎藥必須親信恭誠令老實人致意洗淨藥罐務用新汲甜水爲上量藥及水大小斟酌以慢火煎熬分數用紗絹濾去渣取清汁服之無不効也不可近於燈油之下又不可以他病藥確同放一處恐誤服之况煎藥之人不可坐務立之酸物按藥則藥味甘甜物按藥則藥味苦又不宜服冷藥脾喜熱冷則不能運行

服藥治法

卷六

重

一在上不厭頻而少服則滋榮於上在下不厭頓而多多服則峻補於下

服藥有法

一病在頭面頸項臂膊者先食而後藥病在胃膈心下肚腹膀膝者先藥而後食病在四肢者陽中之陽須服藥於旦病在骨髓者陰中之陰須服藥於夜

藏蓄膿水紙法

一指膿水垢紙必須入一竹籃中掛透風處但蒸肉化膿此乃人之氣血所干者日中晒之則瘡口

痛放在濕處則膿水不乾待平愈後用乾柴一束燒之

自保護法

一瘡瘍之症穢氣甚臭聞之則惡心難忍毒深者深能染人須自寡慾節勞以養元氣但正氣盛則邪氣不能侵臨看之際先用綿紙塞鼻孔須食薑蒜燒酒并充飽之物以蔽穢氣切不可空心視之用藥加減法

一古人處方立法本自不同藥不執方合宜而用旋爲加減量老少虛實斟酌下藥切不可膠柱鼓

卷六

美

瑟凡引經之劑再不可缺少隨機應變之法當以意消息之

割取腐肉法

一凡取腐肉先用猪蹄湯洗淨以去其垢方見新舊之肉看其果腐爛者用鈎摘定輕手徐徐忍臭氣割之切不可誤傷新肉以致鮮血淋漓切勿急驟多加工夫割取畢摻海浮散外用膏藥貼之明日如前凡患背瘡切不可容他仰臥若仰臥則瘡頭陷矣其欲生也得乎

蜜導法

用白蜜四兩火上煎熬四五沸其色黃取出乾磁盆內待其將凝急分四分每分手搓作棗子形狀長一寸其蜜導頭須要光滑恐傷肛門用油潤之徐徐塞入少頃再加一條旋增以去後爲度

膽導法

用猪膽一枚膽口中放蘆管一枚其一半蘆管入肛門逞勢一捻其膽汁衝入肛門大便卽行矣

禁忌食物

騾驢牛羊雞鶩猪頭蹄爪猪小腸及諸物首足翅掌獐兔猫犬諸獸鴛鴦野鴨諸雀異鳥蝦蟹鯉鮎

卷六

五

魚鱸鰕魚無鱗魚異名魚葫蘆茄子大蒜甜菜菠菜芹菜萱草蕎麥蒿笋荳腐麩粉胡桃大栗銀杏桃李楊梅李子櫻桃蒲萄胡椒花椒醋薑糟物煎炒炙燂燒酒醢酒等味及生冷發風動氣之物推類詳之

泡製法

用方最要如泄瀉冬朮炒焦氣虛不食黨耆炒焦失血每味俱炒焦或用墨汁拌炒或童便浸炒劣性藥品同糯米拌炒臨證隨機活變故濕熱癰毒多用醋炒羚羊片

人參

去蘆飯上蒸

陳皮

去白飯上蒸

半夏

滾湯泡浸去皮再用生薑汁浸或菜油拌炒大能豁痰

黃芪

去根或鹽水拌或蜜炙

白朮

米泔浸炒或用陳壁土炒

茯苓

去粗皮赤白二種隨症用

甘草

或生或炒細小者能治小便痛

當歸

酒洗

川芎

大者細者小者又有種西芎傷寒科可用餘不可用

卷六

美

白芍藥

或生用或白炒或酒炒

赤芍藥

台朮

去梗微炒

淮生地

酒洗不犯鐵器

淮熟地

酒洗同上

升麻

去須

乾葛

切片取末白者佳

鬱香

水洗去泥土味香者真

白山藥

微炒

防風

去蘆

荆芥

去梗取穗

羌活

去泥土并蘆

獨活

去蘆

薄荷

去梗

黃芩

去蘆水煮二沸上部用酒拌炒

條芩

酒煮堅實者是胎前用

桔梗

去蘆頭炒

天花粉

白色者佳去油色

玄參

去光根

白芷

水洗不宜見火

蒼朮

未泔浸後用鹽炒芽山者佳

厚朴

紫實者佳姜汁拌炒

紫蘇

葉梗紅色者佳

前胡

去蘆

硬柴胡

去蘆

軟柴胡

去蘆水洗

麥門冬

水洗去心

天門冬

水洗

杏仁

湯泡去皮尖并雙仁不用

桃仁

去皮尖并雙仁

黃連

去苗或用酒或薑汁拌炒

黃柏

去粗皮鹽酒拌炒褐色

知母

酒拌炒

山梔

去殼薑汁拌炒大者名伏尸不用

猪苓

酒拌炒

澤瀉

炒

五味子

去梗槌碎

吳茱萸

鹽水煮三四滾取出曬乾再炒法梗

山茱萸

去核

枳實

同麩皮炒

卷六

五

枳殼

去穰同麩皮炒

烏藥

不見火

青皮

同麩皮炒

秦艽

酒拌曬土

官桂

味濃肉厚者名肉桂形薄味淡者名薄桂能行經絡

桑寄生

忌火

續斷

去蘆

鼠粘子

即牛旁子炒研用

龍膽草

酒拌炒須洗去泥土

紫蘇子

去泥土微炒研末

蔓荊子

炒

麻黃

湯洗去沫

南星

白礬皂莢同煮

貝母

法心

連翹

去梗碾

金銀花

瞿麥

白蒺藜

去刺炒

紅花

牡丹皮

水洗去

地骨皮

去梗水洗

阿膠

蛤粉炒

百合

水洗

茵陳

去梗不見火

紫苑

去根

牛膝

去老梗酒洗

杜仲

去粗皮鹽酒拌炒斷絲

板榔

微炒

大腹皮

黑薑汁煮臍乾再炒

玄胡索

微炒

香附

鹽炒黃或川童便醋水浸任用

辛夷

去蒂

蒲黃

炒或生用

荀子

炒碾碎

羌鈴

去筋膜

江子

去殼去油即巴豆

乾薑

或煨或灰用

木鱉子

去殼

皂角刺

酒拌炒

卷六

卒

皂莢

去絲筋

猪牙皂角

炙

砂仁

微炒研末

木香

不見火

肉果

糯米粉梗攪包火內煨熟麩亦可剉片紙包打去油用

天麻子

去殼

苦參

酒拌炒

冷飯糰

米泔洗木槌碎之忌鐵白者佳紅色者能殺人

萆薢

炒黃色

山查

研碎炒磨末去子

神麴

炒黃色

麥芽

炒

白扁豆

香薷

滑石

碾末水飛

大黃

或生或酒煨或鹽水浸煎

寒水石

或生用或煨

車前子

炒

遠志 甘草水浸去骨

細辛 不見火

藁本 去蘆不見火

石斛 去頭上酒浸一宿晒乾

赤根 卽麻黃根止汗

天麻 明亮者佳

三稜 醋拌炒

蓬朮 醋拌晒炒

附子 炮

白朮 川廣者佳

白薇

何首烏

威靈仙 酒洗忌茶

牽牛子 去皮取末

燐蠶 炒

薑黃

槐花 炒

牛膠 或生用或燉皮炒

五加皮 酒拌炒

丁香 大者爲母丁香去蒂

卷六

空

淡竹茹 淡竹先刮去青用第二層

海桐皮 不見火

益智

甘菊 眼科用酒拌晒

射干

薏苡仁 炒

木瓜 紅色者佳

瓜蒌仁 去殼

地榆 水布搽淨

牡蠣 大殼童便浸再服

川烏 炮

菖蒲 九節者佳

蟬脫 水洗去土

款冬花 去梗

茴香 忌火

麻子 研

酸棗仁 去殼取仁微炒

茯神 去皮木

白鮮皮 去梗

川槿皮 去粗皮

桑白皮

去黃皮炒

甜瓜子

微炒腹中
不可缺

枇杷葉

布搽去毛

艾葉

去梗

玄明粉

即皮硝冬天用白葡萄酒三四沸取出傾入
缸內夜露早晨取明亮者另入一器風化

用其汁再
如前取之

芥菜子

曬乾碾

鳳仙子

微火炒

黃蜀葵子

微炒

馬鞭草

去老根

稀荑草

去梗

麝香

不宜見火藥店上多將泥土
及荔枝核炙焦研末和之

鹿角

火燂

犀角

鎔或用
水磨

羚羊角

鎔

冰片

客商多有番硝和之火上
燒火起是硝香者片也

卷六

室

雄黃

夾石者
不宜用

硫黃

青色者
不宜用

牛黃

口中苦後
香甜者真

珍珠

入豆腐煮
一伏時

輕粉

明亮輕
淨者真

五倍

去內蟲窠

絨灰

有羊絨大紅絨
灰搽藥內用

人中白

服

雞內金

即雞胞內黃皮焙乾
研末或烺灰存性用

白礬

或生或
火煨

韶粉

即面粉

樟冰

風子

去殼取肉

乳香

藥葉上慢火炙黃同滑石
研方細冷有假者似之

沒藥

血竭

香紅色者真
腥氣者假

孩兒茶

蟾酥

葦荳粉

微火焙乾水

辰砂

水飛

靛花

散者佳成欄者

膽礬

穿山甲

灰火內炮

昆布

水洗去沙土圍藥

海藻

水洗去泥土川烏

續隨子

去殼去油

琥珀

拾得芥

銅青

火上微煨

金箔

多有假者

赤石脂

粘唇者佳

蛤粉

紫山蛤蜊

礪砂

去石即

龍骨

火煨

海螵蛸

去塵土

鱉甲

或煨或

龜甲

童便浸七日長流水

花藥石

大煨醋淬

象皮

剉片火炙

丁皮

不見火

橘葉

洗淨剪碎

橘核

皂莢子

澤蘭

旋覆花

去蒂

谷精草

細茶

去梗

天竺黃

今有假者以化

蘆薈

水中兩塊相

草決明

石決明

冬青子

飯上蒸

白沙參

紫花地丁

附子不可輕用

附子味辛甘氣溫大熱有大毒製法以童便煮而

卷六

奎

之再用文武火以烈其毒且可助下行之力入鹽尤捷此佐使之藥通行諸經其性善走而不守浮中沉無所不至陽中之陽故行而不止用之得宜有奪旗斬將之功用之不宜有殺身殞命之禍每人參一錢爲君止可下附子一二分爲使再加甘草以解其毒內外之症遇嚴寒時候瘡口沉塌四肢厥冷寒濕疼痛踠躄拘攣膝痛不能行步腰脊風寒伏陰傷寒方可下附子不審陰陽虛實一槩用之使人服後火鬱中焦氣鬱下焦咆哮喘急頃刻而斃凡用附子者豈可不細審乎

卷六

畜

解附子毒令多汲新水連飲數碗遂大嘔洩方解其毒此又不可不知也

但醫術淵奧皆臻要妙之門方法宏深盡藏幽微之理噫余非敢誇言立論但志在養生心存濟物况子幼家貧若此書秘於一家則公人之念泯矣遂校正之增衍以待來學