

52541

644.

傅青主
女科

有中医药学会藏

編號 11-210 4



產後編下

陽曲傅青主徵君手著

誤破尿胞第十八

胞破女科下卷
另有方極妥且效

產理不順。穩婆不精。誤破尿胞。膀胱者。用參耆為君。歸
芎為臣。桃仁陳皮茯苓為佐。猪羊尿胞煎藥。百服乃安。
又方云。用生黃絲絹一尺。白牡丹皮根為末。白芨末各
二錢。水二碗。煮至絹爛如飴。服之。宜靜卧。不可作聲。名
補脬飲。神效。

患淋第十九



一本小註載證
由內虛方用石
膏一兩無此治
法不可拘執陳
方以致誤人
一本石膏作一
錢無滑石

一作各等分

由產後虛弱熱客於脬中內虛頻數熱則小便淋澀作痛曰淋。

茅根湯凡產後冷熱淋並治之

石膏一兩 白茅根一兩 瞿麥 白茯苓各五錢 葵子

人參 桃膠 滑石各一錢 石首魚頭四箇 燈心水

煎入齒末空心服

又方 治產後小便痛淋血

白茅根 瞿麥 葵子 車前子 通草以上俱無

鯉魚齒一百箇 水煎服亦入齒末

按齒末疑均是鯉魚齒

便數第二十

由腴內素有冷氣。因產發動冷氣入腴故也。用赤石脂二兩為末。空心服。

又方。治小便數及遺尿。用益智仁二十八枚為末。米飲送下二錢。

又桑螵散

桑螵蛸三十箇。人參。黃耆。鹿茸。牡蠣。赤石

脂各三錢為末。空心服二錢。米飲送下。



瀉第二十一

產後泄瀉。非雜證。有食泄。溼泄。水穀注下之論。大率氣虛。食積與溼也。氣虛宜補。食積宜消。溼則宜燥。然惡露未淨。遽難驟燥。當先服生化湯二三帖。化舊生新。加茯苓以利水道。俟血生。然後補氣以消食。燥溼以分利水道。使無滯澁。虛虛之失。若產旬日外。方論雜證。尤當論虛實而治也。如痛下清水。腹鳴米飲不化者。以寒泄治之。如糞水黃赤。肛門作痛。以熱泄治之。有因飲食過多。傷脾成泄。氣臭如敗卵。以食積治之。又有脾氣久虛少。



食。食下即鳴。急盡下所食之物。方覺快者。以虛寒泄瀉之治法。寒則溫之。熱則清之。脾傷食積。分利健脾。兼消補虛。善為調治。無失也。產後虛瀉。眼昏。人不識弱甚形。脫危證。必用人參二錢。白朮茯苓各二錢。附子一錢。方能回生。若脈浮弦。按之不鼓。即為中寒。此蓋陰先亡而陽欲去。速宜大補氣血。加附子黑薑以回元陽。萬勿忽視。

加減生化湯治產後塊未消患瀉證

川芎二錢 茯苓二錢 當歸四錢 黑薑五分 炙草五分

桃仁十粒蓮子八枚水煎溫服

健脾利水生化湯治產後塊已除患瀉證

川芎一錢茯苓一錢半歸身二錢黑薑四分陳皮五分

人參三錢炙草五分肉果一箇製白朮一錢用土炒

澤瀉八分

寒瀉加乾薑八分寒痛加砂仁炮薑各八分熱瀉加

炒黃連八分瀉水腹痛米飲不化加砂仁八分麥芽

山查各一錢瀉有酸噯臭氣加神麴砂仁各八分脾

氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮



北京中医药大学图书馆藏

一錢以燥溼脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱
卻寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮苓附必用之
藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子十粒

完穀不化 第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也。名飧泄。又飲食太過
脾胃受傷亦然。俗呼水穀痢是也。然產方三日內塊未
消化。此脾胃衰弱。參耆朮未可遽加。且服生化湯加益
智香砂少溫脾氣。俟塊消後加參耆朮補氣肉果木香
砂仁益智溫胃。升麻柴胡清胃氣。澤瀉茯苓陳皮以利



一本當歸作三
錢有棗一枚

一本有蓮子八
枚去心棗一枚

水為上策也。

加味生化湯

治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎一錢 益智一錢 當歸四錢 黑薑四分 炙草四分

桃仁十粒 茯苓一錢半

參苓生化湯

治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱
患此證者

川芎一錢 當歸二錢 黑薑四分 炙草五分 人參二錢

茯苓一錢

白芍

炒一錢

益智

炒一錢

白朮

土二錢

肉果

製一箇

瀉水多加澤瀉木通各八分 腹痛加砂仁八分 渴加

麥冬五味子 寒瀉加黑薑一錢 木香四分 食積加神



麴麥芽消飯麴。砂仁山查消肉食。產後瀉痢日久。胃氣虛弱。完穀不化。宜溫助胃氣。六君子湯加木香四分。肉果一箇製。

痢第二十三

產後七日內外患赤白痢。裏急後重頻併。最為難治。欲調氣行血而推蕩痢邪。猶患產後元氣虛弱。欲滋榮益氣而大補虛弱。又助痢之邪。惟生化湯減乾薑而代以木香茯苓。則善消惡露而兼治痢疾。並行而不相悖也。再服香連丸。以俟一二日後。病勢如減。可保無虞。若產



一本作十數日

七日外有患褐花色後重頻併虛痢即當加補無疑。若產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連芩厚樸芍藥行積之劑。

加減生化湯治產後七日內患痢

川芎二錢當歸五錢炙草五分桃仁十二茯苓一錢

陳皮四分木香磨三分

紅痢腹痛加砂仁八分

青血丸治禁口痢

香連為末加蓮肉粉各一兩半和勻為丸酒送下四



錢

凡產三四日後塊散痢疾少減。共十證。開後依治。

一產後久瀉

元氣下陷。大便不禁。肛門如脫。宜服六君子湯。
木香四分。肉果一箇。製薑汁五分。

二產後瀉痢

色黃乃脾土真氣虛損。宜服補中益氣湯。加木香肉果。

三產後傷麪食

一本神麴麥芽
下有各一錢

瀉痢宜服生化湯加神麴麥芽。

四產後傷肉食

瀉痢宜服生化湯加山查砂仁。

五產後胃氣虛弱

瀉痢完穀不化。當溫助胃氣。宜服六君子湯。加木香四分。肉果一箇製。

六產後脾胃虛弱

四肢浮腫。宜服六君子湯。加五皮散。見後水腫

七產後瀉痢



無後重。但久不止。宜服六君子湯。加木香肉果。

八產後赤白痢

臍下痛。當歸厚樸黃連肉果甘草桃仁川芎。

九產後久痢

色白屬血虛。宜四物湯。加荊芥人參。

十產後久痢

色赤屬氣虛。宜六君子湯。加木香肉果。

霍亂 第二十四

由勞傷氣血。臟腑空虛。不能運化食物。及感冷風所致。



分一本有附子五

陰陽升降不順。清濁亂於脾胃。冷熱不調。邪正相搏。下為霍亂。

生化六和湯 治產後血塊痛未除患霍亂

川芎二錢 當歸四錢 黑薑 炙草 陳皮 藿香

四分 砂仁六分 茯苓一錢 薑三片煎服。

附子散 治產後霍亂吐瀉手足逆冷須無塊痛方可服

白朮一錢 當歸二錢 陳皮 黑薑 丁香 甘草各

四分共為末。粥飲送下二錢。

溫中湯 治產後霍亂吐瀉不止無塊痛者可服



人參一錢 白朮半一錢 當歸二錢 厚樸八分 黑薑四分

茯苓一錢 草豆蔻六分 薑三片 水煎服。

嘔逆不食 第二十五

產後勞傷臟腑寒邪易乘於腸胃。則氣逆嘔吐而不下食也。又有瘀血未淨而嘔者。亦有痰氣入胃。胃口不清而嘔者。當隨證調之。

加減生化湯 治產婦嘔逆不食

川芎一錢 當歸三錢 黑薑 砂仁 藿香 各五分

淡竹葉七片 水煎。和薑汁二匙服。



一本有白朮無
白茯苓丁香作
五錢用者酌之

溫胃丁香散 治產後七日外嘔逆不食

當歸 三錢 白朮 二錢 黑薑 四分 丁香 四分 人參 一錢

陳皮 五分 炙草 五分 前胡 五分 藿香 五分

薑三片 水煎服

石蓮散 治產婦嘔吐心衝目眩

石蓮子 去殼去心 一兩半 白茯苓 一兩 丁香 五分

共為細末 米飲送下

生津益液湯

治產婦虛弱口渴氣少由產後血少多汗

人參 麥冬 去心 茯苓 各一兩 大棗 竹葉 炙草