

外臺祕要

S25-4

1474

1部1

卯 11

1

共 40 册



重訂唐王燾先生外臺秘要方第十二卷目錄

瘰及疔氣積聚癰瘡
疔瘡奔弛三物門

療瘰方五首

瘰結方三首

寒瘰方五首

久瘰方二首

瘰羸瘡方二首

疔瘰方四首

疔氣方三首

瘰及疔瘰不能食方一十四首

癰瘰等一切病方四首



癖硬如石腹滿方二首

食不消成癥積方四首

心下如杯結癥方二首

癥癖疝氣灸法四首

積聚方五首

積聚心腹痛方三首

積聚心腹脹滿方一首

積聚宿食寒熱方四首

療癥方三首

暴癥方六首

鼈癥方四首

米癥方三首

食癥及魚肉成癥方二首

髮癥方二首

蝨癥方一首

鼈癥方一首

蛇癥方一首

蛟龍病方一首

胃痺方二首

胃痺短氣方三首

胃痺心下堅痞緩急方四首

胃痺噎塞方二首

胃痺欬唾短氣方四首

胃痺心痛方四首

胃痛方二首

奔豚氣方三首

奔豚氣衝心胃方四首

雜療奔豚及結氣方六首

灸奔豚法六首



唐王肅先生外臺秘要方第十二卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

新安後學程衍道敬通父訂梓

療癖方五首

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流雖復多飲水漿亦不能爲病若攝養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻側在於兩脅之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宜導今附於後養生云

尚德按
病源生

字下有
方字

外臺秘要

覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水勿急咽久成水癖
又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久之愈伏梁
伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣
癖數生癰久則腸化為筋骨變為實

出第二十卷中

廣濟療腹中癖氣方

牛膝 八分

桔梗 六分

芍藥 六分

枳實 八分

白朮 六分

鼈甲 八分

茯苓 八分

人參 六分

厚朴 六分

大黃 六分

桂心 六分

檳榔 六分

右十二味擣篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九日

二服漸加至三十九老小微利忌生冷油膩小豆粘食

莧菜醋生葱猪肉

出第二卷中

千金翼江寧衍法師破癰方

白朮 三兩

枳實 三兩炙

柴胡 三兩

右三味切以水五升煮取二升分溫三服服三十劑永

差忌桃李雀肉

出第十九卷中

必効療癰方

取車下李人微湯退去皮及並人與乾麴相半擣之
爲餅如猶乾和淡水如常溲麴大小一如病人手掌
爲二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如
不利更食一枚或飲熱粥汁卽利以快利爲度至午

後利不止卽以醋飯止之利後當虛病未盡者量
一二日更進一服以病盡爲限小兒亦以意量之
得食酪及牛馬肉無不効但病重者李人與麴
輕者以意減病減之後服者亦任量力頻試差神効

又方

大黃 十兩

右一味擣篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧
子一服三十丸以利爲度小者減之

又方

牛黃 三大 麝香 一當門 朱砂 準麝 生犀角 小棗許
豆許 子大 香 別擣末



以上四味並研令極細湯成後內之

大黃 一兩

芎藭 一兩

升麻 一兩

甘草 半兩

鼈甲

半兩

丁香

五十枚

右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去

滓內牛黃等四味和絞分為三服每服如人行十里久

忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特忌

牛馬肉其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以

上人服若十歲以下斟酌量病減之忌葷菜海藻菰菜生

血物等

並出第三卷中

癰結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在脅下有時弦且起或脹痛或喘息短氣故云癖結脉緊實者癖結也

出第二十卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆

三枚去心皮熬

杏仁

七枚去尖

大黃

如雞子大

右三味擣篩大黃取巴豆杏仁別擣如膏和大黃入蜜

和丸空肚以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下

病為度忌生冷油膩

出第二卷中

千金狼毒丸主堅癖方

狼毒

五兩塗薑汁炙

半夏

三兩洗

杏仁

三兩

桂心

四兩

金匱要略
卷二

附子

二兩
炮

細辛

二兩

椒

三兩
汗

右七味擣篩別擣杏人蜜和飲服如大豆二丸

出

救急中候黑丸療諸癰結痰飲等大良方

桔梗

四分

桂心

四分

巴豆

八分

芫花

十分
熬

杏人

五分

右五味先擣三藥成末別擣巴豆杏人如膏合和又擣

一千杵下蜜又擣二千杵丸如胡豆漿服一丸取利可

至二三丸兒生十日欲癰發可與一二丸如黍米諸腹

不快體中覺患便服之得一兩行利即好

肘後千金同
服四神丸下

之亦得出第三卷中



北京中醫藥大學圖書館藏

傷寒按
癰疽源
作強

外臺秘要

寒癰方五首

病源寒癰之爲病是飲水停積脅下痙強是也因遇寒飢
痛所以謂之寒癰脉弦而大者寒癰也

出第二十卷中

肘後療腹中冷癰水穀瘕結心下停痰兩脅痞滿按之鳴

轉逆害飲食方

大蟾蜍

一頭去皮及腹中物支解之

芒消

大人用一升中人七合羸小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升

若未下更服一升中人七合羸小五合得下者止後九

日十日一遍作之

天方

大黃 三兩

甘草 二兩

蜜 二升

棗 二十枚

右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓

再上火煎令烱分再服忌海藻菘菜

又方

巴豆

三十枚煮

杏人

二十枚

桔梗

六分

藜蘆

四分

皂莢

三分去皮

右五味擣蜜和丸如胡豆未食服一九日三欲下病者

服二丸長將服百日都好差忌猪肉蘆笋狸肉

古今錄驗同並

出第三卷中

深師主久寒癖胃滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時



去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱萸丸方

吳茱萸

八分

附子

三分炮

厚朴

五分炙

半夏

五分洗

桂心

五分

人參

五分

礬石

五分熬

枳實

五分炙

乾薑

五分

右九味下篩蜜和酒服如梧子二十九日三不知增之

出第十六卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷

上熱不能食飲頻頭風旋喜嘔吐方

白朮

六分

厚朴

兩分炙

人參

五分

白芷

三分

橘皮

四分

防風

五分

吳茱萸

四分

芎藭

四分

薯蕷 四分

扶神 五分

桂心 四分

大麥蘖 四分

乾薑 四分

防葵 四分

甘草 五分

右十五味搗篩蜜和丸如梧桐子酒服十五丸日

再服

至二十九 出第十六卷中

久癖方二首

病源久癖謂因飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脅下經久不差乃結聚成形段而起按之乃水鳴積有歲年故云久癖 出第二十卷中

集驗療冷熱久癖實不能下虛滿如水狀方

前胡 四兩

生薑 四兩

枳實 三兩

半夏 四兩

進按實不能

下當是

此食不

能下



白朮 三兩

茯苓 四兩

甘草 二兩

桂心 二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服

千金同出卷中

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服

之二十日愈久服令人延年益壽殷仲堪云扁鵲曾青丸

療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴隨病所在久

病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗出方

曾青 二分

寒水石 三分

朴消 二分

茯苓 三分

大黃 三分

附子 三分

巴豆 二分

右七味各異擣下篩巴豆消相合擣六千杵次內附子

擣相得次內茯苓擣相得次內大黃擣相得次內曾青

