

卷十一

彙集痘內襍症諸家論治

大小便秘

痢症

內潰 暢氣

外

附噎氣

腹脹

咳嗽

痰涎

涕唾

稠粘

喘急

音啞

作哈

寒戰

咬牙

驚狂

譫

妄不食

能食

痘風

口舌

牙齒

咽喉

口疳

肺癰

面青

目睛

露白

腫脹面目預腫

疳蝕

癰毒

痘後浮腫

陰囊發腫

壞症不治

可汗

不可汗

可下

不可下

飲水

內虛

泄瀉

外

感風寒

變黑歸腎

風寒、閉寒

閉寒

暑熱

閉微氣觸犯

臭痘

板黃

封蛤

蛆

痘癰

欖核

沁砂紅

閑愁

筆馨

子

母痘

腮脫

聽馨

驗鼻準

灰燥

痘

裏發噎

鼻嘔

口吐蛔

撒尾

玉蘊膏

腫

手足指冷

張口不闊

汗流不止

夾鹹

倒痘

木痘

醋火封喉

白舌

肉腫痘不腫

倒瘻

報敷點生死論

痘

太均不治

數月內小兒痘

異痘記

藥戒



摘星樓治痘全書

卷十一

摘星樓治痘全書卷之十一

彙集痘內襍症諸家論治

大小便秘

海藏曰。大便秘結者下之。桃仁承氣湯。一百八七四順清涼

飲。十柴胡飲子。四晉

選用察其在氣在血必內實能食

而秘者可用。但當微微潤之。小便不通者利之導

赤散。卒八

正散

一百

之類。但求上下三焦何經而用之。

泄者分之。寒則異攻散。卒三

四君子湯。一百五

熱則白朮澤

瀉茯苓湯。卒二



按古人云痘瘡最要大小腑分曉此錢氏四聖

散。三用枳殼木通爲妙也。

薛立齋曰痘疹方云痘疹未出之先熱盛恐欲起驚

痘中血淋
不常見

小便不利導赤散。辛微解之熱入膀胱如有血淋犀

角湯。十初出不快小便赤色四聖散。三已出未愈之

間白术散。言或五苓散。百加木通收曆之後小便不

利煩熱而渴猪苓湯。四竊謂前症當分所因若小腸

熱結用導赤散。辛肝經熱柴胡麥冬湯。百脾經熱犀

角湯。十肺經熱生地黃湯。百腎經熱地黃丸。言曆後

何以辨某
經



血虛弱。八珍湯。_{七十二} 中氣虛弱。五味異攻散。_{一百三}

按此乃小便不利之治法也。至分經內熱症。何以的見細察之可也。

汪省之曰。大便不通。非一症。所下大結實如粟塊者。風秘也。煩燥引飲。大便秘。小便赤。手掌心併腋下有汗者。熱秘也。嘔吐清水。不能食。面青而瘦者。冷秘也。久病不能乳食。腹不脹。不裏急。後重。日夜不大便者。虛秘也。

吳東園曰。大便秘者。熱毒燥結於下。腸胃津液乾枯。

汗多利小便亡津液之病竊耳在此便秘不專

不得潤滑然也。或因汗多或利小便以致涸其津液。

亦令便秘。四順清涼飲。十三乙承氣湯。辛一煩燥手足

心熱液下有汗者。熱秘也。涼膈散。四下之。不食嘔溝

水面青腹不脹。不裏急後重者。虛秘也。蜜導法。四凡

秘身熱者。大柴胡湯。半身不熱。四順清涼飲。十一起脹

灌膿不宜久泄。初出收曆。暫泄無妨。

痘後常泄屁者。氣下泄也。宜用升提之藥。升麻、白芷、防風、柴胡之類。數日未大便下亦可。

按此經歷大便利不利之獨到者也。

此雖小症
所關不小

萬密齋曰。凡瘡疹。小便欲其流長。大便欲其潤實。則邪氣不伏。正氣不病。經曰。小便數者。大便必鞭。雖三日不更衣無苦也。如覺小水少。則病增進矣。

按流長潤實四字。最宜潛玩。此萬氏謂小便欲

流長。則大便必潤實而不燥。邪氣無阻塞之患

矣。蓋心主瘡而屬火。心移熱於小腸。氣爲火食不能傳化。而津液不出。故小便秘也。瘡疹發熱。大便欲潤。若二、三日不行。宜急利之。恐腸胃不通。瘡出轉密也。

按此所以言潤之妙也。

惟起發之後。大便宜堅。如能食而大便常行者。不須忌之。若過四五日不行。則熱甚生濕。其瘡難醫。亦利之。

按此所以又言潤且實之妙也。

設使大小便俱不通。則邪氣內蓄。三焦阻絕者死。

按此則前海藏所謂求上下三焦何經而用之。不獨小便當求三焦矣。然素問所謂急則治其標。大小便不利。亦列其中。况瘡疹所屬尤急。所



宜詳審而細參之者也。

按心火太盛。則移熱于小腸。小腸移熱於膀胱。
膀胱爲津液之府。氣化則出。今壯火食氣。則津
液枯矣。如痘密而小便少。此氣血衰。津液耗非
熱也。不可利之。宜十全大補湯。辛七

凡瘡疹小便少者。熟微導赤散。辛加山梔仁。熟甚八
正散。百如發熱時。大便不行。熟微三黃丸。百甚則承
氣湯。辛如起發至收曆。大便不行者。膽導法。四百不可
遽用利藥。但瘡乾黑陷。大便秘煩燥者。以百祥丸。百

牛李膏

四百三十九

主之。

按諸病以小水少。則病益進。况痘爲君火用事。若心火盛。則膀胱雖爲津液之府。亦必由肺氣之輸化而始出。氣爲火蝕。下降之令失焉。故小便秘澀。則熱毒無以走洩。發驚發搐。勢所必來。治又不可驟用寒涼。當利以導之。小熱不去。則大熱必生也。若痘密而小便赤少者。此津液耗損。下焦少血也。不可妄利。反損真陰。徒增爲喘爲渴耳。更有積痰在肺。因肺氣氣閉。而膀胱乃。

塞者治宜清肺。猶盛水之物。上竅通而下竅乃出。古方利水劑中。加以荆芥。或用吐法。卽此意也。更有氣結於下而不通者。宜升之。蓋氣升而水自下降耳。

吳東園曰。小便赤澁者。宜涼血以泄其熱。五苓散。一百八正散。一百六導赤散。卒加滑石、梔子。有血。與赤澁不同。加瞿麥、生地。

黃丹皮

支氏曰。小便不通者。五苓散。一百導赤散。卒八正散。一百六加升麻。提之莖中痛者。犀角地黃湯。十加甘草。稍苦。

練子牛膝之類治之。

按此不通。壅痛當有別也。至加升麻之說必有清濁之氣不能升降之極方可行耳。

金鏡錄曰。凡便秘當分三部。上結則宜降氣清涼。中結則宜行氣活血。下結則宜通之。以蜜導四百五十二可也。

按觀此三部之說。合之風虛冷熱之因。則海藏所謂察其在氣在血。誠哉是言也。又小便赤。有血症。熱症。不獨大便之秘。當察氣血矣。然大小二便常相因而病也。



醫學註曰。小便澁赤熱。并大便亦秘。不敢下之。五苓散。一百克

赤散。一百克

赤散。二两

導赤散。三两

通湯。一百克

以滲之。如熱微。又不。

敢滲小便。

恐損真氣者。

只宜獨聖散。

十克

紫草飲。一百克

解其毒。

按此又二便合治之法也。醫者毋忽之。

痢症

保赤曰。丹溪云。痢赤屬血。自小腸來。白屬氣。自大腸來。皆濕熱鬱於脾胃。致傷氣血而然也。

按此治痢必有所因。最難用藥。故。

李東垣曰。痘症下痢。須用升麻提起正氣。使痘不致
下陷。當以保元湯。四十加升麻。以扶痘。然後隨赤白
妙。而治之可也。

按此乃治痢第一義也。

支氏曰。黃連六一湯。治痘中之痢。比之諸痢不同。
大忌下藥。白多者。厚朴檳榔丸。紅多者。黃連芍藥
湯。四晉赤白相雜者。香連丸。一百五黃連地榆湯。食積者。
加山楂。神麃。腹痛者。加白芍。厚朴。裏急後重者。加木
香。升麻。或補中益氣湯。三十噤口者。蓮肉散。



保赤曰。治法紅用四物湯。十五加炒黃芩。炒黃連。炙甘草木香白用四君子湯。百五加炒黃連。木香。陳皮。炒滑石。紅白相兼合而治之。腹痛者加當歸。砂仁。再加本香芳藥後重。加炒滑石。枳殼。生芍藥條芩。

按此二論治赤白各有不同。愚謂支氏不遽用四物四君者爲穩耳。

又曰。久而不愈。紅加阿膠珠。炒黑乾薑。白术。白加黃芪。砂仁。炙乾薑。

按此乾薑之用。爲久不愈之故。以炒炙爲鍾法。

耳。

又曰。挾外感者。小柴胡湯。丸四加蒼术、川芎、陳皮、芍藥。

丸八

生薑以發之後重除者。加訶子、豆蔻以止之。若大便

膿血下腸垢者。阿膠駐車丸。丸四痘後下痢膿血黃白

者。薤白散。丸五或胃風湯。言四若兼小便赤澁而煩者。導

赤散。丸二或犀角地黃湯。丸十此治痢之大較也。

按此合而論之。東垣所云。加升麻扶痘者。痘正
出之時也。支氏所云。大忌下藥者。痘出初痢。恐
人執下法而犯痘也。意與東垣同。至治赤白之。

法尤諸醫之剩技耳。惟夾外感者不常見。若兼小便赤澁而煩之說。又二便相因之故也。

總按痘中之癧。是熱毒攻其腸胃兼痘兒之濕熱素有所鬱結合併傷其氣血而成癧也。此治癧所以比治雜症最難用藥。

內潰

此症必發于七日以前

心鑑曰。內潰者胃爛也。蓋因風寒所中。腠理固密。陰陽二分壅塞不通。其毒內攻。而臟腑之間。毒火炮熾。則潰而成膿。口舌皆白。是其驗也。識者於痘未出之

時或有風寒阻隔。氣粗熱甚。身必戰動。肚腹急痛。確
防此患。以敗毒散。七百升麻葛根湯。一逐散寒邪。縱毒
而出。豈有是症也哉。

醫學註曰。口內臭爛。舌上白胎。或黑舌。卷囊縮。身必
戰動。肚腹急痛不止。痘變紫黑者。謂之內潰胃爛。原
因七日前被風寒所中。腠理固密。壅塞其毒。反攻臟
腑之內。宜量與清胃消毒豁痰。解散風寒之劑救之。
按二公所論相同。總歸毒壅不解。潰爛五臟六
腑。毒所必攻。故有此症。勢甚危殆。豈盡歸之風

