

李草綱目

金陵初刻本

何時希書



本草綱目草部第十六卷

草之五

隰草類下十七種

地黃

本經胡面藥附

牛膝

本經

紫菀

本經

火焰草

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐

柏胡根

拾遺

淡竹葉

綱目

鴨跖草

嘉祐即作葉菜

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

兔葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經即燈籠草

蜀羊泉

本經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經即苦菜

迎春花

綱目

欵冬花

本經

鼠麴草

日華即佛耳草

貝母

即米苔草

決明

本經

地膚

本經即落葉

瞿麥

本經

王不留行

別錄

剪春羅

綱目

金盞草

綱目

葶苈

本經

車前

本經

狗舌草

唐本

馬鞭草

別錄即龍牙草

含

本經

女青

別錄

鼠尾草

別錄

狼把草

開寶即龍牙草

狗尾草

綱目

體腸

唐本即早蓮草



連翹 本經 陸英 本經 菊蘿別錄

水英 圖經

藍 本經 藍澱 綱目 青黛 開寶雀

翹附 藍 拾遺

蓼 本經 水蓼 唐本 馬蓼 綱目

荭草 別錄

毛蓼 拾遺 海根 拾遺 火炭母草 圖經

三白草 唐本

蠶蘭草 拾遺 蛇頭草 拾遺 虎杖 別錄

猶草 拾遺

萹蓄 本經 薑草 本經 蕤葵 本經

穀精草 開寶

海金沙 嘉祐 地楊梅 拾遺 水楊梅 綱目

地蜈蚣 綱目

半邊蓮 綱目 紫花地丁 綱目 鬼針草 拾遺 獨用將軍

唐本留軍待附

見腫消 圖經 攀倒甑 圖經 水甘草 圖經

右附方舊一百七十一新二百九十一

草部

草之五 隅草類下七十三種

地黃

本經  
昇

釋名

半音一  
戶芭

音起

地髓

本經木明曰生者以水浸驗之浮者名

天黃半沉者次之浮者不堪嚼

吞入人黃沉者名地黃

入藥沉者爲佳半沉者次之浮者不堪嚼

人黃

郭璞云江東呼爲

芊羅

顧云芊以沈下珍爲貴故字從下

集解別錄曰地黃生咸陽川澤黃土

地者生二月八月采根

陰乾弘景曰咸陽即長安也

生渭城者乃有子實如小

麥今以彭城乾地黃最好

次歷陽近用江寧板橋者爲勝作

乾者有法搗汁和蒸殊用工意而此云陰乾恐以蒸作爲失

乎人亦以牛膝姜蕤作之人不能別

須曰今處處有之以同

州者爲上二月生葉布地使出似車前葉上有皺文而不光

高者及尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃

花者其尖作房如連翹中子甚細而沙褐色根如人手指通

黃色粗細長短不常種之甚易根入土即生

二說舌稱種地

黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦

席圍編如車輪徑丈餘以壞上实葦席中爲壇上又以葦

席实土爲一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠乃以地

黃根節多者寸斷之蹲壇上層層令澆逐日水灌令茂盛至

春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斷傷故也

得根暴乾出同州者光潤其美宋真曰地黃葉如甘露子花

如脂麻花但有細斑點此人謂之牛奶奶花莖有微細短白

毛時珍曰今人惟以懷慶地黃為上亦各處隨時興廢不同

爾其苗初生塌地葉如山白菜而毛滿葉面深青色又似小

芥葉而頗厚不又了葉中擴莖上有細毛莖稍閉小筒子花

紅黃色結尖如小麥粒根長四五寸細如手指皮赤黃色如

羊蹄根及葫蘆葛根曝乾乃黑生食作土氣俗呼其苗為婆

婆奶古人種子今惟種根主晏山居錄云地黃嫩苗摘其旁

葉作菜甚益人本草以二月八月采根殊未窮物性八月殘

葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新苗已生根中精氣已滋

於葉不如正月尤月采者殊好又與蒸曝相宜禮記云羊羊

豕穀則自古已食之矣嘉謨曰江浙壞地種者受南方陽氣

質雖光潤而力微懷慶山產者稟北方純陰皮有疣突而力大

## 乾地黃

### 修治

藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物各別蒸乾即溫補生乾即平宣當依此

法用時珍曰本經所謂乾地黃者即生地黃之乾者也其法

取地黃一百斤擇肥者六十斤洗淨晒令微乾以揀下者洗

淨木臼中搗絞汁盡投酒更搗取汁

拌前地黃日中晒乾或火焙乾用

## 氣味

### 甘寒無毒

羽錄曰苦推曰甘平齊古曰甘苦寒氣薄味

之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黃大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣才才曰得清酉客

門冬良惡貝母畏蕷夷權曰葱蒜蘿蔔諸血令人苦消并髮白男損管女損筋肉多  
曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾用則涼主治傷中逐血癆填骨髓止肌

肉作湯除寒熱積聚除癰療折跌絕筋父服輕身不老生者尤良經主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血

利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脉  
益氣力利耳目別助心膽氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸

勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運明產後腰痛久服變  
白延年魏權涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱元主

心病掌中熱痛脾氣痿廢嗜臥足下熱而痛好治齒痛唾血生地黃主治大寒治婦人崩中血不止及產後益上薄心悶  
絕傷身體動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血鼻衄吐血皆

搗飲之別解諸熱通月水利水道擣懃腹能消瘀血甄

(發明)

好古曰：生地黃入手少陰，又為手太陽之劑，故錢仲陽

隨亦能治之。溺血便血皆同權。以導赤也。諸經之血熱與他藥相  
之（戴原禮曰）陰微陽盛，相火熾強，來乘陰位，日漸煎熬為虛  
火之證者，宜地黃之屬，以滋陰退陽。（龜蘋曰）本經只言乾  
生二種，不言熟者，如血虛勞熱，產後虛熱，老人中虛燥熱者。  
若與生乾當慮大寒，故後世改用蒸曝熟者，生熟之功殊別。  
不可不詳。時珍曰：本經所謂乾地黃者，乃陰乾白乾火乾者。  
故又云生者尤良。別錄復云：生地黃者，乃新掘鮮者，故其性  
大寒，其熟地黃乃後人復蒸晒者。諸家本草皆指乾地黃為  
熟地黃，雖主治證同，而涼血補血之  
功稍異。故今別出熟地黃一條於下。

熟地黃

修治

須曰：作熟地黃法，取肥地黃三二十斤，净洗，

別以揀下瘦短者三二十斤，搗絞取汁，投石器中，浸漉令浹，甌上浸三四過，時時浸漉轉蒸，訖又暴使汁  
盡，其地黃當光黑如漆，味甘如飴，湏入蜜，收之。以其脂柔喜潤也。（張曰）采生地黃去皮，甌上柳木甑蒸之，燉令氣歇，拌  
酒再蒸，又出令乾，勿犯銅鐵器，令人腎消并髮白，男損榮女  
損衛也。（時珍曰）近時造法，揀取沉水肥大者，以好酒入繩砂，  
仁末在內，拌勻，柳木甑於瓦鍋內蒸，令氣透眼乾，再以砂仁  
酒拌蒸，眼如此九蒸九眼乃止。蓋地黃性泥，得砂仁之香而  
竄合，和五臟，冲和之氣歸宿丹田，故也。今市中惟以酒煮熟

可  
用  
售  
者  
不

氣味甘微苦微溫無毒

元素曰

甘微苦寒微酒力酒蒸則微溫而大補味厚氣薄陰中之陽沉也

入手足少陰厥陰之經治外治上須酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓

骨髓長肌肉生精血補五臟內傷不足通血脉利耳聰目聰

髮男子五勞七傷女子傷中胞滿經候不調胎產病

時補

血氣滋腎水益真陰去賅腰急痛病後腰酸痛

元坐而欲

起自曉曉無所見

好古

發明

元素曰地黃生則大寒而涼血血熱者宜用之熟則微溫而補腎血衰者漸用之又賅下痛屬腎經非熟地黃不能除乃通腎之藥也好古曰生地黃治心熱手足心熱入

手足少陰厥陰能益腎水

宋心血其脉洪實者宜之若脉虛者則宜熟地黃假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六味丸以之為諸藥之首天一所生之源也

之臟以之為君者癸乙同歸一治也

時珍曰按王碩易簡本云男子多陰虛宜用熟地黃女子多血熱宜用生地黃又云

蠶黃能養天門冬引入所生之處熟地黃能補精血用麥門冬

引入所補之處蠶搏醫李正傳云生地黃生血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黃補血而痰飲多者服之恐泥膈或云生地黃酒炒則不妨胃熟地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地

黃之精微者也。頃曰：崔元亮海止方治一切心痛無問新久，以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁搜麪作餌飪或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣。昔有人患此病二年深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餌亦與之隨即壞爛由此得方。劉禹錫傳信方亦紀其事云貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃苓淘食便吐一物可方寸七狀如墜幕無足日似有口遂愈冷淘勿

益着

## 附方

舊十三新

## 服食法

地黃根

淨洗搗絞

汁煎

令入白蜜

送下三

十九丸

日三服

亦可

以青州

棗和丸

或別以乾地黃末

入膏丸

服亦可

百日

面如桃花

三年身輕

不老抱朴子云楚文子服地黃八

年夜視有光

地黃前

補虛除熱

治吐血

唾血

取乳石

去癰癧

等疾生地黃

不拘多少

三搗

三壓取汁

令盡

以瓦器盛

之密蓋勿

洩氣湯

上煮減半

絞去滓

再煎如錫丸

彈

子大每溫酒

服一丸

日二服

千金方

地髓前

生地黃十斤

洗净搗壓

取汁鹿角膠

一斤半

生薑半

蜜研紫蘇子四兩

取汁入前

一二十沸

下膠濃化

下薑汁

以酒研

蜜再煎候稠

瓦器盛

之每空

心酒化

一七服

大補益

洞止

蜜

水

水

人患此病二年深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病

本從其言果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃

餌亦與之隨即壞爛由此得方。劉禹錫傳信方亦紀其事云

貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地黃苓淘食

便吐一物可方寸七狀如墜幕無足日似有口遂愈冷淘勿

益着

**地黃粥**

大能利血生精地黃切二合與米同入錠中煮之候  
熟以酥二合蜜二合同炒香入內再莫熟食

耀仙

**地黃酒**

見穀部酒下

璫至膏常服開心益智髮白返黑齒落更

隱

年治癲疽勞瘵飲散

坐

而等病乃鐵甕城申先生方也

生地黃汁十六斤取汁人參

末乙斤半白伏苓末三斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內

若利即減之以涼爲度

外臺祕要婦人發熱

封安砂鍋中桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底

一夜取起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙冉溪云好色虛

人欬嗽唾血者眼之甚捷

國朝太醫院進

御服食議

加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤

賜名益壽求真膏

臘仙明日補腎生茱萸熟茱各二兩川椒紅

一兩爲末蜜丸梧子大每

十丸普濟方

空心鹽湯下三

方加琥珀沉香半兩

一治齒痛二生津液三變白鬚其

妙地黃五斤榔木瓶內以土

蓋上蒸熟晒乾如此三次擣爲

小餅每龜燕一枚

御藥院方

男女虛損或大病後或積勞

酸痛及吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無

味多卧少起久者積年輕者自日漸至瘦削用主地黃二斤

一斤搗爛炒乾爲末每空心酒服

地黃一石取

方寸匕日三服忌如法

肘后方

病後虛汗口乾心躁熟地黃五兩水三盞煎

聖惠方骨

勺煎收日服

必効方

張文仲方用生地黃一升搗三度絞盡分

外臺祕要婦人發熱

蒸勞熱

再服若利即減之以涼爲度

外臺祕要婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃婦人勞熱

一斤爲末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸保慶集

心忪地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分爲末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十丸用地黃湯下或酒醋

茶湯下亦可日三服覺臟腑虛冷則晨眼八味丸地黃性冷壞脾陰虛則發熟地黃補陰血故也婦人良方亥嗽

唾血勞瘦骨蒸日晚寒熱生地黃汁三合煮白粥吐血亥嗽

熟地黃末酒服二升止血不上生地黃汁一升二合白膠香二錢日三聖惠方口以磁器盛入甑蒸令膠消服

梅師肺損吐血五合同煎熟入鹿角膠炒研一兩分三服心

熱吐血成膏丸梧子大每熟水下五丸至十丸並聖惠方

鼻出血乾地黃地龍薄荷等分爲末止血便血地黃汁六

沸入牛皮膠一兩待化入薑汁半盃分腸風下血生地黃熟

三服便止或微轉一行不妨聖惠方

浸五味子等分爲末以煉蜜丸梧初生便血小兒初生七八

子大每酒下七十丸百一選方初生便血日大小便血出

乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服

鼻出血生地黃汁半升生薑汁半升生薑汁各三合和煎服

聖惠方

全幼心鑑

小便血淋

生地黃汁車前葉

及耳血

聖惠小兒鹽痢生半汁一升二合分三月水不止生地黃汁一盞

立效子母祕錄

月水不止每服一盞

酒一盞煎服日

千金方

月經不調久而無子乃衝任伏熱也熟地黃

二次千金方

月經不調久而無子乃衝任伏熱也熟地黃

連一兩並酒浸

七十丸米飲溫酒任下禹滿師方

妊娠漏胎一方用生地黃連一兩並酒浸

禹滿師方

黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服○崔氏方用

生地黃爲末酒服方才七日一夜一經心錄加乾薑爲末

保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分爲末

禹滿

微炒爲末梧子大每溫酒下三十丸

許學士本事方

妊娠胎動婦人妊娠胎動

禹滿

每服半兩白朮枳殼煎湯空心調下日二服

禹滿

衝任脉虛宜抑陽助陰內補丸用熟地黃二兩當歸一兩

禹滿

禹滿

禹滿

妊娠胎動禹滿

禹滿

禹滿

妊娠胎動禹滿

禹滿

衣不出

生地黃汁一升苦酒三

升方寒疝絞痛

治如常法生地黃

來去用烏雞一隻

必效方

寒疝絞痛

七斤剉細

瓶中同蒸下以銅器承取汁清旦服

必效方

寒疝絞痛

治如常法生地黃

來去用烏雞一隻

必效方

小兒陰腫

以葱椒湯緩處洗之

唾調地黃末傅之外

小兒陰腫

傳之外腎

時後方

小兒陰腫

小兒陰腫

月熱者雞子清調或加牡蠣少許

危氏方

小兒陰腫

地黃汁一盞服之

熟病半合和勻時時與服

普濟方

熟病半合和勻時時與服

普濟方

熟病半合和勻時時與服

普濟方

熟病半合和勻時時與服

下覺心下頓涼勿

溫毒發斑

黑膏治溫毒發斑

一兩

豆豉一兩

豆豉一兩

豆豉一兩

再服

普濟方

再服

普濟方

再服

普濟方

再服

金方

血熱生癰

助黃汁頓服

疗腫乳癰

易性涼消腫無不

千金方

千金方

金方

梅癰癰惡肉

地黃三斤水一斗

豆豉取三升去滓煎

一切

一切

一切

效

梅癰癰惡肉

地黃三斤水一斗

豆豉取三升去滓煎

一切

一切

一切

癰疽

及打撲傷損未破疼

痛者以生地黃杵如泥

搘在上

搘在上

搘在上

搘在上

消也

王家傳濟方

打撲損傷骨碎反筋

傷瘍用生地黃敷膏裹之

裹之

裹之

裹之

授入白

中昏迷不和痛苦急召

田錄事視之曰尚可救

乃以急

急

急

急

藥封腫處中夜方甦達旦痛止痛處已白日換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈即上方也

出附錄

升酒一升半煮二升半分三服

出千金方

物傷睛穴者

驗胞腫痛重者目精突出但目系未斷者即納入急搗生地黃綿裹傳之仍以避風膏藥護其四邊

聖濟總錄

起目赤

肺起良久如常者血熱也臥則歸於肝故熱則目赤

乾三浸二酒每夜以米羹粥食一盞數

眼暴赤痛水洗生地

日即愈有人病此用之得效

醫餘

眼暴赤痛

黃黑豆各

厚罨目上至曉水潤取下

聖濟總錄

眼暴赤痛

水洗生地黃薄

品方 小牙疳宣露膿血口氣生地黃一斤鹽

合木自搗和

一分研匀

聖濟錄 牙齒挺長出一分者常咋生地黃

張文仲備急方

子動欲脫生地

裹唾之冷瀉根并喰

火斷去麪

入麝一分研匀

之求類方 中常鳴生地黃截塞耳中日數易

時後方

瘡髮黃赤

之或煨熟尤妙

時後方

瘡髮黃赤

生地黃一斤生薑半斤各洗研自然汁留滓用不蛀皂角十

條去皮弦蘸汁炙至汁盡爲度同滓入罐內泥固煅存性爲

未用鐵器盛末三錢湯調停二日

時後方

瘡發黃赤

障卧刷染鬚髮止即黑

本事方

竹木入肉

之救急方

毒箭入肉

煎生地黃汁作丸服至一百日箭出

千金方

地黃搗汁研并金之百度愈

百方一

葉主治惡瘡似癩十年者擣爛白塗鹽湯先洗

而金方○

按抱朴子

云韓子治用地黃苗喂五十歲老馬生三駒又一百三十歲乃死也張鷺朝野僉載云雉被鷹傷嘴地黃葉點之虎中

藥箭食清況解之鳥獸猶知解毒何況人乎

實主治四月采陰乾搗末水服方寸匕自三服功與地黃等

新附方一內障青盲酒黑豆花晒槐花晒各一兩爲末豬肝

主治爲末服功同地黃類腎虛腰脊痛爲末酒服方寸匕

七日二、三

時珍

附方一內障青盲風赤生腎及墜眼日久暗損失明地黃花

根同以水二斗煮至上有凝脂掠盡

瓶收每點少許三四次

聖惠方

附錄胡面奉

拾遺藏器曰味甘溫無毒主去痃癖及

冷氣止腹痛煥眼生翳南藥如地黃

去痃癖及

黃

牛膝本經上品

釋名牛莖

廣雅本經

山莧菜

救荒對節菜

臥景

曰本經文名百倍隱語也言其滋補之功如牛之多力也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱

一集解

別錄曰牛膝生河內川谷及臨朐二月八月十月采根

陰莖番曰葉如夏葛莖本直

臥景

曰今出近道蔡州者

中亦有之然不及懷慶者爲直春生苗莖高二三尺青紫色

有節如鵝膝及牛膝頭葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花

作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者爲佳莧葉

亦可單用

聊珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝不堪服食惟

北土及川中人家栽蒔者爲良秋間收子至春種之其苗方

莖葉皆對生頗似莧葉而長且尖秋月開花作穗結

子狀如小鼠負蟲有濬毛皆貼莖倒生九月取根水中浸

兩宿接去皮曬暴乾雖白直可貴而接去白汁入藥不如

留皮者力大也

一嫩苗可作菜茹

根修治

穀曰凡使去頭蘆以黃精自然汁浸一宿漉出剉焙乾用

則焙用或酒

甘草茶過用

氣味苦酸平無毒

普曰神農甘雷公酰無毒李當之溫之可惡螢火龜甲陸英畏白前忌牛羊肉主

治寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮

胎久服輕身耐老本經療傷中少氣男子陰消老人失溺相中續絕益精利陰氣填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人

月水不通血結

別錄

治陰痿補腎助十二經脉遂惡血

權治腰

膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎

大強筋補肝臟風虛

好古同

從蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼

爛罨之即出

宗軒

治久瘧寒熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口

瘡齒痛癰腫惡瘡傷折

珍

發明

權曰病人虛羸者加而用之

康寧事曰半膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之

秋冬用根惟葉汁效尤速時珍曰半膝乃足厥陰少陰之藥所主之病大抵得酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧久瘧傷中少氣諸病非取

其補肝腎之功歟其癰瘍心腹諸痛癰腫惡瘡金瘡折傷

及