

傷寒論類方

光緒癸未孟秋

江西書局開
周佳

甚咸豐五年七月應

召至京進

壽康宮視脈遇奇矣其令天津牧昌平也皆廣
施良藥以已境內之疾迨擢天津守兵火新經
疫大作偉如妙製一方鋟板傳布全活無算今
偉如以監司典樞東海誠和中外晉都轉銜受
任日重駸駸乎將擴其向之活人者而活國矣
然活人之志不稍懈取所讀傷寒類方暨神農

曩余官京師稔潘君偉如之孝以兄子締姻好
時偉如讀儒門事親書知醫未精也嗣司西路
同知獄秩卑不足展抱負慨然曰活國非我分
獨不能活人乎爰聚古今岐黃家言研究之由
博返約探本窮源遂契靈素難經微旨而窺仲
景之奧值粵氛起驛路阻遣戍之犯畱禁拱極
城多疾病偉如日按視處方親子之湯獄無死
者由是遠近爭求療治罔不應亦罔不效名噪

聖人所願於來世哉 潘大中丞之撫江右也

出其舊輯傷寒類方等書彙爲 韓園醫學六

種重付之梓舉使瑞芬序之蓋 中丞之知醫

自讀儒門事親始當時京朝官多稔其孝行已

而應

召進

壽康宮視脈以忠慎結

主知三十年來宦轍所至日卷卷於蒼赤之痼

瘠而欲躋之於仁壽此編之布將使業儒書者
習而通之由是而汎覽諸家上窺靈素蓄之爲
窮理盡性之方用之卽爲事父事君之助此大
君子所以翼禮扶倫而爲前序之所未罄者也
光緒十年三月江西布政使貴池劉瑞芬謹序

吳之先正范文正公嘗有願爲良醫之語然文
正生平未嘗知醫也後千百年而有天韓園潘
公始以名世才旁通醫術應
慈宮召命屢奉

清問專門者不能及光緒癸未持節撫江右出
其刪訂之書凡六種付書局刊行而命德棻序
之竊維醫家之言祖於黃帝兵家之言亦祖於
黃帝岐伯之素問風后之握奇經眞贗未可知

而源流甚古泥古不可也蔑古亦不可也神而明之存乎其人醫家與兵家無二理也古之善醫者貴乎專貴乎正治一經之病不禱以他經之藥專之謂也否則號令歧出宦官監軍郭李所以潰相州也藥不求奇方不避熟母詭遇母臆揣正之謂也否則行險僥倖子午出兵孔明所以拒魏延也而其要則首在宜慎夫子一生戰疾並重臨事而懼好謀而成可以治軍可以

治病東垣療一證已煎黃連石膏復易以桂附
至數十觔乃愈此足見病情之難測而醫之不
可不慎也選味如選兵布方如布陣其逐邪也
如搗穴其固本也如守城其防過劑也如戒窮
追其培元氣也如籌善後明乎此而知公之
所以言醫者其卽公之所以言兵乎昔文正
輔相仁宗設施未竟而其經略關隴屹然長城
則固小范老子胸中有數萬甲兵也公承

增輯傷寒類方目錄

卷一

桂枝湯類一

方十九

麻黃湯類二

方六

葛根湯類三

方三

柴胡湯類四

方六

長沙方歌括

古聞陳念祖原本

貴州蕭庭滋

增輯

古吳潘 蔚

古越汪 均校閱

桂枝湯歌

項強頭痛汗憎厥桂芍生
姜三兩同棗十二枚甘二
兩解肌還借粥之功按桂
枝辛溫陽也芍藥苦平陰
也桂枝又得生薑之辛同
氣相求可恃之以調周身

傷寒論類方

吳江徐大椿編釋

古吳潘 蔚增輯

茗上趙斯鐔校

桂枝湯

一 甘草。大棗。補脾精
以滋肝血。芍藥清

營中之熱。桂枝
達營氣之鬱也。

桂枝 三兩 去皮 芍藥 三兩 甘草 二兩

炙 生姜 三兩 大棗 十二枚 擘 右五

味。咬咀。以水七升。微火煮。取

之陽氣芍藥而得大棗甘草之甘苦甘合化可恃之以滋周身之陰液師取大

補陰陽之品養其汗源為勝邪之本又歡粥以助之

取水穀之津以為汗汗後毫不受傷所謂立身於不

敗之地以圖萬全也桂氣味辛溫無毒主上氣

欬逆結氣喉痺吐及利關節補中益氣久服通神輕

身不老上品芍藥氣味苦平無毒主治

邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益

氣中品甘草氣味甘平無毒主五

藏六府寒熱邪氣堅筋骨

三升去滓適寒溫服一升服

已須臾歡熱稀粥一升餘以

助藥力桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云

穀入於胃以傳於肺主皮毛汗所從出歡粥充胃氣以

達於肺也觀此可知溫覆合

一知傷寒不禁食矣溫覆合一

時許遍身皦皦微似有汗者

益佳不可令如水流漓病不

必除此解肌之法也若如水

長肌肉倍氣力金瘡燻解毒久服輕身延年。上品

乾薑氣味辛溫無毒。主治

胸滿欬逆上氣溫中止血

出汗逐風溼痺腸澼下痢

生者尤良。中品

大棗氣味甘平無毒。主心

腹邪氣安中養脾氣平胃

氣通九竅助十二經補少

氣少津液身中不足大驚

四肢重和百藥久服輕身

延年。上品

太陽主一身之表司寒水

之經凡病自外來者皆謂

傷寒非寒熱之寒也或三

陽或三陰或寒化或熱化

及轉屬合併之異變遷無

定也。

在。若一服汗出病瘥。停後服。

不必盡劑。若不汗更服。依前

法。又不汗。後服小促其間。半

日許。令三服盡。若病重者。一

日一夜服。周時觀之。服一劑

盡。病症猶在者。更作服。若汗

不出。乃服至二三劑。桂枝湯全料謂

之一劑。三分之一。謂之一服。古一兩。今二錢零。則一劑之

三陽俱主表而太陽為表中之表也論以頭痛項強發熱惡寒為提綱有汗宜桂枝湯無汗宜麻黃湯陽明為表中之裏主裏實症論以胃家實為提綱又鼻乾目痛不眠為經病若惡寒頭痛為未離太陽審其有汗無汗用桂枝麻黃法若無頭痛惡寒但見壯熱自汗口渴為已離太陽宜白虎湯仲師提綱不以此者凡解表諸法求之太陽攻裏諸法求之陽明立法之嚴也

少陽居太陽陽明之界謂之陽樞寒熱相雜若寒熱往來於外為胸脇滿煩宜

藥除姜棗僅一兩六錢零一服不過五錢零矣治傷寒大

症分兩不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總

以中病為主後世見服藥得效者反令多服無效者即疑

藥誤又復易方禁生冷粘滑無往不誤矣

肉麪五辛酒酪及臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱風在外故

陽脈浮衛氣有邪則陽浮者不能護營故陰脈弱

熱自發風為陽邪故發熱陰桂枝之辛以散之

大小柴胡湯。若寒熱互搏於中。嘔吐腹痛。宜黃連湯。痞滿嘔逆。宜半夏瀉心湯。拒格食不入。宜乾薑黃連人參湯。若邪全入於膽府。下攻於脾。為自利。宜黃芩湯。上逆於胃。利又兼嘔。宜黃芩加半夏生薑湯。論以口苦咽乾目眩為提綱。

太陰濕土為純陰之臟。從寒化者多。從熱化者少。此

弱者汗自出。芍藥之酸以收之。甘草之甘以

緩之。嗇嗇惡寒。淅淅惡風。惡風未。有。

不惡寒者。但惡寒甚。輕非若中寒及陰之甚也。

翕翕發熱。其熱亦不如鼻鳴。

乾嘔者。鼻鳴似屬陽明。乾嘔似屬少陽。蓋三陽相

近。故畧有兼病。但不甚耳。

桂枝湯主之。

太陽病。頭痛發熱。汗出惡風。

經主寒症而言宜理中湯

四逆湯為主第原本為王

叔和所亂耳論以腹中滿

吐食自利不渴手足自温

腹時痛為提綱

少陰居太陰厥陰之界是

謂陰樞有寒有熱論以脉

微細但欲寐為提綱寒用

麻黃附子細辛湯麻黃附

子甘草湯及白通湯通脉

四逆湯熱用猪苓湯黃連

雞子黃湯及大承氣湯諸

法厥陰陰之盡也陰盡陽生

且屬風木木中有火主熱

者桂枝湯主之。此桂枝湯總

發揚衛性斂閉風傷衛

氣泄其皮毛故汗出也。

太陽病下之後其氣上衝者

可與桂枝湯方用前法。誤治若

不上衝者不可與之。此誤下。

下而仍上衝則邪氣猶在陽

分故仍用桂枝發表若不上

衝則其邪已下陷變病不一

當隨宜施治論中誤治諸法

詳觀自明。