

醫方集解

天津直隸書局
印行



足本大字醫方集解卷四目錄

收瀉之劑第十七

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

訶子散

河間訶子散

真人養臟湯

丹溪脫肛方

當歸六黃湯

牡蠣散

柏子仁丸

茯菟丹

消濁固本丸

水陸二仙丹

金鎖固精丸



南京中醫藥大學圖書館版權所印

珍珠粉丸

豬苓丸

人蔘樗皮散

桑螵蛸散

殺蟲之劑第十八

烏梅丸

集效丸

雄檳丸

化蟲丸

使君子丸

獺肝丸

消渴殺蟲方

明目之劑第十九

滋陰地黃丸

加減駐景丸

駐景丸



定志丸

子和定志丸

地芝丸

人蔘益胃湯

益氣聰明湯

消風養血湯

洗肝散

補肝散

又丹溪方

撥雲退翳丸

石膏羌活散

防風飲子

神效明目湯

又法

羊肝丸

濟生羊肝丸



兔矢湯

二百味草花膏

點眼方

百點膏

圓明膏

飛絲芒塵入目方

癰瘍之劑第二十

真人活命飲

金銀花酒

回毒金銀花湯

忍冬膏

蠟礬丸

托裏散

救苦勝靈丹方

散腫潰堅湯

飛龍奪命丹



雄黃解毒丸

阜角丸

桂枝去芍藥加阜角湯 阜蛤丸

托裏十補散

托裏散

托裏黃芪湯

托裏溫中湯

止痛當歸湯

生肌散

又二方

灸法

芙蓉外敷法

經產之劑第二十一

表實六合湯

表虛六合湯

風溼六合湯

升麻六合湯



柴胡六合湯

大黃六合湯

人蔘六合湯

朴實六合湯

梔子六合湯

石膏六合湯

茯苓六合湯

膠艾四物湯

附子六合湯

四物大黃湯

膠艾湯

釣藤湯

羚羊角散

紫蘇飲

天仙藤散

白朮散

竹葉湯

知母丸

黃連丸

紫菀湯

安榮散

薤朮飲



又法

瀝朮膏

黑神散

古黑神散

失笑散

通靈散

清魂散

返魂丹

當歸羊肉湯

當歸生薑羊肉湯

當歸散

啓宮丸

達生散

束胎丸

枳殼散

內補丸

豬蹄湯



天津直隸書局印行

廣濟方

人藿荆芥散

柏子仁丸

芎歸六君子湯

連附四物湯

四物加芩朮湯

寒六合湯

固經丸

升陽舉經湯

東垣升陽舉經湯

如聖散

牡丹皮散

正氣天香散

抑氣散

固下丸

四物加芩連湯

氣六合湯

熱六合湯

風六合湯



當歸煎丸

白芷散

救急良方目錄

暴死

氣厥

熱死

縊死

溺死

魘死

中毒

蠱毒

菌蕈毒

服鉛粉

蛇蟲犬咬傷

蛇傷

中寒

凍死

砒毒

鹽鹵毒

百毒

蜈蚣

壁虎



蠍子

瘋狗

湯泡傷

刀斧傷

骨鯁

誤吞鋼鐵金銀

吞髮繞喉不出

頰車開不能合

呃逆不止

舌脹滿口

乳蛾喉痺

霍亂絞腸沙

鼻衄不止

蟲入耳中

跌打損傷

產後血暈



產後子腸不收

勿藥元詮目錄

上古天真論

調息

調息之法

養生頌

小周天

六字訣

一秤金訣

金丹祕訣

李東垣論

精氣神

十六事宜

諸傷

風寒傷



溼傷

飲食傷

色慾傷



足本大字醫方集解卷四

收瀉之劑

滑則氣脫脫則散而不收必得酸澀之藥斂其耗散而後發者可返脫者可收也如汗出亡陽精滑不禁泄瀉不止大便不固小便自遺久嗽亡津此氣脫也若亡血不已崩中暴下諸大吐衄此血脫也十劑曰瀉可去脫枯蟻龍膏之屬是也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥亦兼氣藥氣者血之帥也陽脫者見鬼陰脫者目盲此神脫也當補陽助陰非瀉劑所能收也

赤石脂禹餘糧湯止利○仲景

治傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以

理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之下焦主分別清濁

復利不止者當利其小便利小水所以實大腸也

赤石脂 禹餘糧 等分杵碎煎

此手陽明藥也瀉可去脫重可達下石脂餘糧之瀉以止脫重以固下甘以益

氣李先知曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

桃花湯少陰下利○仲景

治少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者成氏曰陽明下利便膿血者協熱也

少陰下利腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也○凡下利便膿血身冷脈小者易治身熱脈大者難治

赤石脂一斤 乾薑兩 粳米一升

赤石脂禹餘糧湯 桃花湯 收瀉之劑



此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重澇入下焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

朱丹溪曰桃花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之重澇

不能止血用粳米之甘以引入腸胃準繩曰便膿血熱勢下流也氏釋為裏寒非也桃花湯雖用乾薑然分兩最微石脂粳米居多以調正氣瀉滑脫佐以乾薑用辛以散之之義諸便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴皋曰少陰腎水主禁固便為火所灼尅伐大腸庚金故下利膿血石脂寒能勝熱澇可收脫用乾薑者假其辛熱以從治用粳米者恐石脂性寒損胃也聊攝之明而猶昧此况其下乎膿血石脂寒能勝熱澇可收脫用乾薑者假其辛熱以從治用粳米者恐石脂性寒也不不知此而漫云滲泄腎防一徹前後泄利之成氏之死已久安能起而辨其是非乎如此證成氏以為寒而王肯堂吳鶴皋皆入其功非小奈何後起之士動輒非之成氏之死已久安能起而辨其是非乎如此證成氏以為寒而王肯堂吳鶴皋皆以為熱竊謂便膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒腸胃不固而亦便膿血者乎若以此為傳經熱邪仲景常用寒劑以散其熱而反用石脂固澇之藥使熱閉于內而不得泄豈非關門養盜自貽伊戚也耶觀仲景之治協熱利如甘草瀉心生薑瀉心白頭翁等湯皆用岑連黃藥而治下焦虛寒下利者用赤石脂禹餘糧湯比類以觀斯可見矣此證乃因虛以見寒非大寒者故不必用熱藥惟用甘辛溫之劑以鎮固之耳本草言石脂性溫能益氣調中固下未聞寒能損胃也若準繩則執凡傳經者皆屬熱邪一語遂以為熱耳程郊情每以直中為寒邪傳經為熱邪古今相傳二語覺未盡然不為無見若學未深造而輕議古人多見其不知量也矣

訶子散 泄瀉脫肛○東垣

治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作膿血日夜無度御米穀

去蒂蜜炒五分

糲去核七分 乾薑 炮六分 橘紅 五分 右末空心服

此手足陽明藥也御米穀酸澀微寒固腎澇腸訶子酸澀苦溫收脫住瀉炮薑

辛熱能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調氣以固氣脫亦可收形脫也

泄瀉為氣脫脫肛為形脫

河間訶子散訶子 一兩半生半煨 木香 五錢 甘草 一錢 黃連 三錢 為末每服二錢用白朮芍藥湯調

下治瀉久腹痛漸已瀉下漸少以此止之如不止加厚朴 一兩 竭其餘邪 木香黃連香連丸也行氣

清火止痢厚腸甘草芍藥甘芍湯也甘緩酸收和止痛加訶子瀉以收脫加白朮補以強脾厚朴除溼散滿平胃調中故更藉之以去餘邪也

真人養臟湯 瀉痢脫肛○謙甫

治瀉痢日久赤白已盡虛寒脫肛

肛門為大腸之使大腸受熱受寒皆能脫肛○大腸者傳導之官腎者作強之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主

故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆易脫肛

亦治下痢赤白臍腹痛日夜無度

罌粟殼

去蒂蜜炙

訶子

麵裹煨一兩三錢

肉豆蔻

麵裹煨五錢

木香

二兩四錢

肉桂

八錢

人參

白朮

炒當歸六錢

白芍

炒一兩六錢

生甘草

一兩八錢

每服四錢臟寒甚加附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參朮甘草以補其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和血芍藥酸以收斂訶子罌殼則瀉以止脫也

虛此

寒脫肛之劑宜大補元氣或加芎歸調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連槐藥或四物加升麻柴胡秦艽防風之類

附丹溪脫肛方人參黃耆當歸川芎升麻

此治氣血兩虛而脫肛者

當歸六黃湯 血汗

治陰虛有火盜汗發熱

心之所藏于內者為血發于外者為汗汗乃心之液也五臟六腑表裏之陽皆心主之

盡由心出也醒而出汗曰自汗屬陽虛睡而出汗曰盜汗屬陰虛汗者心之陽衰者腎之陰虛虛睡熱衛外之陽乘虛陷入陰中表液失其固衛故濺濺然汗出覺則陽氣復而汗止矣因熱邪乘陰虛而出者汗必熱因寒邪乘陽虛而出者汗必冷有火者謂有面赤口乾居燥便赤音重脈數諸證○凡傷風傷溼中暑風溫柔溼氣虛血虛脾虛胃熱亡陽痰飲驚怖勞役房室癱瘍產蓐等證皆能令人出汗經又云飲食飽甚汗出于胃驚而奪情汗出于心持重遠行汗出于腎疾走

恐懼汗出于肝搖體勞苦汗出于脾凡頭汗左額屬肝右額屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心津液自胃腑旁達于外為手足汗有胃熱胃寒二證自汗亦有屬實者故外感初證多自汗

液自胃腑旁達于外為手足汗有胃熱胃寒二證自汗亦有屬實者故外感初證多自汗

真人養臟湯 當歸六黃湯

收瀉之劑



當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連等分 黃耆加倍

此手足少陰藥也盜汗由于陰虛當歸二地所以滋陰汗由火擾黃芩藥連所

以瀉火溼無熱不作汗溼得熱蒸則令人汗出汗由腠理不固倍用黃耆所以固表李時珍曰當歸六黃湯加麻黃根治盜汗甚捷其性能

行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理也按此盜汗與傷寒盜汗不同傷寒盜汗邪在半表半裏故以和表為法古法小

柴胡加桂主之此屬陰虛故以補陰為主李士材曰陰虛則元氣有降而無升而復用此苦寒肅殺之劑得無犯虛虛之

戒乎惟火實氣強者宜之不然苦寒損胃禍彌深耳○準繩曰陰虛陽必湊故發熱盜汗當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰

必乘故發厥自汗黃耆建中湯甚者加附子或者附湯有溼熱合邪汗出不休以風藥勝其溼甘藥泄其熱羌活勝溼散

有痰證冷汗自出宜理氣降痰痰去則汗自止有用固澀藥汗愈不收止可理心血汗乃心之液心失所養不能攝血液

溢而為汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微熱者更加石斛下靈砂丹王海藏曰管郎中童子盜汗七年諸藥不效予與淡

膈散三黃丸三日病已蓋腎主五液化為五溼腎水上行乘心之虛心火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而開為

汗出也先以涼膈散瀉胸中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本臟玄府閉而汗自止矣○玄府汗孔也

附撲汗法白朮藁本川芎各二錢半米粉兩半為末絹袋盛週身撲之治汗出不止又方

龍骨牡蠣糯米等分為末撲之

牡蠣散陽虛自汗

治陽虛自汗

牡蠣煨黃耆 麻黃根一錢浮小麥百粒煎服

此手太陰少陰藥也陳來章曰汗為心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之

鹹涼去煩熱而止汗陽為陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌

表而固衛