

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸一日死腸兩頭見者可連續之先以針線如法連續之斷腸便取雞冠血塗其斷處勿令氣泄即

推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃可糜爛百日後乃可進飯(病源)○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得多

飲粥則血溢出血殺人又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發甚者即死(聖惠)○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心則死(耳心)

不治證

十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二日難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可醫全斷不可治○小腹下傷內者○證後繁多者○脈不實重者○老人左股壓碎者○傷破陰子者○

血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必用藥(得效)○凡金瘡傷天窗(穴名)眉角腦後臂裏跳脈脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑俞皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸

聲口急唾出兩手妄舉皆不治(聖惠)

金瘡脈候

金瘡出血太多其脈虛細者生數實者死○金瘡出血脈沈小者生浮大者死研刺出血不至脈來大者七日死滑細者生(脈經)○金瘡出血虛細則宜實大則傾(得效)○傷雖淺命脈虛促

可慮傷至重命脈和緩永無慮也○血出甚者脈不要洪大只要平正重實(得效)

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者可治○腸及肚皮破者麻線為線或桑白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之腸子則以清油熬活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮

留皮間用藥膠待生肉(得效)○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散(即苦歸湯)與服用手摩去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀(得效)

效得

金瘡先宜調血

天凡金瘡及折傷墮墮內損者必有瘀血傷積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血為主(正傳)○花蕊石散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用(方)

諸方



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸一日死腸兩頭見者可連續之先以針線如法連續之斷腸便取雞冠血塗其斷處勿令氣泄即

推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃可糜爛百日後乃可進飯(病源)○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不得多

飲粥則血溢出血殺人又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發甚者即死(聖惠)○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心則死(耳心)

不治證

十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二日難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可醫全斷不可治○小腹下傷內者○證後繁多者○脈不實重者○老人左股壓碎者○傷破陰子者○

血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必用藥(得效)○凡金瘡傷天窗(穴名)眉角腦後臂裏跳脈脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五臟六腑俞皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸

聲口急唾出兩手妄舉皆不治(聖惠)

金瘡脈候

金瘡出血太多其脈虛細者生數實者死○金瘡出血脈沈小者生浮大者死研刺出血不至脈來大者七日死滑細者生(脈經)○金瘡出血虛細則宜實大則傾(得效)○傷雖淺命脈虛促

可慮傷至重命脈和緩永無慮也○血出甚者脈不要洪大只要平正重實(得效)

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者可治○腸及肚皮破者麻線為線或桑白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之腸子則以清油熬活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮

留皮間用藥擦待生肉(得效)○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散(即苦歸湯)與服用手摩去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀(得效)

效得

金瘡先宜調血

天凡金瘡及折傷墮墮內損者必有瘀血傷積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血為主(正傳)○花蕊石散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用(方)

諸方



止血生肌合瘡藥

傷至重者海味中鹹白鯨成片鋪在傷處以帛托定血立止(得效)○止血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單血竭未付之尤妙○黃丹滑石未付之夏月以薄

荷葉貼之一日一次以藥水湯洗得效○金傷散糝付神效(集要)○金瘡血不止黃丹白礬為末

摻之又下子蠶蛾燒灰付之(聖惠)○下盤室瘡不合取所割勢火煨為末酒調服昔有一人自割其

勢瘡久不合用此方

箭鏃及金刀中骨脈不出

白斂半夏等分為末每取一錢淡薑湯調服日三至二十日自出(入門)○出(聖惠)

石著其上自出(聖惠)

救急方

金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納其人于牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭末調湯

熱尿多灌即甦重尿尤好(丹心)

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各等分右為末每三錢溫酒調服日三立驗(入門)

花蕊石散

治一切金刀所傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處糝藥其血化為黃水再服藥便

活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶欲死服此藥則化為黃水或吐出或下泄出花蕊石四兩疏黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾女四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取出研細每取一大匙重尿入酒煎熱調服(入門)

奪命散

治金刀所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五錢大黃

雞鳴散

治金刀傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅鬱欲死大黃一兩當歸二錢半麝香火許右為末每三錢熱酒調下(聖惠)

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡別研三錢柴胡連翹當歸枳各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香火許右除水蛭麝香外餘藥對作一貼酒水相

半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈(東垣)

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜萸根甘

金傷散

治一切金瘡重午日早朝使四人各出四方採草木葉各半把至日午時入石灰一斤同搗極
爛登大桑木三兩株作孔納藥實築以桑皮蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填固至
九月九日午時取出陰乾百日搗
羅為末如遇傷慘之神效(御藥)

單方凡二十四種

新汲水

人被金瘡及損傷腸出以新汲泉
水噴之令身寒勝自入也(本草)

石灰

瘡金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末裹之定痛止血
神效○又石灰和雞子白火煨為末付瘡立差(本草)

葛根

瘡金瘡止痛為末付之
濃煎取汁服之(本草)

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐安金藏割腹用此法使愈○神
仙刀箭藥妙不可言桑葉為末乾糝之○金瘡止痛桑柴灰付之佳(本草)

螻蛄

箭鏃在咽喉胸膈不出螻蛄搗取汁滴上三五度自出○
針入肉不出螻蛄腦同疏黃研付覺癢針自出(本草)

蜚蠊

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蜚蠊同研勻塗傷處待極癢便撼動拔之立出後以生
肌膏貼之○出箭鏃方蜚蠊金者麝香少許同為末撥動箭頭藥瘡肉自出(本草)

旋菖根

即旋花根也合金瘡續斷筋取根
搗汁滴瘡中滓封瘡上炊(本草)

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和水
服令一日服盡當下如水乃血消也(本草)

蔥

治金瘡因驚出血不止取蔥炙熱按取汁付之血即止
○金瘡中風水腫痛蔥葉煨研置付立愈(本草)

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓令極冷使
人含嚥瘡上又嚥其背腸漸自入勿令眾人見(本草)

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石
灰搗為末糝之血便斷(本草)

鼠腦

治箭鏃及針刀在咽喉胸膈諸隱處不
出取出鼠腦及肝搗付之即出(本草)

血竭

瘡金瘡止血止痛生肌最妙利肩
付之但性急不可多用(入門)

壁錢

主金瘡血不止取汁
點瘡上良(本草)

紫檀香

治金瘡急割紫檀末付之
止血止痛至妙(本草)

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之○中營前
闕絕琥珀末一錢童尿調服妙(本草)



蛇含草 主金瘡揭付之佳。○又云蛇含膏連已斷之指。(本草)

熟艾 搗金瘡止血止痛易合或煎湯或熏烟亦好(俗方)

藍葉汁 金瘡血悶取藍汁飲之(本草)

青蒿 生按付金瘡止血止痛生肌最妙(本草)

小薊 主金瘡血不止按葉封之(本草)

顛撲墮落壓倒傷 凡墮壓死者急安好處以袖掩其口鼻上一食頃候眼開光與熱小便欲之若初覺氣絕

人如僧打坐令一人將其頭髮控放低以半夏末或皂角末吹入鼻內如活即以薑汁香油打勻灌之(綱目)○若取藥不及急扶開口以熱小便灌之利去瘀血(得效)○卒墮擗壓倒打死心頭溫者皆可救活損傷筋骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早則有入腹攻心之患(醫鑒)○跌撲傷損須用蘇木活血黃連降火白朮和以重便煎服妙傷在上宜飲韭汁(丹心)○凡顛打壓傷或從高墮落皆驚動四肢五藏必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥和重便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻心之患矣(得效)○凡傷損專主血論肝主血不問何經所傷惡血必歸於肝流於血脈於腹而作脹痛實者下之宜通導散桃仁承氣湯(方見寒門)奪命散(方見上)○虛者復元活血湯(方見上)當歸續命散調之(入門)○凡出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之(入門)○諸傷疼痛宜乳香定痛散乳香散雙烏散尋痛丸陣王丹補損當歸散(諸方)○蘇合香丸治打撲墮落撲驚悸氣血錯亂昏迷不省急取三五丸溫酒童便調灌即甦(方見氣門)○得效○頭上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風慎之(得效)

通導散 治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右剉作一貼水煎空心服(醫鑑)○一名大成湯(醫林)

當歸續命散 治打撲損傷致氣凝滯血結胸膈脇痛當歸尾一錢半芍藥烏藥香附子蘇木各一錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右剉作一貼酒水相半煎服(入門)

蚌霜散 治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服(入門)

乳香定痛散 治諸傷損疼痛白芷當歸生草壯丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等分右為末每二錢溫酒童便各半調勻服之(入門)○一名活血止痛散(醫鑑)

乳香散 治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香沒藥甘草各等分右為末每二錢溫酒調下(得效)

雙烏散 治諸傷損久得時常疼痛者及新被傷作痛亦宜川烏草烏各炮各三錢當歸白芍藥蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但草烏生

用恐太猛所以
畧炮(入門)

尋通丸

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香大麝及藥大麝五靈脂各三錢生

陣王丹

治諸折傷止血定痛大黃一兩石灰六兩右同炒

補損當歸散

治諸撲折傷瘀痛叫號服此藥不復大痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心川椒當

打撲傷消腫滅癰

凡開毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯(方見寒門)熱服取汗外用

或傷服上青黑不敵大黃為末生薑汁調付患處即消名將軍膏(醫鑑)○散被毆癰瘡血流注

油清酒各一椀同煎數沸服之服了以大燒熱地上一夜痛止腫消無痕有破傷者仇家陰令

脈候及不治證

若得急疾大數者死(醫鑑)○凡打撲傷外損筋骨者可治內損藏府裏膜及破陰子且後者

並不治與上下不治證參看○入門○如傷藏府致命處一觀其脈虛促危矣(得效)

單方 凡十七種

蒲黃

治撲損瘀血在內煩悶滿黃末三錢熱酒調下(得效)

生龜

治撲損跌折取血和酒飲之內生研厚塗傷處立效(本草)

鼠屎

治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末諸脂調急裹之不過半日愈(本草)

荷葉

治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末熟童尿調下二錢日三○未展荷葉為末童便調服利下惡物(綱目)

麻根

主打撲落傷跌折有瘀血痛不可忍取根及葉搗取汁飲或煮服之非時則取乾麻煮汁飲(本草)

稻稈灰

治墮落撲損痛楚稻稈燒灰和糟酒淋取汁乘溫淋洗痛處立差(本草)

芥子

撲損瘀血作痛芥子和生薑研微煖塗貼患處即效(本草)

白楊樹皮

治撲損瘀血痛不可忍取樹皮酒漬服之(本草)

蟾蜍

主打撲跌折血在腸下墜滿痛取汁和酒服又研付傷處(本草)

胡桃

溫撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便去(本草)

蔥白 治打撲傷損痛不可忍取蔥白入爐火煨來熱攪開其中有涕便將罨損處冷則易

人尿 主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿等服一二升即醒童子尿尤佳(本草)

烏雞 被壓窄墮舟船車轆馬蹄牛觸胸腹破傷四肢摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛料一十下和若酒

草

烏鴉羽 治墮落損傷瘀血脹心面青氣短取名翹羽七枚連灰和酒服當吐血便差(本草)

犬膽 治撲損刀箭傷內有瘀血取胆熱酒調服瘀血盡下(本草)

酒糟 主打撲墮落損傷瘀血腫痛酒糟和醋滓蒸溫熨之妙(俗方)

水蛭 主墮撲若傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末

骨折筋斷傷 凡脚手各有六出臼四折骨每手有三處出臼脚亦三處出臼手掌根出臼其骨交互相鎖或

方入窠臼只用手拽斷入窠十有八九成痼疾也得效○骨節損折肘臂腰膝出臼蹉跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法得效○搗骨歸窠用竹一片(生柳木片尤佳)板夾定一邊一邊不用夾須存曲直處時時拽屈拽直不然則愈後曲直一得(得效)○凡骨碎者須用麻藥(即草烏散)與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者與細骨去免膿血之禍且以藥水一日一洗莫令臭穢(得效)○凡骨碎者用接骨藥火上化開糊骨上然後夾定外用夾骨法活血散接骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接骨散自熬銅散接骨紫金丹○淋洗用蔓荆散(諸方)

艸烏散 即麻藥也凡骨節出臼用此麻之然後用手整頓皂角木鼈子紫金皮白芷半夏烏藥當歸川芎

者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸窠用夾夾定然後醫治如剪鐵入骨不出亦用此藥麻後或鉗出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與服立醒(得效)

夾骨法 小蝦蟆四五個皮硝三分生薑一兩酒糟一椀腫者紅內消即紅何首烏也同搗敷折傷之處(入門)

活血散 治折傷菜豆粉炒紫色新汲水調成膏厚付折傷處

接骨丹 當歸七錢半川芎沒藥骨碎補各五錢川烏煨四錢古文錢三個火煨醋淬七次乳香二錢半木香一錢黃松香脂也六兩香油一兩半右為末和油成痛攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復續



如初
(回春)

二生膏

治折傷手足生地黃一斤生薑四兩右搗入酒槽一斤炒熱布裹傷處熨之傷筋損骨痛不可忍神效(醫鑑)○傷損臂曰脫出腫痛生地黃搗爛攤油紙上火撈木香末一層又攤地黃貼患處明日痛即止(得效)○治折傷斷筋碎骨生地黃搗爛取汁好酒和服日二三次最妙又搗爛蒸熟封傷處一月筋骨連綿蓋地黃屬骨(種杏)

糯米膏

治撲傷筋斷骨折糯米一升皂角切碎半升銅錢百個同炒至焦黑去錢右為末酒調膏貼患處神效(綱目)

麥斗散

治跌傷骨節土鼈一個瓦上焙巴豆一個去殼半夏一個生乳香沒藥各半分自然銅火煨醋淬七次用些火右為末溫清酒調服一釐如重車行十里之久其骨接之有聲初服之時須理如舊以綿衣蓋覆方服藥勿轉動端午日製尤妙(回春)

沒藥降聖丹

治打撲閃肭筋斷骨折痛不可忍生乾地黃川芎各一錢半自然銅火煨醋淬十次別研每服一丸水酒各半盞入蘇木一錢同煎去蘇木調藥空心熱服(丹心)

接骨散

治骨折乳香沒藥各二錢半自然銅煨淬別研五錢滑石一兩龍骨赤石脂各一錢半麝香火許脂而服極效(丹心)○一方將藥除麝香浸酒煮乾為末黃蠟五錢熔化乃入麝香和勻作丸彈子大每一丸酒煎以東南柳枝攪散空心熱服名曰接骨丹(入門)

自然銅散

治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木真降香(無則紫橐代之)川烏松明節自然銅火煨醋淬七次各五錢地龍油炒龍骨生水蛭油炒焦各二錢半血竭一錢半土狗五個油浸焙右為末每五錢好酒調下自頂心尋病至下兩手兩足周遍百身病人自覺藥力習習往來遇病處則風聲有聲(得效)

接骨紫金丹

治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土鼈(一方用土狗)自然銅火煨醋淬七次別研骨碎補大黃血竭當歸尾乳香沒藥研砂各一錢右為末每服八釐熱酒調服其骨自接(入門)

蔓荊散

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉(無則荊芥代之)蔓荊子白芷細辛防風川芎桂皮丁香皮羌活各一兩右為粗末每一兩入鹽一匙連翹蔥白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易(丹心)

單方
凡十
四種



赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅大煨醋淬七次或九次細研溫酒調一字或半錢服直入骨損處

自然銅

療傷損骨折火煨醋淬七次研細水飛同當歸沒藥各半錢溫酒調服仍以手摩

合歡皮

主骨折專能接骨取皮炒黑色四兩芥子炒

續斷

治撲損瘀血能續筋骨煮

白蠟

屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定

蟹

脚中髓及腦并敲中黃並能續斷折筋骨取碎之微

人中白

治閃挫跌撲傷骨極重人中白

生栗

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生栗塗付之

烏雄雞

主跌折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹傷處炒(本草)○又

瘡傷斷耳鼻方

治擦落耳鼻用油髮灰末乘急以所落耳鼻蘸髮灰綴定以綿帛縛定有人為驢所咬下

處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂火許為末蜜調噴化而愈(綱目)○接指方蘇木末末敷斷指間接

定外用蠶蠟包縛完固數日如故(入門)○一人落馬被所佩鎖匙傷破陰囊二凡脫落懸挂未斷痛

苦無任諸藥不效于教人漫漫托上多取壁

錢敷貼傷處日漸就安其囊如故(醫聖)

杖傷

凡杖舉即用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙實者雞鳴散(方見上)下之虛者當歸續散

鹽水煮熟鋪杖處其氣如蒸其腐即紫復換貼以色淡為度潰爛者亦宜(種杏)○痛甚者內服乳香

膏藥(入門)○杖傷只是血熱作痛用定藥去瘀血為先須服雞鳴散之類外貼以五黃散或大黃黃

柏為末生地黃汁調付之○又野苧根嫩者洗淨同鹽搗付神妙(丹心)○又鳳仙花科連根葉搗爛

貼患處乾則易一夜血散即愈(醫聖)○又菜豆粉微炒雞子清調付之(醫鑑)○杖瘡宜服乳香散

化瘀散補氣生血湯烏龍解毒散(諸方)○大概通滯血皆以酒化服蓋血滯則氣壅於氣壅於則經

旋菖根

即旋花根也瘡破研筋斷取根搗碎

生地黄

主屬骨若傷損骨碎生地黄

高莖子

主打落折傷取子微炒為末酒服二

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)

三錢能接續筋骨名接骨散(回春)



北京中醫藥大學圖書館藏

絡滿急故腫且痛凡打撲著肌肉須腫痛者以經絡傷氣血不行故如
是本草○凡杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者死入門

五黃散 治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃柏大黃乳香各等分
為末新水調成膏以緋絹攤貼傷處日三易精要

乳香散 治杖瘡腫痛自然銅煨醋淬七次當歸各五錢
四錢乳香沒藥各三錢右末每三錢溫酒調下精要

化瘀散 治杖打重血上攻心煩悶絲木當歸尾各三錢大黃紅
花各二錢右末每三錢溫酒重便調和服醫鑑

補氣生血湯 治杖瘡潰爛久不愈人參白朮白芍藥當歸
熟地黃甘草各一錢右剉作一貼酒水相半煎服醫鑑

烏龍解毒散 治人受杖責後疔甲爛肉疼痛難忍不能起動服此痛止便能動履其效如神
砂鍋內炒焦存性為末每服五錢熱酒一椀調服服後少頃其藥力行至杖瘡上微肉裏

透如針刺癢甚不時流血水即以藥水洗淨貼膏藥回春去疔甲取雞子清入麝香火許以銀簪打
成稀水用簪尖輕輕點上不多時其疔甲化爛取去一日一換貼膏藥化盡死肉不數日復平如故矣

春

打著不痛方 未打之前先取白蠟一兩細切入碗內滾
酒泡服則雖打著不痛名寄杖散醫鑑

單方凡五

薤薑根 治杖瘡皮不破而內損者薤
薑根搗爛爛傷處良種杏

沒藥 主杖瘡腫痛不可忍細研取
一錢熱酒調服炊本草

飴糖 治打損瘀血飴糖熬和
酒服能下惡血本草

人咬傷 人咬傷成瘡龜板或蟹
甲燒灰油調付綱目

諸獸傷

虎傷 人被虎咬先飲清油一碗又白礬為末納傷處又砂糖水調服一二碗并塗傷處入門○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛
瘡取青布緊捲燒一頭納竹筒中向瘡口令烟熏之佳本草○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛

馬糞 治杖傷入風疼痛馬糞或鹽溼糞替
換熱熨日五十遍極效本草

鼠 治打傷瘡生鼠一枚和臘肚剉油半斤煎
令焦黑收之以雞羽蘸付瘡上妙本草



出良(本草)○虎犬咬人并蓮取汁飲一升日三津付傷處(本草)○虎狼傷人生雞肉食之
又生薑汁飲之又洗瘡又婦人月經赤衣燒為灰和酒服(本草)○乾薑末納瘡妙(本草)

熊傷 熊傷人燒青布取烟熏瘡口令毒出(本草)○又煮葛根取濃汁以洗瘡十度并搗葛根為末調葛
根汁服日五(本草)○熊傷人萌蘿對水漬取汁飲津付瘡上○熊虎傷者生鐵令有珠洗之

虎爪甲傷嚼生

栗付之(本草)

馬驢驘咬踢傷 馬咬踢傷益母草搗爛和醋炒付(本草)○又馬鞭梢燒灰塗之○獨顯票子燒灰貼重
妙(得效)○又鼠屎二七枚故馬鞭梢五寸同燒灰猪脂調付(本草)○又用艾炙傷處

取人尿或馬尿燒灰為末付之(入門)○嚼生栗付之(綱目)○又取雞冠熱血塗瘡中
或浸之(本草)○驢或馬咬人或骨刺傷取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳(本草)

牛傷 牛觸腸出不損者急送人以桑白皮尖或生白麻為線縫合肚皮縫上瘀血竭末或石單搗末血止
立活勿封瘡恐內作膿(入門)○腸破腸出臭穢急以香油撲腸用手送入燕人參地骨皮湯洗之

皮自合吃羊肉羹
十日愈(入門)

犬傷 凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎古黑者即是狂犬若被其傷乃九死一生之
患急用針刺去血以人小便洗淨用胡桃殼半邊以人糞填滿掩其瘡上著艾炙之殼焦糞乾則易

之灸之百壯次日又灸百壯灸至三五百壯為佳(千金)○風狗咬傷即先口噙漿水洗淨或以熱人
尿淋咬處嚼生薑搗之又用蔥白嚼爛塗之又杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬頭根研細蔥湯洗後

塗之尤佳(綱目)○於患人頂心中有一紅髮即當拔去後服藥快效(十三方)○一方斑貓二十一
個去頭翅足以糯米一勾先將貓七個同炒不令米赤去貓再入七個同炒貓色變去之又入七個同

炒米出青烟去貓取米研為粉冷水入清油少許空心調服(一勾分三服)火頃又進一服以小便利
下惡物為度否則再用一服利後腹痛急以冷水調青酸服或服黃連湯以解其毒否則有傷不可便

食熱物
(綱目)

犬咬毒防再發 風狗咬急用斑貓七個去頭翅足為末溫酒調服其毒必從小便中出可將尿缸盛清水
令患人尿其中停半日見濁氣凝結如狗形則毒已出如不見狗形須服七次方可無狗

形乃不再發極驗若小便流蓋元散(方見暑門)水調服最妙(十三方)○狂犬咬先口噙漿水洗淨
用玉真散(方見風門)乾貼之更不再發神效(丹心)○又仍殺所咬犬取腦付傷處後不復發(本

草)○刺火傷或經久復發無藥可療雄黃明者五錢麝香五分右為末酒
調二錢服服後必使得睡切勿驚動任其自醒須利下惡物乃效(綱目)

狂犬傷出毒法 宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑頭末各三錢斑貓一錢麝香三分雄黃二錢半右為
末每二錢滾水調服惡物從小便而出(入門)○狂犬傷蛇蝎蟻封之出犬毛神效(本

蚰蚱丸○又生麻油研豆豉為膏丸如彈子犬常常搗拭所咬處却搗開看

扶危散 治風狗咬斑貓七日內用七個犬日外每日加一個十日十個百個去翅足糯米同炒滑

狂犬毒入心 狂犬咬人久不差口吐血沫者為犬毒入心呼喚似大聲天靈蓋燒灰為末水服一錢以活立

草○狂犬咬人發狂如犬叫蝦蟆膽食之又虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒調二錢服之

禁忌法 被狂犬咬人終身禁食大肉及蠶蛹此毒再發則不可救三年之內亦忌食一切毒物及房事常食杏仁以防其毒

單方 凡六

白礬 狗咬白礬末納瘡中止痛速愈

杏仁 殺狗毒作粥常食之又搗爛貼傷處最佳

草麻子 主犬咬傷取五十粒去殼研為膏付之

針灸法 狂犬咬人當先針刺去惡血仍灸瘡中十壯自後日灸一壯至百日乃止忌飲酒

○常飲韭菜自然汁以滓封灸瘡永不復發

貓傷 人為貓所傷取薄荷葉細嚼付之

鼠咬傷 取貓毛燒灰入麝香火許津調付

諸蟲傷

蛇咬傷 中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半為末酒調二錢灌之以津付患處即愈

雄黃細末貼瘡口立效

東醫寶鑑



北京中醫藥大學

死雄黃乾薑等分為末付傷處（本草）○中蛇毒眼黑口噤欲死蒼耳嫩葉一握搗取汁溫酒和灌之
滓付瘡上（本草）○又白芷末麥門冬湯調服滓付傷處（綱目）○又細辛白芷各五錢雄黃二錢麝
香少許為末每二錢溫酒調服（綱目）○又白礬甘草等分為末每二錢冷水調下（綱目）○毒發急時以熱
出却以滓付患處即癒（綱目）○又白礬甘草等分為末每二錢冷水調下（綱目）○毒發急時以熱
人尿洗出血次取口中唾塗之又以牙並封傷處又取人尿厚付布裏即消（丹心）○急發好時以熱
合毒氣不隨血走或清油亦可（入門）○凡蛇毒取獨頭蒜或小蒜或苦苣或水蓼或豆葉或豆葉或豆葉或豆葉
搗飲汁以滓付傷處（本草）○又絲瓜根洗淨搗研生酒調吃一醉立已（海上）○又鵝黃及鵝黃
灰飲服滓付之（本草）○又蚯蚓或蝦蟆搗付之（本草）○牛耳中垢猪耳中垢取付之諸蟲燒灰佳
之（本草）○被蛇咬人忌食酸物梅子犯之必大痛（綱目）○蜈蚣制蛇毒為末付之（本草）
草）○辟蛇法殺羊角燒之蛇即逐去又小袋盛雄黃帶之蛇遠避之養蠅辟蛇（本草）
蝎螫傷下取泥用（本草）○蝎螫痛不可忍冷水漬之即不痛水微煖復痛即易新水（本草）○蝎螫痛
半夏生一字雄黃一字巴豆一個右同研付之（綱目）○又白礬半夏為末搗調貼之痛止毒出得
效）○又驢耳中垢或猫屎塗之蜘蛛取汁付之又地上磨生薑塗之又薄荷細嚼付之又白礬熔汁
滴傷處

（本草）

蜈蚣咬傷

蜈蚣咬人傷痛取蜘蛛咬處當自吸毒如此而痛未止更易生者如蟹蚤死即投水中救活
研塗之又人頭垢塗之又黃蠟火上溶汁滴患處（本草）
重之又鹽湯漬之又黃蠟火上溶汁滴患處（本草）

蜘蛛咬傷

蜘蛛咬人腹大如拳一身生絲羊乳飲之未幾日而平（本草）○蜘蛛咬遍身成瘡取好酒飲
化水點咬處即差（本草）○蜘蛛咬人瘡中出絲原有死者惟飲羊乳可制其毒（本草）○又薑汁一
碗入雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁並點咬處有人被斑蜘蛛咬腫痛垂死得此方即愈只服薑
汁亦好（本草）○蜘蛛傷土蜂燒末油和付之又取土蜂窠土醋調塗之穴土居赤黑色者是蜂也
本草）○又多取人尿灌囊中生浸其身防蜂毒入肉（本草）○又烏雞尿浸酒服又取冠血塗之本
草）○薤白或韭白搗付之又雄黃末付之又桑白皮
汁塗之又蔓青子研油付之又小蘗汁飲之又桑白皮

蚯蚓傷

有人中此毒腹大夜間蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈○有人跳立溼地中其毒先飲鹽
草）○蚯蚓吹瘡雞屎付之○蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身愈（本
又老茶葉細末油調付地蟻即癒也（綱目）

蚯蚓傷

有人中此毒腹大夜間蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈○有人跳立溼地中其毒先飲鹽
草）○蚯蚓吹瘡雞屎付之○蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身愈（本
又老茶葉細末油調付地蟻即癒也（綱目）

又老茶葉細末油調付地蟻即癒也（綱目）

蠅螬傷

此蟲又名八角虫隱於壁間以尿射人遍身生瘡如湯火傷烏雞餅燒灰雞子清調塗之(綱目)

○又鹽湯淋漬瘡上數日愈又羊角水磨塗之上行八磨塗之又雞屎塗之又胡燕窠中土猪

蜂叮傷

蜂螫人嚼青蒿汁之○又薄荷按貼之○蜂房為末猪脂和付○按手並擦之即愈○

蠶咬傷

屋上爛茅和醬汁研付○磨香蜜調塗之○芒

蝸牛傷

人為蝸牛咬所咬毒通身者

蝮蛇傷

蝮蛇咬人石灰醋和塗之○柳葉燒

壁鏡傷

壁鏡咬人必死桑灰淋濃汁調白礬

夏月諸瘡傷辟蛇蛆法

夏月諸般傷損潰爛蛆虫極盛臭不可近蛇退燒存性一兩蟬殼青黛各五錢細

爛○一人夏月收麥被驟跑倒又咬傷二三處至五七日膿潰臭惡蛆虫極盛藥不能

雜色蟲傷

夏月有雜色毛蟲極毒觸人生瘡癢痛骨肉皆爛鼓一挽清油半盞同搗厚付傷處經一宿取

草木著人似刺割便腫痛肉爛若著手足指節墮落研此藥和膠清塗之(本草)○又蛇骨刺人毒腫痛

燒死鼠為末付之(本草)○諸蟲毒傷青黛雄黃等分為末新汲水調下二錢乃外塗之(本草)

人被天蛇毒似癩而非癩天蛇即草間黃花蜘蛛也人被其螫因為露水所濡乃成此疾遂者秦皮汁

一斗飲之差(本草)○諸蟲毒傷大抵搗蘆香油燒火吹滅以烟熏之即愈(綱目)○五毒蟲毛螫亦

痛不止馬齒莧按付之(本草)○蛇蝎蜘蛛咬生雞卵輕敲一小孔合咬處立差(本草)○諸蟲咬磨

香塗之又小蘗或藍葉

搗汁飲又付之(本草)



由爵吳萊莫對之骨當爛出又取海瀝皮煮汁服又魚狗烏燒為末和飲頓服又象牙未厚塗自軟出(本草)○鐵絲竹木刺入肉不出鼠腦厚塗之即出(本草)

解毒

灸法

凡蛇虺蜈蚣毒蟲咬傷於傷處灸五壯或七壯即愈(丹心)○被惡蛇螫即貼蛇皮於螫處火灸其上引出毒氣即止(本草)

解毒

凡有蠱之鄉見人家門限屋梁無灰塵潔淨者其家必畜蠱當用心防之(易簡)○蠱者人取三虫之類(蝦蟇蜈蚣蛇也)○以器皿盛之(蠱字從虫從皿)使其自相啖食餘一存者名為蠱而能變化人有造作故事以酒肉祭之取出放毒於飲食中其毒心悶腹痛而目青黃或吐鮮血或下膿血病人所食之物皆化為虫侵蝕臟腑蝕盡則死急者十數日便死緩者延引數月死後病氣流注染著傍人故謂之蠱注(千金)○中蠱者面色青黃是蛇毒面色赤黃是蜈蚣蠱面色青白若內脹滿吐出血成科斗形者是蜈蚣蠱面色多青或吐出如蛻蜋形者是蛻蜋蠱(病源)

辟蠱毒法

如入蠱鄉飲食即酒於初下筋時收藏一塊在手儘吃不妨火頃刻將所藏一塊潛埋於人行十字路下即蠱於其家作鬧蠱主必反來求救或食時讓主家先動筋或明問主家云莫有蠱麼以筋藥泉而後食如是則蠱不能為害(易簡)

驗蠱毒法

令病人朝起取井華水唾水中唾如柱脚直下沉者是蠱也浮者非蠱也(三因)○嚼生黑豆不服嚼白嚙味甘皆中蠱無異(三因)○入蠱鄉遇飲食以犀角燒之白沫沫起者是蠱也否則非也(綱目)○又煮一雞卵去皮日夕含口中勿令破夜吐出著霜露中朝看色大青者是蠱也(傷寒)○中蠱者大便黑如漆或堅或薄或微赤者是蠱也(千金)

蠱毒中

凡中蠱毒脈類如奴股(直指)○人為百約所中傷脈浮洪而疾

送蠱法

人中毒毒當服約如知蠱主姓名便呼取以去也(本草)○欲知蠱主姓名取敗鼓皮燒為末飲調服一錢病人須臾自呼蠱主姓名令取蠱本即愈(本草)○中蠱毒下血如豬肝臟府敗壞惟待死衰荷葉密安病人臥席下勿令知病者自呼蠱主姓名令取去即愈(本草)○有將士先得疾下血言中蠱家人密以蓂荷葉置臥席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小定(本草)

蠱毒治法

人中蠱毒則心腹切痛知有物咬面色青黃或吐血或下血不即治蝕五臟盡則死宜服太乙紫金丹王樞丹萬病解毒丸雄營丸雄鷹散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或飲下之而愈

門入

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蜈蚣蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟洗

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蜈蚣蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟洗

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蜈蚣蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟洗

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蜈蚣蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟洗

太乙紫金丹

一名紫金錠一名萬病解毒丹治蠱毒桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛馬肉毒山嵐瘴氣毒諸約金石草木鳥獸百蟲一切諸毒蜈蚣蛤去蠱土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大戟洗

焙一兩半續隨子去皮油一兩麝香三錢右為末糯米粥和勻搗千餘杵每一料分作四十錠每服半錠重者一錠並用薄荷湯化下○修合時宜端午七夕重陽日或遇天德月德日在淨室焚香齋戒勿令婦人孝服人雞犬見之○自縊落水鬼迷驚死心頭溫者並冷水磨灌即醒蛇犬諸惡虫傷以落化水磨塗傷處(入門)

玉樞丹

一名追毒丹治法服法同上○即上太乙紫金丹加入雄黃一兩朱砂五錢也製法同上○入蠱鄉纔覺意思不快即服一錠或吐或利而愈誠濟世衛生之寶也(入門)

萬病解毒丸

治蠱毒桃生毒藥毒草毒畜獸毒蚊蛤一兩半山茨菰一兩大戟七錢半山豆根續隨子去皮油各五錢朱砂雄黃各二錢麝香一錢全蝎五枚右為末糯米糊丸分作三十五丸每服

一丸薑汁蜜水磨下并水研付所傷處(得效)

雄礬丸

治蠱毒及蟲蛇毒即蠟礬丸(方見癰疽)加雄黃等分作丸梧子大每七丸熱水吞下(入門)

雄麝散

治五種蠱毒雄黃麝香等分為末取生羊肺如指大以刀開裹藥吞之(丹心)

辰砂丸

治蠱毒從酒食中著者辰砂雄黃赤足蜈蚣續隨子各一兩麝香二錢半右為末糯米飯和丸芡實大每一丸以酒化下端午日合○一名丹砂丸(三因)

保靈丹

治蠱毒諸毒一切藥毒神效朱砂一兩山豆根五錢雄黃黃月麝香黃藥子續隨子去皮別研巴豆去皮不去油貼貓去頭足翅各二錢半赤足蜈蚣二條一生一炙糯米半生半炒為末作糊右

於端午重陽臘日修合為末不令雞犬婦人見之用糯米稀糊和丸芡實大陰乾磁盒收貯每一丸茶清吞下不得嚼破須臾將毒物或吐或利藥丸凝血並下以水洗盡收之一丸可救三人若急則擇吉日精潔修合(得效)

獨勝散

治蠱毒及藥毒虫蛇諸毒大甘草節麻油浸年歲愈多愈妙右取甘草嚼下或以水煎服神效(得效)

國老飲

治蠱毒白礬甘草等分為末清水調下取吐黑涎或瀉下即安(得效)

金蠶蠱毒

南方畜金蠶其蠶金色食以蜀錦即其遺糞置飲食中以毒人人死蠶喜能致他財使人暴富而遺之極難水火兵刃所不能害必多以金銀置蠶其中投諸路隅人或收之蠶隨以往謂之嫁金

蠶(瓊鎖)

○人中金蠶蠱毒先嚼白礬味甘不澀次嚼黑生豆不醒者是也石榴根皮濃煎汁飲之吐出活虫即愈(得效)

挑生毒

嶺南有挑生毒乃挑毒於飲食中以害於人其候初覺胸腹作痛次則漸加攪刺滿十日則物生能動在上則胸痛在下則腹痛在上者胆礬末五分投熱茶內化服探吐之在下者鬱金末二錢米飲

更貴寶監維丙篇



調服瀉下惡物後以四君子湯去甘草煎服調理(得效)○有人忽肋下腫起頃刻間大如碗此中挑生毒也疾五更菜豆細嚼試之若香甜則是也升麻為細末取冷熱水調二大錢連服之洞泄出惡數莖根鬚皆具腫則消縮仍服平胃散調補(得效)

禁忌法

凡中蠱之人用藥已差自後飲食永不得吃冷若欲食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救(入門)

灸法

灸蠱毒法於足小指上灸三壯即有物出酒飯得之隨酒戰出肉菜得之隨肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出(千金)

吐蠱藥

凡中蠱煮甘草湯服之當吐出(本草)○又升麻一兩水煮取濃汁服入口即吐蠱出(本草)○又王瓜取根葉搗汁服當吐出(本草)○又治五種蠱毒馬兜鈴根為末一兩水煎服當吐出(本草)○又蜈蚣皮燒為末水和

未快再服(本草)○又樹木北陰白皮濃煎取汁服立吐即愈(本草)○又人頭垢米飲或酒化服即吐蠱(本草)○又苦瓠一枚水煮取汁服立吐即愈(本草)○又人頭垢米飲或酒化服即吐蠱(本草)○又苦瓠一枚水煮取汁服立吐即愈(本草)○又人頭

下蠱藥

凡中蠱毒商陸末和水服即下蠱(本草)○又續隨子去皮研為末和水服一錢即下利蠱出(本草)○牽牛子取頭末二錢和水服當瀉出毒蟲(本草)○玃猫一枚去頭足翅研為末和飲

服當下蠱

(本草)○玃猫一枚去頭足翅研為末和飲若未出更一服奇效只單服大戟亦好(本草)○又

丸蠱當隨利下而出(本草)

通治單方

凡十種

蠶退紙

中蠱毒不拘多少以麻油紙攤燒存性為末新汲水調一錢煩服雖面青脈絕昏迷口噤吐血者服之即甦(得效)

藍葉

凡中蠱毒取汁飲之(本草)

薺危

治同上搗取汁飲之末服煎服並佳(本草)

鯪魚皮

治同上燒為末和水服治中蠱吐血(本草)

蜈蚣

治同上炙為末和飲服亦佳(本草)

茜根

治同上濃煎服之又與藜荷同煎飲數升即愈(本草)

桔梗

治同上搗汁飲之危重者亦與(本草)

蚯蚓

十四枚中蠱吐血下血如爛肝醋一升漬之蚓死但飲其汁已死者皆可活(本草)

胡荽根

治蠱毒搗汁半升和酒服蠱立下又取胡荽子研水煮取汁冷服半升日二(本草)