

婦人科

太醫院吏目今茲雲林龔廷賢子才編

書林後學余一貫增補

脉脉經曰寸關調如故而尺脉絕不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也○寸口脉浮而弱浮則爲虛弱則無血○尺脉來而斷絕者月水不利○尺脉滑血氣實婦人經脉不利

肝脉沉主月水不利腰腹痛

少陰脉弱而微微則血少

脉來至狀如琴弦若小腹痛主月不利孔竅生瘡

胃脉滑少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒澁則血不來此爲居經

三月一來

少陰脉滑而數者陰中生瘡

少陰脉數則氣淋陰中生瘡

少陰脉弦者白腸必挺核

少陰脉浮而動浮則爲虛動則爲痛婦人則漏下

婦人生死脉訣

脉經曰婦人漏下赤白且下血數升脉急數者死遲者生

婦人漏下赤白不休脉小虛滑者生大緊實數者死

婦人新生乳子脉沉小滑者生實大弦急者死

婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱者死

婦人生產因中風寒熱病喘鳴而肩息脉實而浮緩者生小急者死

婦人生產之後寸口脉焱疾不調者死沉細附骨不絕者生

金瘡在陰處出血不絕陰脉不能至陽者死接陽而後出者生

懷孕六七月脉實大半強弦急者生若沉而細者死

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數者死又曰產前當洪數既生而洪數如

故豈得不死

此亦大槩言之亦有洪數而生者

調經

○調氣養血湯 專治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦人以血
為主殊不知血氣先不調然後血脉不順即生諸病

香附米炒一錢 烏藥一錢 砂仁一錢 當歸 川芎

熟地黃姜汁浸炒各一錢 白芍酒炒 甘草 右剉一劑生姜棗煎

服或丸或散皆可○氣痛加吳茱萸○痰盛加二陳湯全服

婦人經水或前或後或多或少或踰不來或一月兩來者俱是不調之故

○千金調經散 治婦人經水不調或曾經小產或帶下二十六病腹痛

口乾或發熱小腹痛急手足煩熱大腑不調時時泄血經水不懷久不

當歸 川芎 白芍酒炒各一錢 人參 呵膠炒

牡丹皮 肉桂各一錢 吳茱萸炒一錢 麥門冬去心 半夏姜製各一錢五分

甘草五分 右剉一劑生姜煎服

經水先期而來者血虛有熱也 治當補血清熱經自準也

當歸一錢 川芎五分 白芍酒炒八分 生地黃一錢 阿膠炒五分

皆用酒洗去其土氣

艾葉 三分
條芩 一錢
黃芩 八分
黃柏 五分
知母 五分

香附 一錢
甘草 三分
右剉一劑水煎空心溫服

經水過期不來作痛者血虛有寒也
治當溫經養血痛自止也

當歸 一錢
川芎 五分
白芍 一錢
熟地黃 一錢
桃仁 二十箇去

紅花 三分
香附 一錢
肉桂 五分
蓬朮 一錢
蘇木 一錢

木通 八分
甘草 五分
右剉一劑水煎空心溫服

經水將來作痛者血實氣滯也
行經中陣陣作痛乍作乍止氣血俱實治當

當歸
川芎
白芍
生地黃
黃連

香附
桃仁 去皮尖
玄胡索
牡丹皮
莪朮 各等分

紅花 減半
右剉一劑水煎空心溫服發熱加柴胡黃芩

經行着氣作心腹腰脅疼痛者乃瘀血也
治當順氣消瘀痛自止也

當歸
川芎
白芍
生地黃
桃仁 去皮尖

紅花
玄胡索
莪朮
青皮 各等分
右剉一劑水煎溫服

經水過期而來紫黑或塊者氣鬱血滯也
治當調經順氣經自准也

白芍 生地黄 桃仁去皮尖 甘草 右剉一劑水煎服

經水過期而來色淡者痰多也治當活血化痰經自調也

當歸 川芎 白芍 生地黄 陳皮

半夏姜炒 白茯苓去皮 甘草各等分 右剉一劑生姜三片水煎服

經水過期而來作痛者血虛有熱也治當生血清熱痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黄 牡丹皮 桃仁去皮尖 紅花

木香 玄胡索 香附 甘草 右剉水煎溫服

經水過多久不止者成血崩也治當涼血補血經自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 生地黄 白朮 荆芥

條芩 阿膠炒 白茯苓皮不 山梔 地榆 香附

甘草 右剉水煎空心服久不止者加茅根汁磨墨同服

經水行後作痛氣血虛也治當調養氣血痛自止也

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黄 人參

白朮 去芦

乾姜 炒

甘草

右剉一劑姜棗煎服

經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也

治當補血健脾補水水腫自消也

當歸

川芎

白芍 酒炒

木香

熟地黃

茯苓

白朮

砂仁

大腹皮

陳皮

厚朴 姜汁炒

蘼子

猪苓

木通

香附

玄胡索

牛膝 去芦

甘草

右剉一劑水煎溫服

經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾經也

治當活血健脾行氣腫自消也

當歸

川芎

白芍

桃仁 去皮

紅花

牡丹皮

乾姜

肉桂

厚朴

枳殼 炒

木香

香附

牛膝 去芦

玄胡索

右剉一劑水煎服

經水月久不行腹脇有塊作疼者是血作結癥瘕也

治當調經止痛塊漸消也

當歸

川芎

砂仁

木香

小茴

枳實 炒

厚朴 姜炒

桃仁

紅花 牡丹皮

香附

玄胡索

牛膝 去芦

右剉一劑水煎服

乃成虛怯也

當歸

川芎

白芍

生地黃

山梔

牡丹皮

阿膠

犀角

白茯苓去皮

麥門冬

去心

陳皮

黃芩

右剉一劑水煎服

經行身痛麻痺寒熱頭疼者乃觸經感冒也

○加減五積散

治婦人遇經行時沿身疼痛手足痺麻或生寒熱頭痛

目眩等症

本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜棗煎服方見中寒

經水不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦者此血氣俱虛也

○大補經湯

治婦人氣血虛弱血海寒冷經水不調或時心腹疼痛或

下白帶如魚腦髓或似米泔色錯亂不分信期每月淋瀝不止面色痿

黃四肢無力頭目眩暈肌體羸瘦

當歸

酒洗

白芍

香附

各六分

川芎

熟地黃

各五分

白朮

去芦

白茯苓

黃芪

陳皮

玄胡索

各四分

人參

砂仁

阿膠炒

沉香另

小茴

酒炒

吳茱萸炒

肉桂

粉甘炙各二分

右剉一劑姜棗煎服

○經驗調經湯

治婦人經水或前或後或多或少

當歸

熟地黃

香附各一錢二分

白芍酒炒

吳茱萸炒

大腹皮

紫荊皮

肉蓯蓉各一錢

川芎

條芩各七分

粉草五分

右剉一劑生姜三片棗一枚水煎待經至之日服

日一劑服至四劑而止即經對

○艾附暖宮丸

治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮虛寒

南香附米一斤

四兩醋浸四兩酒浸

各浸一宿焙乾

四兩童便浸

北艾葉

焙乾搗爛去灰醋浸炒四兩

當歸

川芎

白芍

酒炒

熟地黃

姜汁炒各二兩

玄胡索子

炒二兩

甘草

生用八錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心米湯下酒亦可

八物丸

養血調經如期除赤白帶久服立孕

當歸酒洗二兩

南芎

鹽湯浸切一兩

白芍

酒炒一兩半

熟地黃

酒浸二兩

白茯苓

去皮一兩

婦人晡熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用順氣清熱等劑不應更加寒熱且時欲作嘔余以爲鬱怒虧損脾胃濕火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味丸各數劑半載而痊

方見補益

一婦人經行遇怒其經卽止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰氣搗搗瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地黃山梔鉤藤而愈

方見傷寒

一婦人多怒經行旬餘方上後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用補中益氣湯加茯神遠志酸棗仁麥門五味牡丹皮龍眼肉治之卽痊

方見補益

一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語此熱入血室也用小柴胡湯

方見傷寒

加生地黃治之頓安但內熱頭暈用補中益氣

方見補益加

蔓荊子而愈後因怒惱寒熱譫語胸脇脹痛小便頻數月經先期此肝火血熱妄行用加味逍遙加生地黃而愈

方見婦人虛勞

經閉

婦人壯盛經閉者此血實氣滯宜專攻也

○通經丸

治經閉並乾血氣

斑猶

二十個糯米炒

大黃

五錢

桃仁

四十箇

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大空心酒下五七丸甚者十五丸如血枯經閉者四物湯送下

○通經甘露丸

治婦人經血不通崩漏腸風赤白帶下血氣五淋產後

積血男女五勞七傷及小兒骨蒸勞熱夫婦陰血陽精不交諸疾神効

大黃

四兩用頭紅花四兩入水取汁浸一日不用紅花四兩童便人

鹽二錢浸一日取出曬乾不用童便四兩用好酒浸一日令軟切片如杏核大曬乾入巴豆去皮三十五粒同炒黃色去巴豆不用四兩用當歸四兩八淡醋浸一日曬乾不用當歸

右四分共合一處人南木香二兩百草霜五錢共爲細末以當歸醋紅

花水煮米糊爲丸如梧桐子每服三四十九空心溫酒下

○取經丸

治婦人經閉不通不論新久

乳香

沒藥

孩兒茶

巴豆去殼

葱白各五

此方試過，需要完整PDF請訪問：www.e11ngbook.com

陰戶內三四寸許俟一炷香時經水即下

○一粒仙丹 治婦人乾血勞並赤白帶下種子如神

巴豆 一百二十個去殼用新磚一塊將豆紙包放磚上搥去油令淨如麪白方好用

斑猫 六十個去翅足為末

穿山甲 五錢油煎過為末 皂角 一兩刮粗皮為末

苦葶藶 末二兩 大黃 末一兩

右合一處以棗煮去皮核丸藥如彈子大用綿繭張關裹藥在內穿入

三寸竹筒上頭後仍留繫二三寸餘挽一轉不令藥氣出外用時先以

溫水洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕藥頭送入子宮極深處整一

日一夜取出藥不用此藥用後少間耳冷氣不行發寒發熱如傷寒之

狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下

忌生冷發物自此子宮和暖而交媾則有孕矣

婦人虛弱經閉者此血脈枯竭宜補經自通也

○通經調氣湯 治婦人經閉虛弱者

當歸 酒洗

川芎

白芍 酒炒

生地黄 酒浸 香附 童便炒

各一兩

牡丹皮

錢入

柴胡

錢六

黃柏

酒炒

知母

酒童

黃芩

酒炒

牛膝

去芦酒

洗入錢

桃仁

量八

紅花

二味

右劉

作十劑水煎空心一服臨臥一服

○牡丹皮湯

治室女經閉咳嗽發熱

柴胡

黃芩

各一錢

牡丹皮

半一錢

當歸

半一錢

川芎

八分

白芍

各一錢

甘草

四分

右劉一劑水煎服

陳皮

白木

香附

各一錢

白芍

生地黄

益母草

香附

酒醋米甘童

便同浸炒

○養真湯

一婦人經閉不通臍下一塊已經三載顏色如故百藥無功服此數劑經行又投數服而塊消矣

當歸

酒洗

川芎

白芍

益母草

香附

酒醋米甘童

便同浸炒

熟地黃

姜汁炒

山茱萸

去核

白茯苓

去皮

梔子

小茴

酒炒

益母草

香附

酒醋米甘童

便同浸炒

陳皮

各等分

右劉六劑水煎服盡

經通後此作丸服

六味地黃

治婦女經閉發熱或咳嗽等症

婦人半虛半實經閉者宜攻補兼施也

○通經湯

治婦女經閉者

當歸

川芎

白芍

生地黄

大黃

官桂

厚朴

枳殼

枳實

黃芩

生地黄

大黃

當歸

川芎

白芍

生地黄

大黃

當歸

川芎

○調經養血丸 治婦女經脉不行或不調或前或後赤白帶下久不成

孕服此有孕住服

香附 十二兩 酒洗 醋湯童便各浸三日取出炒 當歸 酒洗

白芍 酒炒 各二兩 川芎 一兩

生地黄 酒洗 二兩 茯苓 去皮 白芷 一兩

牡丹皮 酒洗 二兩 乾姜 炒 一兩

肉桂 一兩 紅花 一兩 桃仁 泡去皮 一兩

玄胡索 六錢 沒藥 一兩

半夏 香油炒 一兩 阿膠 蛤粉一或 二兩 小茴 炒 三錢

莪朮 煨醋炒 五錢 甘草 炙 五錢

右爲末醋糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

婦女經閉有積塊者宜養血破積也

○四物調經湯 治婦女或十五六歲經脉不行日夜生寒熱手足麻痺

飲食少進頭痛惡心嘔吐腹中忽然結一塊冲動痛者宜此候食生冷

感而致也 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 柴胡 枳殼 去穢麩炒 各八分

黃芩 熟地黄 酒浸 陳皮 莪朮 醋炒 三稜 醋炒

白朮 去芦 白芷 小茴 鹽水炒 玄胡索 各五錢 香附 童便炒 一錢二分

青皮麩炒

砂仁

紅花

甘草各四

右剉一劑生姜三片葱白三根水煎溫服○若有塊不通須與調經丸

間服○遍身疼痛加羌活獨活○咳嗽加杏仁五味子各五分○肚痛

加炒乾漆七分○瘧疾加草果常出○泄瀉去枳殼加肉蓯

○調經丸

當歸酒洗二兩

川芎

熟地姜汁炒

青皮麩炒

陳皮

白朮去片

厚朴姜汁炒

小茴香炒

艾葉去筋各一兩

香附醋炒五兩

三稜煨醋炒

義朮煨醋炒

砂仁

白芷

牛膝去片酒洗

玄胡索各一兩

粉草

琥珀各五錢另研八

枳殼去穢炒

右爲末醋打糊爲丸如梧桐子大每服八九十丸米湯下酒亦可若肚

痛加蒼朮白朮

婦人經通之後宜調理之劑也○加減四物湯加香附陳皮之類方見補益

○滋陰百補丸 治女人勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛

不思飲食疴羸乏力 香附一斤炒去毛分四製酒醋鹽焙乾益母草八兩搗末

當歸六兩酒洗

熟地酒洗

白朮去片各一兩

人參去片

茯苓去片

立命素... 白芍... 古草...
桐子大每服六十九空宿砂湯下或酒醋白滾水任下

一婦人胃氣素弱爲哭母吐血咳嗽盜汗發熱經水三月不行余以爲悲

則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣湯方見補益加桔梗貝母知母夕

用歸脾湯方見健忘送六味丸而愈方見補益

一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝

口乾唇裂內熱腹脹盖由久瘧正氣已虛陰火獨旺用補中益氣湯治

之尋愈惟不時頭痛乃加蔓荊子而痛止又兼味六地黃丸而經行方見補益

魏憲副寵夫人患逆經吐血不止予診六脉微瀦有力此血虛火盛也以

四物去熟地用生地共一兩加酒蒸大黃一兩同煎入童便服之服後

血止經通矣

徐憲副寵夫人患經閉人皆擬有孕乃七八箇月漸覺黃瘦腹中左右有

塊如鼓發熱面赤不思飲食余診六脉微瀦此血枯氣鬱也以四物湯

加香附牡丹皮白朮之類十數服又加桃仁紅花又數服方與四炒枳

穀九不三四服打下血塊若許始愈

血崩

脉帶下崩中脉多浮動虛遲者生實數者重

崩漏者有新久虛實之不同也

初起屬濕熱者宜解毒也

黃連 黃芩 黃栢 生地黃 蒲黃 右剉一劑水煎空心服

○治婦人血崩年四十以上悲哀太甚則心悶急肺葉舉焦而上焦不通

血熱而流 行先以黃連解毒湯後以涼膈散合四物湯調治効

稍久屬虛熱者宜養血而清火也

○溫清散 治婦人經脉不佳或如豆汁五色相雜面色痿黃臍腹刺痛

寒熱往來崩漏不止 當歸 白芍 熟地黃 川芎 黃連

黃芩 黃栢 梔子各一錢半 右剉一劑水煎空心服

日久屬虛寒者宜溫補也○益母湯 治婦人血崩

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黃姜汁條芩