

醫書匯編成卷五

泉江蔡宗玉名莊手輯

男綸 受采 校刊

陽明脈症

胃家實

陽明之為病胃家實也。陽明為傳化之府。當更實更虛。食入胃而腸

病根矣。故以胃家實為陽明一經之總綱也。然致實之由。最宜詳察。有實于未病之先者。有實于得病之後者。有風寒外來。熱不得越而實者。有妄行吐下。而亡津液而實者。有從本經熱盛而實者。有從他經轉屬而實者。此只舉其病根在胃而得以下利者。胃家不實矣。如胃中虛實。不是竟指燥屎堅硬。只對下利言。下利是胃家不實矣。如胃中虛而不利者。便屬陽明。即初起後落者。總不失為胃家實也。

陽明外症身熱汗自出不惡寒反惡熱也。

胃實之外見者。蒸蒸然裡熱。而達于外。與太陽表邪發

熱者不同。其汗則濺然從內溢而無止息。與太陽風邪為汗者不同。表邪已散。故不惡寒。裡熱秘結。故反惡熱。非即下症宜輕劑和之。



反人裡

胃實正脈

必譏語潮熱煩躁脹滿諸症兼見。然為可下。四症是陽明外症之提綱。故胃中虛冷亦得稱陽明病者。因其外症如此也。

陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

太陽病發熱者必盜汗出

無汗惡寒發熱不休此則潮熱有時是惡寒將自罷將發潮熱之時脈也此緊人入裡之謂不可拘緊則為寒之謂太陽脈但浮者汗今盜汗出是困于內熱且與本經初病但長發汗而喘者不可拘浮為在表之誤矣若執脈症麻桂下咽陽盛則變耳

傷寒三日陽明脈大

脈大者兩陽合明內外皆陽之象也陽明受病之初病為在表脈但浮而未大與太陽同故亦有麻

黃桂枝症至二日惡寒自止而反發熱三日來熱勢大盛故脈亦應其象而洪大者此為胃家實之正脈若小而不大便屬少陽矣

脈浮而大心下反鞣有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數淺

數則大便鞣汗多則愈熱汗少則便難脈遲尚未可攻

此治陽明之大法也陽明

胃家實

主津液所生病津液乾則胃家實矣津液致乾之道有二汗多則傷上焦之液溺多則傷下焦之液一有所傷則大便鞣而難出故察汗

大為病進

其熱非

受其實

汗出是有

屬藏之

微

熱初熾

妄攻

在陽死陰

與懷夫脈之浮緊浮緩浮數浮遲者皆不可攻而可汗此浮則大又
可攻者以此為三日之脈當知大為病進不可拘泥為在表也心
者胃口也心下鞭已見胃實之一班有熱屬藏指心肺之熱是
指胃實攻之是攻其熱非攻其實即與黃芩湯微其熱之義
勝肺亦不指胃勝肺熱故懷數見當微汗為心液汗出是
藏之微也汗出多津液亡則愈熱而大便難汗出少亦未
故利急于攻熱假令脈遲便非藏實是浮大黃為虛脈矣此
心下鞭一症有無熱屬藏者為妄攻其熱者藥也其慎密如此

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病

下鞭滿有可攻之理矣然熱邪散漫胃中未乾妄攻其熱熱去寒起
移寒于脾實反成虛後利遂不止也若利能自止是胃不虛而脾家
實腐穢去盡而邪氣散愈此條熱既屬藏利子急攻所以存津液
也此條熱邪初熾其妄攻所以保中氣也此仲景大有分寸處

傷寒嘔多雖有陽明症不可攻之

嘔多是水氣在上焦雖有胃實症只宜小柴胡以通散攻之恐有利遂不

止之禍蓋腹滿嘔吐是太陰陽明相關症胃家實雖變症百出不失
為生陽下利不止參附不能挽回便是死陰矣

津液當還
大便自出

陽明病本自汗出。醫更重發汗。病已瘥。尚微煩。不了了者。此必大便難。

故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大便難。當問其小便。日幾行。若大便

三四行。今日再行。故知大便不久出。今為小便數少。以津液當還。

胃中故知不久當大便也。汗與津液皆本于津液。汗出小便利。其人胃中

謂微知惡熱。將罷數少。即再行之。謂大便難。小便少。皆因胃亡津液。

所致。不是陽盛于裡也。因胃中乾燥。則飲入于胃。不能上輸于肺。通

調水道。下輸膀胱。故小便反少。而游溢之氣。尚能輸精于脾。津液相

成。遂歸于胃。胃氣因和。則大便自出矣。以此見津液素盛者。雖亡而

終自還。正以見胃實者。勿妄下。妄汗也。歷舉治法。脈遲不可攻。心滿

不可攻。嘔多不可攻。小便利與數少。不可攻。見胃實。不是可攻症。

陽明病自汗出。若發汗。小便自利。此為津液內竭。大便雖難。不可攻之。

當須自欲大便。宜蜜煎導之。若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導。

發後竭可
導不可攻

內實非內
熱只須外
潤其燥

導法各宜

一日不發

自汗出更發汗則上焦之液已外竭小便自利則下焦之液又內竭
胃中津液兩竭大便之鞭可知雖鞭而小便自利是內實而非內熱
矣陽明之實不患在燥而患在熱此內既無熱只須外潤其燥耳
欲大便時因其勢而利導之不欲便者宜靜候之禁攻者慮其虛耳
蜜煎導法 將蜜滑能潤腸 梔角通 用銅鈹微火熬頻攪勿令焦煨
熱能行氣

凝如餠捻作挺子令頭銳按臍角末少 大如指長二寸許乘熱納穀

道中便出自去 **猪膽導法** 猪膽寒勝熱滑潤 人醋酸善入 用竹

管灌殺道中填出宿食惡物其效神 液枯者宜蜜煎導熱邪甚者宜

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰難得之一日惡寒將

自罷即自汗出而惡熱也陽明受病當在二三日發初受風寒之日為

二日來表邪自罷故寒止熱熾陽明病多從他經轉屬此本經自受
寒邪胃陽中發寒邪即退反從熱化故耳結因亡津液而轉屬必在

經曰邪氣
中面中膺
皆下陽明

胃實無所
復傳

胃主津
所生病

以下津

六七日不在一二日間。本經受病之初。其惡寒雖與太陽同。而無煩
煩。強痛為可辨。即發熱汗出。亦同桂枝症。但不惡寒。反惡熱之病。
是陽明。一經之樞紐。本經受邪。有中面中膺之別。中面則有
鼻乾。邪氣居高。寒未能遽止。此中于膺部位近胃。故惡寒最甚。

問曰惡寒何故自罷。答曰陽明居中土也。萬物所歸。無所復傳。故惡寒

寒二日自止。此為陽明病也。

太陽病八九日尚有惡寒症。若少陽惡寒。往來三陰惡寒。轉其非發汗溫中。何能自

罷。惟陽明未經表散。即能自止。胃為戊土。位處中州。表裡寒熱之邪。無所不歸。無所不化。皆從燥化而為實。實則無所復傳。此胃家實。所以為陽明之病根也。方云胃為水穀之海。五藏六府。四體百骸皆資養于胃。最宜通暢。實則秘固。以上論胃實症。

問曰太陽緣何而得陽明病。答曰太陽病若發汗若下若利小便亡津

液胃中乾燥因轉屬陽明胃實大便難。此名陽明也。

治法不合。徒傷津液。故轉屬陽明。

陽脈微而汗出少者為自和也。汗出多者為太過。陽脈實因發其汗出

陽明者告也

汗出多

汗不止

發熱無汗

嘔不能食

汗出濺然

發熱汗出

不惡寒而

渴

大陰轉屬

陽明

多者亦為太過。太過為陽實。亡津液。大便因鞭也。桂枝症本自汗。自汗多則亡津。

麻黃症本無汗。發汗多亦亡津。此雖指太陽轉屬。然陽明表症亦有之。汗亡津液。致胃實。方云脈微。以中風之緩言。脈實以傷寒之緊言。

傷寒轉屬陽明者。其人濺然汗出也。此汗出不止之互辭。概言傷寒是專指太陽。

本太陽病。初得時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。微止也。多之互辭。

傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濺然者。是轉屬陽明也。初因寒邪外束。

故無汗。繼而胃陽遽發。故反汗出。即嘔不能食時。可知其人胃家素實。與乾嘔不同。而反汗出。則非太陽之中風。而為陽明之病實矣。

太陽病發熱汗出不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。宜五苓散。全條詳見五苓散。

傷寒脈浮緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。

不能發黃。至七八日。大便秘者。為陽明病也。太陰受病轉屬陽明者。以陽明為燥土。故非經絡表。

脾實胃實

陽結陰結

陽道實陰
道虛陰陽
更實更虛

相相開所致。總因亡津液而致也。此病機在小便。小便不利是津液不行。故濕土自病。病在肌肉。小便自利是津液越出。故燥土受病。病在胃也。○病在太陰。同是小便自利。至七八日。暴煩下利者。此為陽明大便秘者。轉為陽明病。始同終異何也。曰陰陽異位。陽道實則大便硬。故脾家實。則腐穢自去。而從太陰之瀉。胃家實。則地道不通。而從陽明之瀉。此其別也。○右論他經轉屬陽明症。

問曰脈有陽結陰結。何以別之。答曰其脈浮而數。能食不大便者。此為

實名曰陽結也。期十七日當劇。其脈沉而遲。不能食。身體重。大便反鞭。

名曰陰結也。期十四日當劇。能食者為陽。為內熱。不能食者為陰。為中

自下利者為陰。此陽道實陰道虛之定局也。然陽症亦有自下利者。故陰症亦有大便鞭者。實中有虛。虛中有實。又陰陽更虛更衰之義。胃實因于陽邪者。為陽結。因于陰邪者。名陰結。陽結則陰病。故不大便。陰結則陽病。故不能食。能食不大便者。是但納不輸。為太滿。十七日劇者。陽主進。又合陽數之奇也。不能食而便鞭。仍去者是但輸不納。為不足。十四日劇者。陰主退。亦合陰數之偶也。脈法曰。計其餘命。

陰結無表
症急宜溫

脈症同異

白熱赤而
戰惕必身

舞

生死之期期以月節尅之經曰能食者過期不食者不及期也
陽結卽是胃實陰結無表症當屬之少陰不可以身重不能食
明應有之症沉遲爲陽明當見之脈大便秘爲胃家實而不
補之劑也急須用參附以回陽勿淹留期至而不救。右陰陽

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

此陽明之表症表脈也二症全同太陽麻黃湯

陽明者不頭項強痛故也要知二方專爲表邪而設見麻黃症卽用
麻黃湯見桂枝症卽用桂枝湯若惡寒一罷則二方所必禁矣此條
脈症與太陽相同前陽明病脈浮而緊必潮熱一條與太陽相殊爲
陽明之表裡症麻桂下咽則斃故善診者必據症辨脈勿據脈談症
脈浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而解遲爲無陽不能作汗
其身必痒也此陽明之虛症虛脈也邪中于面陽明之陽上奉之故面
熱而色赤陽併于上而不足于外衛寒邪切膚故戰惕必
六七日胃陽來復始得汗出溼溼而解蓋汗爲陽氣遲爲陰脈無陽
不能作汗更可以身痒驗之又當助陽發汗者也

身如虫行

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮膚中此久虛故也陽明氣血俱

人久虛故反無汗此又當益營液和營衛使陰陽自和而汗出也

無汗嘔欬

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭重身大欬

頭痛

不嘔手足不厥者頭不痛小便利則裡無邪可知二三日無汗熱汗

更手足厥冷又似病在三陰矣若頭痛又似太陽之表症然頭痛必

因嘔欬厥逆則頭痛不屬太陽不嘔欬厥冷則不苦頭痛是厥逆者

屬三陰斷乎為陽明半表半裡之虛症也此胃陽不敷布于四肢故

厥不上升于額顙故痛緣邪中于膈結在胸中致嘔欬兩傷陽也當

用辰蒂散吐之嘔欬止厥痛自除矣兩者皆作時字看

陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛不

寒頭痛但眩是陽明之表已罷能食不嘔厥但欬是欬為病本咽痛

因于欬頭眩亦因于欬此邪結胸中而胃未實當從小柴胡加減法

陽明病口燥但欲漱水不欲嘔者此必衄脈浮發熱口乾鼻燥能食者

不欲

口乾
能食

太陽陽明
皆有血症

喘滿脈沉
發汗謬語

諸語脈短
者死

則交此邪中于面而病在經絡。陽明主津液所生病亦主血所生病

陽明經起于鼻繫于口齒陽明病則津液不足故口鼻乾燥

鼻未入乎肉也能食者胃氣強也知病不在氣分而在血分

陽明皆多血之經故皆有血症太陽脈當上行營氣逆不循其

循顛而下至目內眦假道于陽明自鼻額而出鼻孔故先見

陽明脈當下行營氣逆而不下反循齒環唇而上循鼻外鼻

鼻故先口燥身乾治宜桃仁承氣犀角地黃輩。右陽明在表

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裡而反發其汗津液越出大便

表虛裡實久則謬語喘而胸滿為麻黃症然必脈浮者可發汗今脈沉

滿而實矣因轉加陽明此謬語所由來也宜少與調胃承氣湯

發汗多若重發汗者亡其陽諸語脈短者死脈自和者不死

上條論諸語之脈亡陽即津液越出之互辭心之液為陽之汗脈者血

之府汗多則津液脫營血虛故脈短是營衛不行藏府不通矣脈自

和者津液不致脫脈有胃氣故不死此下歷言謬語不因于胃者

諸語死症

譴語有視喘滿者死下利者亦死

上條言死脈此條言死症蓋譴語本胃實而不足死症若一見虛脈虛症

則是死症而非胃實矣藏府之精氣皆止注于目目不轉睛不識藏府之氣絕矣喘滿見于未汗之前為表實見于譴語之時是肺氣已敗呼吸不利故喘而不休脾家大虛不能為胃行其津液故下利而不通下利是倉廩不藏門戶不要與大便難而諸語者天淵矣

論聲者一

夫實則譴語虛則鄭聲鄭聲重語也

邪氣盛則實言雖多譴語正氣衰則虛

諸語虛實

之分

虛必目見鬼神有求生求死之狀名曰鄭聲釋以重語見鄭重之非鄭重之音此即從諸語中分出以明譴語有不因胃實而發者

陽入血室

陽明病下血譴語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉

男子陽明

之澀然汗出則愈

血室者肝也肝為藏血之臟故稱血室女以血用事故下血之病最多若男子非損傷則無下血之病惟

熱盛血溢

陽明多血多氣行身之前邪于衝任陽明熱盛侵及血室溢出血之病惟故有是症血病則魂無所歸心神無主譴語必發此非胃實因熱入

血室

血室而肝實也熱傷心氣不能作汗但頭有汗必刺肝之募引血上

歸經絡使熱有所洩則自然汗出周身血不妄行譴語自止矣

血室

婦人血室中風發熱無經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸下痞

如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

來時中于風邪此時未應及月事病從外來先解其外可知
日脈遲熱除身涼為愈乃反胸滿譫語而非胃實脈遲故也
藏必其經水適來時風寒外束內熱乘肝月事未盡之餘其血必結
當刺其募以瀉其結熱滿自消而譫語自止此通因塞用法也

水未斷

婦人傷寒發熱經水適來盡則明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血

目愈

室無犯胃氣及上下焦必自愈
前言中風此言傷寒見婦人傷寒中風皆有熱入血室症也發熱不惡寒是陽

明病用酒諸語疑為胃實若是經水適來固知熱入血室矣此經水
未斷與上血結不同是肝虛魂不安而妄見不得妄下以傷胃氣亦
不得刺之傷上焦之陽下焦之陰候經盡自愈當以不治治之
入血室寒熱如瘧而不譫語者入柴胡症。右論陽明譫語脈症。

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊者下之則腹滿少

陽明在裏之表症

陽明兼太陽少陽中風脈症

便難也

無目塞鼻乾之經病。又無尺寸俱長之表脈。微喘而身熱。又似太陽少陽合病。更兼腹滿。

又似太陽太陰兩感。何以名爲陽明中風。以無頭項強痛。則不屬太陽。不耳痛目赤。則不屬少陽。不腹痛自利。則不關太陰。是知爲陽明。爲胃門。腹爲胃室。喘爲胃病矣。雖惡寒二日。必止。脈之浮者。亦有時之候也。此爲陽明在裏之表症。若以腹滿爲胃實。則大便復竭。腹更滿。而小便難。必大便反易矣。傷寒中風。但見有一便難。是則口苦咽乾。當從少陽症治。脈浮而紫者。當曰弦矣。

陽明中風脈弦浮大。而短氣。腹部滿。脇下及心痛。久按之氣不通。身乾

不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時噦。耳前後腫。刺之

小差。外不解。病過十日。脈弦浮者。與小柴胡湯。脈但浮。無餘症者。與麻

黃湯。若不尿。腹滿加噦者。不治。

喻云。此症爲陽明第一重症。太陽之症。未罷而少陽症兼見。是陽明所主之位。

前後皆邪。而本經更瀰漫流連也。腹滿。鼻乾。嗜臥。一身面目悉黃。潮熱。陽明之症。既盡見。兼以少陽之脇痛。耳前後腫。太陽之膀胱不利。

本條不言

寒熱中風

二字便藏

表熱在內

外不解即

指表熱言

用食不能

食

用寒飲作

陽明

乃至時時噦則陽明之諸症正未易除也柯云弦為少陽脈耳前
 脇下為少陽部陽明中風而脈弦兼少陽者以膽為風府故也若不
 兼太少脈症只是陽明病而不名中風矣刺之是刺足陽明隨其
 而洩之非刺耳前後其腫少瘡也小瘡言內俱能滅但外症未解其
 脈弦浮者向之浮大減小而弦尚存是陽明之脈症已罷惟少陽之
 表邪尚存故與小柴胡以解外若但浮而不弦大則非陽明少陽脈
 無餘症是無陽明少陽症惟太陽表邪未散故與麻黃湯以解外若
 陽明居中其風非是太陽陽轉而即是小陽轉而西陽相重灼故病重
 十日而表熱不退也無餘症可憑只表熱不解法當憑脈故弦浮者
 可知少陽遺風但浮者太陽遺風也若不尿腹滿加噦是接耳前後
 腫來此是內不解故小便難者竟至不尿腹滿者竟不滅時時噦者
 更加噦矣非刺後所致亦非柴胡麻黃後變症也。右陽明中風症
 陽明病若能食名中風不能食名中寒陽明主裡症雖在表病情仍以
 風寒更以能食不能食審胃家虛實也要知風寒本一體隨人胃氣
 而別此本為陽明初受表邪先辨胃家虛實為診家提綱也
 陽明病若中寒不能食小便不利手足澀然汗出此欲作固瘕必大便

初鞭後澹所以然者以胃中冷水穀不別故也

胃虛則中寒故不能食但手足汗出則津液

洩于外者尚少小便不利則津液不洩于下陽明所虛在亡津液更慮其不能化液矣固瘕即初鞭後澹之謂凡固雖固結而腸中全乾也澹即水穀不別之象按大小腸俱屬于胃欲知胃之虛實于二便驗之小便利屎定硬小便不利必大便先鞭後澹周于胃中陽氣向衰不能腐熟水穀爾時急以理中溫胃仲景懼人于陽明寒也但知有下法全不知有不可下反用溫之法故特揭此

陽為則病

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故

胃中虛冷

攻其熱必噦

初受病便不能食知其人本來胃虛與中有燥屎而反不能食者有別用寒藥必噦噦為胃病胃病深者其聲噦矣

仲景治陽

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

喻云此症比前一條虛寒更甚不但攻其熱必噦即飲以水而亦噦矣柯

明全在胃

云陽明病不能食者便是胃中虛冷雖身熱惡熱而不可攻其熱用寒以微表熱便是攻非指用承氣也仲景治陽明全在胃家虛實

穀作穀道

陽明病脈遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀澹

之腹滿如故。所以然者，脈遲故也。

陽明脈遲為中寒，為無陽。食則飽，因于腹滿。腹滿因于小

便，故又因于食飽。耳食入于胃，濁氣歸心，故煩。虛陽不能化，

中清者不上升，故食穀則頭眩。濁中清者不下輪，故腹滿而

胃脘之陽不達于寸口，故脈遲也。金匱曰：穀氣不消，胃中苦

下流，小便不通，身體盡黃，名曰穀疸。當用五苓散調胃利水。

茵陳湯下之，腹滿不減，而胸中發噎，所由來矣。所以然者，蓋

藏食難用飽者，脾不磨也。下之則脾愈虛，不化不出，故腹滿如故。

傷寒脈遲六七日，而反與黃芩湯徹其熱，脈遲為寒，今與黃芩湯復除

其熱，腹中應冷，當不能食，今反能食，此名除中，必死。

凡言指陽明病者，必身熱汗出不

寒，反惡熱也。此言傷寒則惡寒可知。言徹其熱，則發熱可知。脈遲為

無陽，不能作汗，必服桂枝湯發散，令汗生，干穀耳。今不知脈遲為

寒，但知清表之餘熱，去寒起，則不能食者，為中寒。反能食者，為除

中矣。除中者，胃陽不衰，假穀氣以自救。凡人將死而反強食者，是也。

陽明病初欲食，小便反不利，大便自調，其人骨節疼，翕然如有熱，此在

