

聖濟總錄

吳錫璠署

己86  
40

大德重校聖濟總錄卷第一百四十一

痔瘻門

痔瘻統論

論曰內經謂因而飽食筋脈橫解腸澼為痔夫痔病之候亦多矣此獨舉飽食一端者蓋飲食人之大慾存焉推此則它可觸類而知也巢元方能拾其說而備論之故曰諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽故勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部所致也曰牡痔者肛邊生鼠乳出在外時出膿血是也曰牝痔者肛邊腫生瘡而出血者是也曰脈痔者肛邊生瘡痒而復痛出血是也曰腸痔者肛邊腫核痛發寒熱而出血是也曰血痔者因便而清血隨出是也孫思邈有所謂氣痔者寒溫勞濕即發亦憂恚勞傷所致也集驗方有所謂酒痔者乃牝痔別名也治法禁忌唯孫思邈之論為詳

諸痔

論曰痔有五名一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔證雖小異大率皆飲食飽甚情慾過度之所致也飲食飽則腸胃傷情慾過則氣血耗毒氣乘虛流入下部所以澼積而為痔也

治五痔腫痛下血不止或榮衛滯澁身體疼痛大便風秘不通能消丸方

威靈仙去苗土  
兩

木香

防風去叉各  
兩

右三味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五十丸荆芥湯下不計時候

治五種痔疾槐實丸方

槐實壹  
兩

黃耆剉

枳實去瓢  
炒黃

楚貫眾

白朮

肉豆蔻人

防風去叉  
根

荆芥穗

橘芩去皮  
炒紫

苦參各  
一

厚朴蓋  
去麤皮生  
汁炙剉

麝香研

木香

芎藷

皂莢子黃  
半  
兩

炒各

右十五味搗羅為末麪糊丸梧桐子大食前米飲下三十丸晚再服

治五種腸風瀉血痔瘻抵聖枳殼丸方

枳殼去瓢  
炒

威靈仙去苗  
土

陳橘皮去白  
續斷各  
一

生乾地黃  
培

連翹

槐實炒

附子炮裂去  
皮

當歸切  
培

乾薑炒

白礬煅  
過

人參

羌活去頭  
皮

地骨皮各  
一

何首烏用米  
泔浸一

宿竹刀刮去  
一

右十五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九空心溫陳米飲下

武皮切  
兩

疼痛者當日見効

治五痔及腸風下血立聖丸方

枳殼去瓢麩炒  
兩半

五倍子去土

灰黃耆蜜炙

槐花

槐莢各

兩半

豬垂蹄甲

武拾壹枚以上

並炒焦揀令淨

並

何首烏

乾於石臼內

搗末秤和入諸藥

子焰

各參

皂子各參

殼橘一枚

百

刺蝟皮

壹枚

皂莢鍼肆

枝藤子

叁枝以上

肆味各用藏

瓶壹枚咸用

鹽

固濟各留壹穴

出煙以炭大燒守候

逐件煙盡退大

各研細

并

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服五十九至百丸溫酒下空心服

治諸痔如聖丸方

白蝟皮燒枝

鷄冠花炒

皂莢鍼火各

枝

桔梗壹枚

胡桃燒枝

白礬各

兩半

槐花炒

兩

不艸皂莢

火

枝挺

黃耆炒

剉

枳殼去瓢麩炒

各兩

白礬

綠礬各

壹枝兩半

各味飛遇

右一十一味搗羅為散每服二錢匕酒調下或作丸服

治五種痔疾如聖丸方

枳殼

去瓢  
炒

威靈仙去土

陳橘皮去白各

續斷炒

白礬

飛炒

當歸去蘆頭

乾薑裂炒

附子炮裂去皮

生乾地黃

連翹

過炒

槐英子各半兩

炒香為度取莢內子

右一十一味擣羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十九陳粟米飲下空心食前日二服如年深者加丸數疼痛甚者當日見効此藥能癒積年患二十年以上只可十服新患三兩服便止更不再發

治腸風痔疾黑神散方

羌活

去蘆頭

黃耆剉

黃荆實

蔓荆實

狗脊大燥去毛

枳殼

去瓢炒

檳榔剉

枯樓

以威靈仙去子留殼

右八味除枯樓外等分擣羅為末入枯樓中盛於沙合或瓦罐子內蓋泥固濟火煅通赤候冷取出藥末更別用藥如後

荆芥子

白蕪荑

或味與

木香

比前減半

右一十一味擣羅為散每服一錢七空心茶酒調下日三

治痔瘡後九方

連翹

附子

炮裂去皮  
桂去皮  
去桂皮

槐英

白蕪荑

杜仲

去麤皮  
剉炒

枳殼

去瓢  
炒

黃耆

剉

當歸

焙

藁本

土

右一十味等分搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服十丸米飲下空心食前日三此方曾有人於誥勑後偶見屢効故以為名

治五痔 蟠皮丸方

蟠皮

壹枚  
炒令黃色剉

續斷

槐莢子

黃耆

剉

當歸

切

乾薑

炮

連翹

附子

炮裂去皮臍

白礬

枯過各兩

生乾地黃

伍兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服二十丸空心黍米酒下再服加至三十丸若重者尤宜服此藥

治腸風五痔如神丸方

烏蛇

酒浸去皮骨炙

大黃

濕紙裹煖

防風

去叉兩

各黃耆

剉

枳殼

去瓢炒

刺蟠皮

焦黑

陳橘皮

浸去白焰

土蒺藜

炒去角

秦艽

去苗土壹兩半

右九味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下三十丸夜卧更服當日血止痛定

治五痔三香丸方

乳香半兩

安息香

蜜陀僧

研各壹分

巴豆

七粒

皮油去

丹砂

研

麝香

研

砒霜半錢

研各錢

謂皮

壹枚炙搗

為細末

右八味各研細一處和勻用水化炊餅丸菉豆大每服一丸空心冷茶清下治一切痔疾面色萎黃蜜陀僧丸方

蜜陀僧

燒令赤

白礬灰各兩

壹枚

槐子人

微炒

雞冠花

鑄墨各半

皂莢灰

分壹

右六味擣羅為末以麪糊丸梧桐子大每服二十丸煎柏葉湯下食前空心服

治痔疾蠅皮散方

蠅皮

壹枚

黃牛角

鰓對鯀

鯉甲

人咸

豬牙皂莢

野豬肉

各半

舊若葉

肆兩

右六味用新瓶一隻盛新瓦子蓋口紙泥封乾後煅通赤放冷取出研為細散入麝香少許每服二錢匕用胡桃人一枚分作二服研細溫酒調下久患不過五七服差夜卧更深服

治痔疾神驗散方

當歸切兩

白礬貳兩

桑蛾貳兩黃色者

木耳貳兩

右四味搗羅為散每服一錢匕粟米粥調下空心食前服

治五種痔疾腸風瀉血外痔及脫肛下部四邊有努肉如乳並皆治之異

功散方

黃牛角鰓壹枚碎

蛇蛻皮壹條白者豬牙皂莢伍分

鯫鯉甲半兩

右四味入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令烟出後用大火煅令通赤為度取出攤冷搗羅散先用胡桃肉一枚分作四分取一分臨卧時細研如糊溫酒調下便睡先引出蟲至五更時用溫酒服藥散二錢匕至辰時更一服雖患年久不過三服差

治療木瓜丸方

木瓜壹兩切作片日乾為末

檳榔貳枚為末

白礬壹兩為末

甜消分

右四味用生麵旋起酵作一蒸餅料拍勻裹藥置火上炙其餅香熟乃去餅搗藥二百杵如藥乾即以麵糊潤之為丸梧桐子大每服二十九空心木瓜

湯下其藥仍不可復犯火

治痔疾勝金丸方

雌黃半兩 白礬壹兩 麝香壹錢

研

錢研

右三味再研勻釅醋半盞銀石器中慢火熬至一半傾乳鉢內研勻再傾入銚內熬成膏更入麝香少許研更入蒸餅心少許和丸菉豆大每服夜卧溫漿水下十九丸仍用一丸手心中漿水化開塗痔上三年者三五服差

治痔疾烏雞子膏方

沒藥半兩 麝香壹錢

研

右二味用烏雞子一枚畧取破頂頭傾出却用雞子黃入雞卵內續入藥末用黃一處調勻用紙糊合頂於飯上炊令熟為度分作四服細嚼用麥門冬湯下食前服

治痔能消丸方

威靈仙  
淨洗  
炒  
蟬殼  
焙  
乾各半兩

右二味搗為末醋麪糊丸梧桐子大每服二十九至三十九米飲下

治痔疾百中散方

草薢不計  
多少

右一味擣羅為散每服二錢七精羊肉四兩批作四片移藥却合如餃子於炭上炙熟細嚼以酒半升送下候腹痛如人行五七里方上廁取下膿血及蟲只一服

治痔疾殼橘散方

殼橘不拘

右一味用瓷瓶子一枚紙數重摳一片壓口次用炭火籠作火屋燒殼橘候烟去九分存性只置瓶內急以紙并摳子壓口後冷為細散每服二錢七麝香溫酒或陳米飲調下

治五痔小香連丸方

黃連  
不拘  
炒焦  
黃色

右一味擣羅為末以雞子清和丸梧桐子大陰乾每服十五丸於雞鳴時聲未絕間溫酒下十服取効永不復發

治痔疾地膚子散方

地膚子

右一味不拘多少新瓦上焙乾搗羅為散每服三錢匕用陳粟米飲調下日三

洗痔藜蘆湯方

藜蘆

附子剉

莽草

蛇牀子

羌活

獨活

當歸

苦參

芍藥各一  
兩

蜀椒去目半兩

右一十味麞搗篩每用兩撮生絹袋盛桑松柏枝各一握生薑一塊拍破銀石器中以水三碗煎熟去滓傾入器中乘熱熏候溫洗之

熏痔七物湯方

乾蝦蟆

壹剉碎

皂莢參

壹剉碎

艾

壹

鼈甲忒枚

壹碎枚

雄黃

兩

麝香

壹錢

草烏頭

壹剉碎

右七味麞搗篩拌勻穿地坑內着熟火一斤方磚一片中心鑽孔子蓋坑口旋入藥一撮披衣坐上熏

熏洗痔疾神妙湯方

草薢

桔梗根

甘草剉

五倍子

五倍子

豉

葱白

切

右六味等分碎每用一二兩以水兩椀煎數沸益盛坐熏時候通手洗之

治五痔消毒沒藥散方

沒藥

壹兩

黃礬

白礬

潤塗軟

兩

各麝香

壹錢

右五味並研令勻每用時先以葱湯洗拭淨以藥乾傅

治五痔花乳石散方

花乳石

煅研兩

乳香

去石

夜明沙

研

膽礬

研

地龍

去土細為末

塗痔黃藥散方

黃藥

鉛丹

黃連

膩粉

白礬

右五味等分搗羅為散先煎葱湯洗後用藥散一錢七塗之久患不過三度  
治一切痔疾應痛散方

荆芥穗

桑根白皮

地榆

各壹兩

右三味搗羅為散每用三錢七水一椀同殼橘二枚拍破一處煎三五沸傾  
出就熏瘡極痛候下得手時方可淋渫仍服後藥  
治一切痔疾至聖丸方

良方卷之三

積殼去  
殼剉  
殼剉去

枳殼去  
殼剉  
黃連伍

右三味用麯五升同於銀石器內慢火炒令麯黑為度於地上去火毒不用  
麯將藥為細末用皂子一百枚去黃以水一升於銀石器內煮令熟爛如膏  
與前藥末同拌和丸梧桐子大每服二十丸溫米飲下不拘時日三

熏洗諸痔五物散方

萸若子

兩

白礬

壹

兩

通明者半

兩

生用

半

蓬砂

兩

鐵器

內盛慢火

煅過

蓬砂

兩

同前

肆

馬牙消

格

壹

分以上

肆

先碾碎

兩

通明者半

兩

生用

半

朴消

伍

兩

同前

肆

先碾

兩

同前

肆

右五味用百沸湯一大碗藥末五錢七浸熏洗痔痛處食後夜卧用先以衣  
覆護只留痔瘡處仍避風

傳貼痔木香散方

木香

檳榔大者

壹

兩

黃連

分

壹

兩

生用

半

莽草葉

半

右四味擣羅為散每用五錢七水二碗煎三二沸熏洗後用溫水調勻以紙  
花子貼之

治蓮花痔瘻及雞冠痔等貼痔四妙散方

白芨

白欖

木鼈子

桑螵蛸

各半

右四味搗羅為散湯磨乳香調令稀稠得所攤故帛上貼之次日連皮拆下更無瘡癥甚妙

治丈夫婦人久患痔不論有瘡無瘡四香湯方

莎草根

壹兩

黑狗脊

半兩

甘松

黃熟香

上好極香

者各壹分

右四味麞擣篩每使五錢匕水一椀煎五七沸盛在深盆中便令患者於上面坐圍衣被熏之勿透氣候下得手便淋燥患處直候藥冷即止不得揩拭便蓋覆卧一時許若燥了臨卧將被以火焰稍暖更妙

治痔疾已用藥淋燥了貼痔綠雲湯方

卷柏

樗根白皮

貫眾

朴消

地骨皮

各壹兩

右五味麞擣篩每用十五錢匕葱二枝水五升煮至四升去滓乘熱燥之  
塗痔二黃散方

黃藥

壹兩

黃蜀葵花

白及

鐵

生乾地黃

半兩

青黛

礪

右五味搗羅為散先燥了用朴消水調塗之

貼痔苦棟散方

苦棟子

貳枚

白礪

壹兩

白礪

壹兩

右二味炒焦為散入麝香研勻臨卧貼之空心喫嫩豬肥肉一頓永差

熏痔丸方

白鱠魚骨 非子等分

右二味搗羅為末麪糊丸彈子大火燒薰之

治痔疾驅糞熏方

驅糞

右一味不拘多少乾不得用慢火煅成煙熏候痒甚別用後方燥洗

治痔疾淋渫方

惡實茅子半

右一味不拘多少淘去浮者每用一兩以水兩碗濃煎乘熱熏之候通手淋渫

治痔疾殃橘散方

殃橘 皂莢子

右二味不拘多少每一殃橘劄眼子七箇每眼子內安皂子一枚放在藏瓶內燒存性取出於土內培出火毒一宿細研入麝香少許食前米飲調下一

錢七

治痔疾枸杞散方

枸杞根 地龍 搗

右二味枸杞根旋取新者刮去浮赤皮只取第二重薄白皮暴乾搗羅為末每秤一兩別入地龍末一錢和勻先以熱蠶汁洗燥患處用藥乾擦日可三次用

治痔瘡下部發腫如梅李大痛礙不能行者即時取勑神白散方

苦夏 醉州

右一味每用一枚研令極細入龍腦一小皂子許同研勻用津唾於手心調令稀稠得所攤輒紙上貼之即冷如冰良久有清水出漸消矣如未全愈再貼去根本尤妙

治療疾熏傳立効散方

蜣螂 蟑 故液 飛 捣  
者尤妙

右一味入蓬子固濟文火煅之存性為末先以溫水洗之用藥末燒熏畢復以藥末掺之用薄紙貼上

治榮衛不調腸澼下血及癥五痔下血不止消散下部毒氣腫痛比聖丸方

椿芽拾兩炒

生草武兩

甘草武兩細令黑

色

右三味同搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心食前米飲下治諸痔瘻牡痔牝痔脉痔腸痔血痔等鹿茸丸方

鹿茸酒浸火令皮嫩附子炮裂去龍骨碎

黃耆炙

桔梗炒

生乾地黃牛膝去苗浸培酒

芍藥

人參

白茯苓

去黑皮各壹兩壹分

枳殼去瓤炒

當歸切

蟬皮炙

芎藭

槐子

微炒

白礬熱令汁盡

黃連去須各半

桂皮去纏皮三分

蒲黃

炒壹

右一十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心煎柏葉湯下日晚再服

治諸痔烏蛇散方

烏蛇去皮骨酒浸炙蠅皮酒浸炙槐子炒

天麻

黃耆剉

桑黃酒炙

枳殼炒壹兩

桂皮去纏皮

附子炮裂去

當歸勘

赤芍藥三分格酒令汁研

白礬半兩研

麝香研二錢

右一十三味搗羅為散空心陳米飲調下二錢七日晚再服