

消癰積聚
痰飲調經

藿香○

治腫毒去

惡氣止霍

亂濕中快

氣吐逆○

澤蘭○

治癰疔通

九竅利關

節破宿血

生肌利小

腸○

較正醫林狀元壽世保元王集卷之九

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

外科諸證

癰疽

夫癰疽瘡癤者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而發為癰疽也夫此疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙煖安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽六腑之氣所生也其脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰五臟之氣所成也其脉沉數瘡者其總名也癰者有頭小瘡也經云諸痒痛瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯夾心火之熱而主癰疽之類也

外科諸證 卷之九 癰疽

荆芥○

散風熱清

頭目風利

咽喉瘡腫

賊風○

薄荷○

治賊風發

汗利咽喉

口齒瘰癧

結核○

紫蘇○

葉發汗梗

胎子消

痰喘葉梗

然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵表廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌肉其發猛惡初生一頭如痞癰白色焦枯觸之而痛應心者疽也發熱於皮膚之間是以浮腫根小不過二三寸者癩也夫癰生於六腑若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內潰骨髓癩則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊復夫諸瘡之中惟背疽疔瘡最爲急症其次莫如腦疽腸癰喉癰之類亦其急者也至若瘰癧懸癧痔漏諸瘡之類其症可緩而治也又有疥癬癩瘡風疖之類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫癰疽之疾須要察其是實是虛是冷是熱或重或輕對症用藥無失先後次序凡人四十已上頭項鬢頤背脊腰脇或筋骨之上所視不見之處者稍有瘡癰使不可輕易待之若視之怠慢以爲常疾每見從微至顯喪命者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至於燎原之勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用若已破潰臟腑既虧飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也夫瘡有五善七

屬未治囊

脫○

白甘鞠

○

治目風熱

梗枝葉解

癰疔毒煎

湯洗結毒

○

陳艾○

用粉糊攤

透日乾杵

去粉并葉

屑則成白

惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清朗四善也體氣和平五善也如恒燥時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡難近二惡也喘麓短氣恍惚嗜臥三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便污者四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也声嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噫痞塞咳逆身冷自汗無時目眩耳聾恍惚驚悸語言顛倒皆是惡症五善見三則善七惡見四必危五善併至則吉而安七惡全見必危而死矣

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸按毒之藥敷散四圍堅中軟者此為有膿審也一邊軟亦可有膿都堅者此為惡核或有氣也都軟者此為有血血溜也

外科醫合長守上卷七
王集九卷
二
五十八堂

絨謂之熟

艾調經加

硫黃少許

作團炙百

病○

茵陳○

治黃疸溼

熱通關節

去滯熱利

小便○

青蒿○

七月中節

丙生紅蟲

取出共輕

當番堅軟虛實為要若堅疽積久後若更變熱偏有軟處當軟處切不可針破也軟疽者溫煖裏衣置之耳若針灸刺破不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羊鵝肉燒酒麪食生冷瓜果醃藏等物瘡口斂百日後不作渴症者方可入房

一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往有喪之家弔孝并拜望等項其瘡腫即復發切忌

用藥治法

一凡癰疽等項大瘡毒初起一二三日內即服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至將潰之際俱可服服後汗出將惡毒盡皆發散腫痛立消其效如神若瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起即服槐花酒或千金消毒散二三劑患處即用灸法灸之瘡初出至七日內皆可灸七日外不可灸瘡未及灸初起即以葱蜜膏或金蟾膏貼之即消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之立效敷之至六七日作膿將潰未潰之時不得頂破用替針九頻點瘡頭自然皮破出膿

粉硃砂和

入搗為丸

如粟粒大

每丸裹以

金薄每歲

一粒乳汁

送服療治

急慢驚風

○

夏枯草

○

性寒以治

癩癧從無

一效久服

瘡自初起至此膿將出未出之際即服真人活命飲一二劑瀉下膿血其瘡

潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏搽之內服千金內托散以托瘡毒出外間服

蠟礬丸以護膈膜二藥相兼服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣

血衰憊脾胃虧損肌肉不生瘡不斂口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼

神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減八味丸可

以絕根庶幾再生若平日無瘡時肯預服之尤為防患於未然也以上治法

俱要依次第而行未有不奏效者皆予百發百中之良法也

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也 方見後諸瘡

○一論癰疽發背癩瘰鼠瘻氣瘰等症此專門之方其效捷如奔馬

飛騰神駿膏

麻黃 二斤去節取一斤淨

杏仁 四兩熱水泡去皮尖用砂鉢搗爛又入水同搗澄

防風 去其淨四兩

地骨皮 去骨淨四兩

甘草 四兩

木鼈子 去壳十四箇

頭髮 一大把溫水洗淨

燈草 一大把

黑鉛 一塊

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大鐵鍋一口將前藥入鍋內主清水

一效久服

則成癰癤

○ 牛蒡子

○ 酒拌焙乾

○ 研損達肺

○ 利咽消痘

○ 疹毒根莖

○ 葉苦寒無

○ 毒混名氣

○ 殺醫生草

○ 生搗塗消

○ 一切癰毒

○ 塗輒一切

二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將前渣入鍋

內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前汁內如前法三次去渣將前

二次汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草三味不用其味香甜磁罐收貯

五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨臥服厚被蓋出大汗為度徐徐去

被不可被風吹次早用猪蹄煨食汗後恐致虛人以此補之以復元氣好酒

調服隨人酒量以醉為度汗出立愈此治瘡毒初起至潰破時前後皆可服神效

○ 一論凡人初覺患癰疽發背已結未結赤熱腫痛即用灸法先以濕紙覆其

上立視候其紙先乾處即是結疽頭處取大蒜去皮橫切三文錢厚安在頭

上用大艾炷於蒜上灸之三壯換一蒜片復灸痛者灸至不痛不痛灸至痛

方住最要早覺早灸為上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六

日者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭一處生者用大蒜搗成膏作

餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者即

用獨蒜切片如前法灸之次日去痴膿自潰矣

○ 一論凡癰疽發背一切無名腫毒初起

堅肛入爛葱蜜膏 生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次御

孔拔毒生金蟾膏 治症同前

肌入膏煎 生白礬末五錢加麝香一分取活蝦蟇一箇去腸肚同搗爛如泥四圍留

貼癰癤煎 頂出氣不過一夜即愈

湯洗楊梅 〇一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但焮痛者

等毒〇 槐花酒 槐花四五兩炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服其毒即消神効

續斷〇 〇一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜

酒浸炒性 黑白牽牛各一兩搥碎好酒一碗煎八分露一宿次日温服大便下膿血即愈

微温入肝 〇一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤癰瘰疔腫魚口五發癰疽初覺一二日

家續筋骨 便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮

助血氣消 膚壯熱大便閉結小便赤澁等症並治妊娠勿服百全南

血結胎產 千金消毒散

跌撲行血 連翹二錢 黃芩一錢 赤芍一錢 當歸尾一錢 金銀花一錢五分 皂角刺一錢

止血〇 天花粉一錢 牡蠣一錢 麻黃一錢 防風一錢 大黃一錢 芒硝一錢

外科醫合 卷上 下 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

○蒼耳子

右剉一劑酒水各半煎服

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起即消已腫即潰血從大便中出瘡潰後勿服

去毛敲損

加減真人活命飲 又名千金內消散

治黃疽脚

當歸尾

酒洗一錢五分

赤芍一錢

白芷一錢

木鼈子

去壳一錢

穿山甲

三大片蛤粉炒

○益母草

金銀花

三錢

皂角刺一錢

白殭蚕二錢

瓜蒞仁

去壳一錢

天花粉

一錢

乳香一錢

沒藥五分

大黃三錢

甘草節五分

○女科諸論

右剉一劑水酒煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐刺不可忍者登時痛止

皆良活血

芙蓉膏

芙蓉葉

黃荆子

各等分爲末

破血調經

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處留頂如烟起此方用在未潰

止痛下水

之先或將潰之際

消腫○

○一治癰疽發背已潰爛者

麻黃

三神膏

草麻子仁一合

陳醋一碗

鹽一撮

連根發表

右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用雞翎續

用梗不表

甘溫開腠

理凝滯閉

塞○

燈心○

利小便清

心火取活

竹一段兩

頭齒節中

開一眼以

心塞實外

以原刻下

竹仍填原

眼外加泥

續掃上其皮即皺其肉即生

○一論諸瘡惡毒發背癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然消

加味蠟礬丸

黃蠟一兩 枯白礬一兩 乳香一錢 沒藥一錢 雄黃二不

右為細末用蠟鎔化為丸朱砂為衣如梧子大每服五十九丸視瘡上下送下

○一論癰疽瘡癤皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止

痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之

加味千金內托散

黃芪鹽水炒 人參 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 白芷 防風

川厚朴姜炒 桔梗 官桂 瓜蒌仁去殼 金銀花 甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血

出者及有汗出此藥之功也不問症候猛惡未成者自散已成者即潰矣○

痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實為切要凡膿血出多陰

陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當觸類而長之

裹入糠火

內煨至竹

成一炭取

出去泥俟

冷去竹炭

內是燈心

炭也治骨

變敷陰疔

入護心散

○

地黃○

生用性寒

涼血滋陰

解熱水煎

可也或見腫平痛寬遂以為安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣

收功萬全湯

黃芪

蜜水炒一錢五分

人參

一錢

白朮

去芦炒一錢

白茯苓

去皮一錢

當歸身

一錢五分

川芎

七分

白芍

酒炒七分

懷熟地黃

一錢

官桂

三分

白芷

三分

陳皮

五分

甘草

三分

防風

五分

右剉一劑生薑一片水煎溫服。如作渴加麥門冬五味子。如煩躁加生地黃麥門冬。如有痰加姜製半夏。如泄瀉加厚朴姜炒。如小便不利加澤瀉。如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒。如胸膈不寬加厚朴姜炒山查。右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合口膿清欲作餘症宜之。

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力

八仙糕

人參

去芦四兩

白茯苓

去皮四兩

乾山藥

四兩

芡實

去壳四兩

蓮肉

去心四兩

至中心透

不油白米

去芥米泔浸過一宿切片微炒四兩

白糖霜

一斤白糖霜半斤

白粳米

二升水淘淨磨極細末

黑然後每

右將藥末米粉糖霜和一處搓揉極勻篩放籠內竹刀割成小片蒸熟入鍋

斤入滾陳

再焙乾任意食之

酒半斤炒

斂瘡止痛生肌散

砂仁末一

官粉

火煨黃色一錢

黃柏

黃連

乳香

沒藥

孩兒茶

各五分

錢再者煮

石為末搽瘡上并治下疳黃水熱泡等瘡

至汁盡瀝

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盪洗

起曬乾仍

猪蹄湯

當歸

赤芍

白芷

羌活

露蜂房

生甘草

錢一方加黃芩

入收盡原

右細剉看瘡大小用藥如瘡大加料用之先將癰疽前蹄兩隻一斤只用白

汁再曬乾

水三升煮軟將汁分為兩次撥去上面油花并下面渣肉每次用藥一兩投

忌經鐵器

於汁中再用文武火煎十數沸去渣以故紙蘸藥湯溫溫徐徐薄搽瘡上死

補陰壯真

肉惡血隨洗而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風忌人口氣吹之有胡

氣生肌填

臭人并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着

髓同肉桂

○一論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭上

自然皮破出膿

引火歸元

瘰癧分虛

替針丸 人言為未入鍋內上蓋明礬燒不響為度一錢

虧○

礶砂五分

巴豆十粒

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香七分

芫藤○

右為細末麪糊為丸如豆大用時以溫水磨化頻點瘡頭上神效

酒拌蒸煎

替針散

用木鼈子川烏二味磨水以雞翎蘸掃瘡上留口大一處出膿如

補生用下

藥水乾再用刷上不一時即穿

行補腎強

○一論治癰疽發背發項發腦等大毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫毒未

四肢腰膝

潰通敷自消如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神異膏貼之每日

莖痛○

換兩三次不許見風神效

芟藥茶

二合消毒散

文蛤 搥碎炒黑色為末三兩六錢

輕粉 研三錢

黃栢 去皮蜜炙為末二兩

寒水石

煨為末一兩

去心酒浸

則補湯泡

則微寒祛

右末合為一處用新涼水一半蜂蜜一半調勻不稀不稠如瘡毒尚未開將腫處遍敷之用綿紙覆于上但乾即以水掃之朝夕更換二次如夏月或午時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膿破口處用神異

毒浮腫

瀉肺中伏

火安臟心

腹○

淡竹葉

解煩熱利

竅治中風

口瘡目痛

胸淡熱毒

藥店有賣

葉如竹葉

甚薄梗如

柴心甚細

膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癰疽發背潰爛又不生肌肉用此立効但此方用之不可太早

合口收功散

血竭一錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨

各一錢五分

赤石脂二錢 朱砂

海螵蛸各五分

右共為細末散在瘡口上即生肌肉

○一論癰疽發背諸瘡毒不拘已成已潰未潰者皆可用之瘡毒甚者每日換

兩三治中毒換一次其藥力方能勝毒諸瘡潰膿後不長肌肉不合口者神効

神異膏

當歸尾五錢

川芎五錢

赤芍二錢

生地黄四錢

防風五錢

羌活五錢

白芷五錢

玄參五錢

黃芪五錢

官桂三錢

桃仁四十九個

杏仁四十九個

木鼈子十四個

何首烏三錢

牛旁子五錢

穿山甲四錢

露蜂房三錢

蛇退二錢

大黃二錢

黃栢二錢

亂髮

男者一團如雞子大槐柳枝四十九節每長一寸

右用芝麻油二斤四兩將藥入鍋內浸春五夏三秋七冬十日以桑柴文武

火煎油黑色以穿山甲浮起黑為度絹瀘去渣再熬油滴水成珠陸續下黃

七寸長者

是今醫家

以開綠花

草誤用可

歎○

葛葵○

根水煎服

可瘡白帶

花一兩擣

爛麝香五

分水一大

梔煎服可

瘡二便閉

無花時根

本草綱目卷九

丹十四兩柳條攪不住手成膏軟硬得所再下乳香沒藥各三錢血竭三錢
條真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸二三日去火性攤用

○一論癰疽瘡瘍痊後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭
不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩燥作渴小便頻數或白濁

陽痿飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸症頓止
及治口舌生瘡不絕

加減八味丸

懷生地黃

八兩好酒拌砂鍋內蒸半日搗膏

山藥一兩

桂心去皮五錢

石棗淨肉四兩酒蒸搗膏澤瀉切片蒸焙乾

白茯苓

去皮各五錢

遼五味子二兩五錢

牡丹皮五錢

右為末入石膏加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸空心鹽湯送不

○一凡人久服加減八味丸必肥健而多子晚年服此不生癰疽諸毒下患消渴等症

○一患癰疽之人雖云有熱皆因虛而得之愈後發渴及先渴而後癰疽非八

味丸不能治

○一人病癰疽多有愈後發渴而不救者治之惟八味丸最効疽安而渴者服

亦可子催

生落胎花

末酒服可

下橫生倒

產○

車前子

○

酒拌炒研

損分理陰

陽利小便

止暑濕瀉

痢益精養

肝肺強陰

止痛○

此則渴止疽安而未渴者預服此丸則永不生渴氣血壯盛或未疽而先發渴者服此不惟渴止疽亦不作

○一人平日口乾作渴因飲酒食炙燥補劑房勞凡若此類過多致令腎水枯渴不能上制心火故有此症後必有疽發也宜先服八味丸以絕其源及癰疽後服此尤有益也

○一論癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚悸少睡以補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門神曲五味黃柏少

睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白薇一錢肉桂五分如膿多或清倍加參芪櫛

一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰

陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以為安漫不知省無補接調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣

附骨疽

馬鞭草

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之症也

○

苦微寒熬

又曰環跳空痛不止生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮冬加

膏空心酒

桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為佐作大料煎入姜汁食前

服半杯治

飲之痛甚者恐前藥十數劑發不動少加麻黃一二劑又不動者恐疽將成

癥瘕殺蟲

急掘地坑以火煨坑通紅沃以小便今患者赤體坐于坑中以蓆或綿衣圍

通經活血

抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

塗癰癩煎

○一論瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅破

湯熏洗陰

慢腫行步作痛或不能行

腫洗楊梅

內托黃芪湯 柴胡 連翹 肉桂 大力子 黃芪 黃柏

惡毒○

當歸尾 升麻 白芷 甘草各入

連翹○

右剉一爛酒各一盞煎至一盞食前溫服

瀉心火脾

黃連消毒飲

胃滯熱結

黃連 羌活各一錢 黃芩 黃柏 藁本 防已 桔梗