

新刻太醫院

刻醫家必究杏苑生春卷之四

太醫院史

紹庄

徐文元

發刻

醫正

活溪

芮

經

彙集

秣陵後學

文麓

紀夢德

次編

太醫院醫官雲林

龔廷賢

校正

金陵書坊

蔣氏

石渠閣

梓

○瘡

夫瘡得之夏。傷於暑熱。氣盛藏於皮膚之內。腸胃之外。此乃榮氣之所舍也。令人汗空疎。腠理開。因得秋之氣。或遇風寒客於皮膚。與衛氣并居。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。以一日一作。其舍淺也。若內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽

爭而不得出。是以間日一作其舍深也。經曰夏暑汗不出。秋成風癘。爲正當暑。暑汗時得之。涼臺水閣。陰木冷地。他人揮扇。泉水澡浴。不得踈泄。鬱而成痰。其初感也。胃氣尚強。全不自覺。又復恣意飲食。過於勞動。竭力房事。胃氣大傷。纏綿日久。邪入陰分。故三日一作名曰瘧癘。瘧癘老瘧也。深根固蒂。宜其難愈。作於子午卯酉日。少陰瘧也。作於寅申巳亥日。厥陰瘧也。作於辰戌丑未日。太陰瘧也。殊不知瘧得於感風感暑。皆外邪也。當以汗解。所感既深。決非一二升汗。其疾可除。然而汗解。胃氣少回。宜守禁忌。倘復觸冒。舊邪未去。新邪又感。展轉沉滯。變成勞瘵。有之汗解固宜。但恐過多。亦致體虛。須用參芪等。補助衛氣。況此疾雖感於暑。必得風寒而作。若先傷於寒。而後傷風。必先寒而後熱。或寒多熱少。名曰寒瘧。若先傷於風。而後傷寒。必先熱

而後寒。或熱之寒少。名曰溫瘧。若陰氣先絕。陽氣獨發。少氣煩
冤。熱甚而嘔。不寒者。名曰瘧瘵。病在陽。脉必弦數而多熱。病在
陰。脉必弦遲而多寒。又有內傷七情。飢飽勞役。感冒山嵐瘴氣。
致令脾胃不和。觸動外邪。亦成此疾。法當辯其外感內傷。隨證
施治。病初切不可妄用截藥。若截早。遏住邪氣。變異不得即愈。
若熱多。宜小柴胡湯。咳嗽宜參蘇飲。夾食宜清脾湯。寒多者宜
養胃湯。勞役所傷。以補中益氣湯發散不退。然後以常山飲截
之。截而不愈。致元氣衰弱者。惟宜六君子湯之類。養脾祛痰。使
脾氣一盛。自然平復。瘧久不愈。脇下痞滿。腹中結塊。名曰瘕母。
仍有寒熱時作。不可以癖積治之。

○瘧脉辨

要畧云。瘧脉自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦而小緊者。下之痊。○

弦遲者宜溫。弦緊者可發汗。針灸浮大者宜吐之。○脉經曰。瘧脉自弦。○微則爲虛。代散者死。

○治瘧法則

瘧之爲病。因狀極多。是以陳無擇謂外感四時。內動七情。及飲食飽飢。房事勞役。皆能致之。其內經謂夏傷于暑。秋必病瘧者。此乃因時而感耳。又不可專執此語。當要分別。內外二因。而療如外所因。有寒有痺。不可不辨。

如溫熱者。其狀寒熱身重。骨節煩痛。脹滿自汗。善嘔。乃因汗出復浴。及冒雨濕。濕氣舍于皮膚所致。

如壯瘧者。其狀寒多不熱。慘怛慄慄。振慄。病以時作。此乃多感陰濕。以攻陽不盛。陰大抵外因瘧證。除痺瘧獨熱。溫瘧先熱後寒。壯瘧無熱。其餘諸瘧。皆先寒後熱。其內所因。症由

喜怒憂思恐五者之分不可不察。

如蓄怒傷肝。氣鬱所致。名曰肝瘡。

如思傷脾。氣鬱凝結。名曰脾瘡。

如憂傷肺。肺氣凝痰。名曰肺瘡。

如失志傷腎。精濃成痰。名曰腎瘡。

故此五種瘡症。皆由氣血不和。鬱成痰飲所致。

又有疫瘡。其症一歲之間長。初相似。又有鬼瘡。其症夢寐不祥。

多生恐怖。又有瘰癧。其症乍寒乍熱。乍無乍有。又有勞瘡。

其症稍勞。即不經年不瘥。結成癥癖。在脇腸間。名曰老瘡。

又名瘡母也。已上諸症。當分經各治。

如在太陽症。謂之寒瘡。法當汗之。

如在陽明經。謂之熱瘡。法當下之。

如在少陽經。謂之風瘧。法當和之。

乃三陽受病。謂之暴瘧。其發多在夏至後。處暑前。此乃傷之淺者。近而暑也。

如在陰分。不分三經。但以太陰為主。總謂濕瘧。其發多在處暑後。冬至前。此乃傷之深者。遠而重也。

如暑瘧。宜用人參白虎湯之類。

如痰瘧。宜用二陳湯。加常山、檳榔、草薢、柴胡、黃芩。

凡瘧不能食者。必因飲食上得之。當從食治。

凡瘧若原有汗。要無汗。宜養正氣。為主。原無汗。要有汗。以散邪為主。

凡瘧症大渴大熱者。用小柴胡去半夏。加知母、黃連、黃柏、梔子、天花粉。或用生地、麥門冬、天

化粉、牛膝、知母、炒黃連、乾薑。

生甘草煎服。

發寒熱甚。頭痛如破。渴而飲水多汗。宜以人參黃芪。苓連。梔子。

川芎。蒼朮。白朮之類。

如久瘧不愈者。宜以二陳湯。加川芎。蒼朮。柴胡。葛根。白朮。此乃一補一發之法也。

如久瘧不得汗。亦宜二陳湯。加蒼朮。佐以檳榔。

如痰壅胸滿熱多寒少。大便燥實者。宜大柴胡湯利之。

凡瘧母宜以鱉甲爲君。三稜。莪朮。香附。海粉。青皮。桃仁。紅花。神。

麴。麥芽之類。加減爲丸。用醋湯送下。其症係邪居陰分。宜。

用撫芎。川歸。紅花。蒼朮。白芷。黃芩。甘草煎湯。露一宿。次早。

溫服之。

凡瘧二日一發。名曰瘧瘧。乃陰經受病。蓋瘧得於暑。當以汗解。

或取風涼冷濕。不得踈泄鬱而成痰。又得嗜慾縱飲。及屢經劫峻之藥。胃氣大傷。故此難愈。必先與人參。白朮。陳皮。芍藥等劑。佐以本經引使藥。若得汗。已。體氣必虛。又須大補。候汗通身下過。委中方見佳兆。

凡小兒瘧疾有痞塊。用生地芍藥

各錢五分

川芎 黃芩 酒炒

半夏

各一錢

甘草 三分

加生薑

二片

煎湯調醋炙鱉甲末効。

○丹路征瘧活法

瘧症有六經辨其發瘧有早晏不同連日間日之異。且患者。又有虛實不井。最宜詳變別各類而療。

如惡寒發熱。腰背頭項俱痛。此乃太陽經之瘧。宜二陳湯加麻黃。羌活。藁本。防風之類。

如先寒後熱。或寒少熱多。或熱不寒。咽痛鼻燥。此陽明經瘧。宜

二陳加乾葛升麻白芷之類

如先熱後寒或寒熱間作。脇痛口苦或嘔吐惡心。此少陽經瘧。宜二陳湯中多加柴胡黃芩人參青皮。

如作於子午卯酉日者。此少陰瘧。宜二陳加歸芍黃柏黃連柴胡之類。

如作於辰戌丑未日者。乃太陰瘧。宜以二陳湯加蒼朮柴胡芍藥之類。

如作寅申巳亥日者。乃厥陰瘧。宜以二陳湯加桂枝附子乾薑之類。

大抵瘧在三陽者。則宜汗。宜吐。如麻黃葛根柴胡常山草菓烏梅之類。

如瘧在三陰者。宜下。宜溫。宜和。如大柴胡湯加薑桂及附子理

中湯之類。選而加減用之。

瘡病古名瘡。疫其症不一。故素問有五臟瘡。六腑瘡之分。

凡瘡初發一二次。其邪正熾。未可據截。正經所謂。避其來銳是也。不問寒熱多少。宜用青皮飲。或草菓飲。或二陳加草菓半錢。或平胃散加草菓柴胡各五分。或養胃湯加川芎草菓各五分。熱少者取微汗。寒多者宜快脾湯服。後寒仍多者。用養胃湯加桂附各五分。獨寒者宜依此。如仍不動者。用七厘湯。

如熱多者。宜驅瘡飲。或參蘇飲。每服加草菓五分。及香蘇飲。如前加草菓大熱不除。宜小柴胡湯。甚者以五苓散加辰砂少許。如獨熱無寒。亦與小柴胡。如熱雖劇不甚渴者。以小柴胡桂枝湯。候可截則截之。

如久瘧者宜四獸飲間服山甲湯

但瘧疾寒多熱少。或少食易飽。惡心痰吐。以人參養胃之劑治

之。方見三卷內

病中氣虧敗。津液鬱聚成痰。阻塞經隧。以致榮衛不清。而成瘧。或脾臟氣虛。喜怒不節。致陰陽相勝。結聚涎飲。與衛氣相搏。亦發為瘧。

治法當補中氣為本。踈鬱豁痰為標。是以用人參。白朮。茯苓。甘草。大棗。諸甘溫以補中益氣。橘紅。生薑。草菓仁等。諸辛溫之劑。以踈豁鬱滯。助烏梅。半夏以豁痰。

方三因四獸飲

人參 三錢

白朮 二錢

茯苓 一錢

甘草 炙五分

大棗 二枚

橘紅 八分

生薑 三片

草菓 七分

烏梅 一放 半夏 八分

右咬咀。水二鍾。煎一鍾。露一宿。熱服。

病 癰症熱而不寒。或熱多寒少。口苦咽乾。大小便澀。脉來弦數。

此乃肝邪乘脾。

治 法當益肝溫脾。是以用柴胡。青皮抑肝無助。厚朴疎滯。白木

茯苓。草菓和脾。胃半夏豁痰。黃芩清熱。一方有炙甘草七分

方 清脾飲

柴胡 一錢五分 青皮 八分 厚朴 七分 白茯苓 八分

白朮 一錢 草菓 一錢 半夏 八分 黃芩 一錢

右剉一劑。水二鍾。煎一鍾。食遠服。

一切瘧疾已服調理藥餌不止者。無問寒熱多少。以七寶飲或

常山飲截之。

方截瘡常山散

知母一錢

草菓

常山

各八分 甘草 炙五分

烏梅三分

穿山甲

一錢

右咬咀用酒一鍾半煎七分露一宿至清晨冷服服後如吐則順之

瘡但熱無寒發渴者以柴胡括婁根湯主之

方見三卷內

病寒多熱少者以柴胡桂枝湯主之

方見三卷內

病勞役所傷飲食失節變成瘡疾虛弱自汗以補中益氣湯主

之

方見三卷內

病瘡疾自汗日甚不能止已此必表虛不能衛護因致大泄以

人參黃衛湯主之

見三卷內

病瘡母之症由鬱積而成

〔治〕法當消宿積踈鬱滯以消宿積豁痰化食行瘀血以消癥瘕
無清蒸熱

〔方〕瘡母丸

青皮

一兩

香附

二兩

神麴

一兩

麥芽

一兩五錢

三棱

七錢

莪朮

八錢

海粉

紅花

各一兩

桃仁

八錢

驚甲

醋炙一兩

右件修合爲末以糊丸如梧桐子大每服白湯下五七十丸

〔治〕陽明瘡此方用白芷以止頭疼知母石膏以清熱

〔方〕白芷石膏三拗湯

白芷

三錢

知母

五錢

石膏

五錢

右咬咀用水煎八分溫服

〔方〕治諸瘡七速湯

用附子泡。又以鹽水浸。再泡如此七次。去皮臍。或用沸湯。泔陳壁上為稀糊。如前浸泡七次。分作二服。每服水一鍾。薑七片。棗七枚。煎七分。臨發日早溫服。

方 草菓飲 治諸瘡神効 用草菓川芎柴胡白芷良薑炙甘草青皮陳皮各等分水煎。臨發日三服。

病 三日一發。名曰痲瘡。以四神散主之。兼治虛瘡。若痰嗽加半夏一錢。生薑五分。

方 四神散

常山

二錢五分 虛人量減

白茯苓

檳榔

各一錢五分

甘草

右攻咀。隔夜先用好酒一小盞。拌一宿。臨發日早入水煎。五更時服。

病瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母以驚甲飲子主

之方見四卷內

方驚甲飲子

驚甲

草菓仁

黃芪

白朮

白芍藥

厚朴

檳榔

橘紅

川芎

各八分

甘草

炙四分

生薑

七片

棗子一枚

烏梅

半個

右咬咀用水煎熟食遠溫服

病邪入肺經咳嗽有痰寒熱如瘧以參蘇飲主之

方見三卷內

病飲食所傷停滯心胸不得消化變成瘧疾以枳實二陳湯加

草菓主之

方見三卷內

病暑瘧三陽合病經云邪之所湊其氣必虛故用人參甘草以

補正氣爲本石膏知母柴胡黃芩等以清熱爲標半夏豁

痰桂和榮衛

方桂枝黃芩湯

人參 二錢

甘草 炙五分

石膏 一錢五分

知母 八分

黃芩 一錢

柴胡 一錢五分

半夏 一錢

桂枝 五分

右以水二鍾煎一鍾溫服。

病處暑前發。頭項痛。脉浮無汗。惡風。此乃風寒客於太陽所致也。

治法當疎散風寒。經云。風寒外襲。治以辛溫。汗之則愈。故用麻

黃辛溫發表。羌活防風等散風。佐甘草緩中和藥。

麻黃 二錢

羌活 錢半

防風 一錢

甘草 炙五分

右咀水鍾半煎一鍾熱服取汗。

若有汗惡寒。去麻黃。加桂枝。名桂枝羌活湯。